

(上接第一版)

2、每年2学期，每学期实际上課20周(考試時間在外)，每周上課6小时，全年上課240小时，修業年限为3年(如每周上課8小时的，可適當縮短修業年限)。

3、上課時間以每節55分鐘為准，可連上兩節，中間須有10分鐘休息；但應力避三節連上。

4、所設各科內容與高級小學的相當，要求達到高級小學的畢業程度。

5、上課和課外作業的時數比例，大体为3:1，但应当注意進行課堂練習。

6、課程的排列，一般采取“雙科并進”的办法；如果教學條件不足時，也可采取“單科獨進”的办法。

(三) 業餘初級中學

第一类：

時 課 程	項 目	各學期上課時數						總時數
		一	二	三	四	五	六	
語文	女	4	4	3	3	3	3	400
算術	女			2				120
代數	女				2	2	$2\frac{2}{3}$	130
幾何	女			2	3			100
物理	女					3	$3\frac{1}{2}$	110
化學	女						5	100
每周課時		8	8	8	8	8	8	960

說明：本類教學計劃適用於工廠企業中的干部文化學習班。

2、每年2学期，每学期实际上課20周(考試時間在外)，每周上課8小时，全年上課240小时，修業年限为3年(如每周上課8小时的，可適當縮短修業年限)。

6、語文包括漢語和文學，漢語和文學的授課時數比例，大致为1:2。

7、課程的排列，可視條件，采取“雙科并進”或“單科獨進”办法。第四学期的代數課，前十周为每周上課2小时，后十周为每周上課3小时。物理課前十周为每周上課3小时，后十周为每周上課2小时。

目前部分工廠企業中的职工和手工業合作社社員的業余初中每周只能上課6小时，需要延長修業年限为4年。暫可試行下列教學計劃：

時 課 程	項 目	各學期上課時數								總時數
		一	二	三	四	五	六	七	八	
語文	女	4	4	2	2	2	2	2	2	400
算術	女	2	2	2						120
代數	女			2	4					120
幾何	女				4	2				120
物理	女					2	4			120
化學	女							4		80
每周課時		6	6	6	6	6	6	6	6	960

說明：这个教學計劃的上課和課外作業的時數比例，各科內容和分量，課程排列的方法等，应与上述業余初級中學第二類教學計劃相同。

(四) 業餘高級中學

第一类：

時 課 程	項 目	各學期上課時數						總時數
		一	二	三	四	五	六	
語文	女	6	6	4	4	4	4	400

說明：本類教學計劃適用於工廠企業中的干部文化學習班。

2、每年2学期，每学期实际上課20周(考試時間在外)，每周上課8小时，全年上課240小时，修業年限为3年(如每周上課8小时的，可適當縮短修業年限)。

3、上課時間以每節55分鐘為准，可以兩節連上，中間須有10分鐘休息。

4、上課和課外作業的時數比例，大体为2:1。

5、所設各科內容(除語文外)與普通高級中學的相當。語文包括漢語和文學，其授課時數的比例，約为1:2，教材可以適當精簡，要求可以降低。第三学期的几何課是平面几何，第四学期的几何課是立体几何。

6、課程的排列，可視教學條件，采取“雙科并進”和“單科獨進”的办法。

二、農民業余文化

(一) 掃除文盲

學校的教學計劃

說明：

時 課 程	項 目	各學年上課時數		總時數
		一	二	
識字		240	160	400
每年時數		240	240	480

1、每年分3个學段進行學習，除放春假、寒假、秋假外，全年至少上課240小时，修業年限为2年(半文盲的修業年限应当縮短)。这只是一般的規定，各地可根据具体情况掌握執行。

2、識字課要求讀完農民識字課本全三冊，大約認識1,500个常用字，能够大体上讀懂淺顯的通俗書報，能記簡單的帳，能寫簡單的便条。

3、在第三學年还有空余時間80小时，如有需要，可以學習珠算，要求学会加減法和簡單的乘除法，能估計生產上需要的数量。

吳氏醫學述第三種大草從新目錄

卷四上

菓部五菓

山菓

更菓

味類

蔬類

杏仁

巴旦杏仁

甜杏

烏梅

白梅

桃仁

桃花

桃葉

桃核

桃栗

大棗

紅棗

梨膏

柿霜

木瓜

山查

小

橘皮

廣皮

化州

建皮

橘紅

青皮

橘葉

橘核

香櫟

香藥

蜜甯

花紅

枇杷

葉

楊梅

石櫟皮

酸石櫟

銀杏

胡桃

皮

殼外

青皮

榛

荔枝

核殼

荔枝

龍眼

肉

橄欖

核

榧子

松子

檳榔

大



腹皮子枳椇子

落花生

川椒

椒紅
椒目

秦椒

胡椒

椒畢澄
茄

吳茱萸

茶

瓜蒂

甜瓜

西瓜

甘蔗

白沙糖

石蜜
霜冰

糖

紫沙糖

蓮子

心

石蓮子

蓮

蕊鬚

藕節

藕粉

荷葉

菱

芡實

粉

粉芡

慈姑葉



吳氏醫學述 第三種

門人周蘭九生庭

武原吳儀書程輯

男

有榆蒼培同較



本草從新

菓部 五菓 水菓

山菓

夷菓

味類

鹹類

濕熱 潤燥

杏仁

以下五菓類

辛苦甘溫而利有小毒瀉肺降氣

行痰解肌除風散寒利胸膈氣逆通大腸氣秘

東垣曰杏仁下喘治氣桃仁療狂治血俱治大便秘當分氣血脈浮屬氣晝便難而陽氣秘者

五菓一

用杏仁陳皮麻沉屬血夜便難而陰血秘者用
桃仁陳皮肺與大腸相表裏竇門在上魄門在
下為氣之通道故竝以陳皮佐之潤燥消積
○杏仁紫苑竝能解肺鬱利小便

豆粉近治時行頭痛上焦風燥欬逆上氣
之則爛

含煩熱喘促其毒性又能殺蟲治瘡制錫毒狗
燕

毒消狗積因虛而咳嗽便閉者忌之雙仁者殺
人

去皮尖炒研發散連皮尖研得火良惡葛
根黃芩黃耆杏子酸熱有小毒損人孕婦忌

潤肺氣巴旦杏仁甘平止欬下氣消心腹逆悶有濕
痰者勿服

以其性潤也凡仁皆潤形扁皮白尖彎如鸚

哥嘴者真

形圓皮黃尖直者名刮杏
仁出山東河南不入藥

瀉腸斂肺

烏梅

酸澀而溫脾肺血分之藥瀉腸斂肺

肺病咳嗽吐血

食酸以止血涌痰消腫解毒生津止渴

梅於

冬而實於夏得木之至氣故最酸膽為甲木
為乙木人舌下有四竅雨通膽液故食酸則津

生醒酒殺蟲治久嗽瀉痢

血痢尤良。梁莊肅公血痢陳應之用烏

梅胡黃連竈下土等分為末茶調服而愈曾魯公血痢百餘日國醫不能療應之用鹽梅肉一

枚研爛合臘茶入醋服一啜而安

瘴瘧霍亂吐逆反胃下血血

崩安虬厥

虬蟲上攻而眩仆蟲得酸則伏

去黑痣蝕惡肉後有

肉突起燒存性研末敷之一日減半兩日而平

病有當發表者大已

酸收誤食必為害

青梅薰黑為烏梅

稻灰汁淋蒸

肥澤不蠹。大便不通氣奔欲死者烏梅。顯湯浸去核九棗大納人下部少時即通。

安吉者肉厚多脂最佳

合溪者次之長沙梅。建梅肉薄無脂不堪用。

白梅 酸澀鹹平功用略同烏梅治痰厥僵仆

牙關緊閉

取肉揩擦牙齦涎出即開。蓋酸先入筋齒軟即易開。若用鐵器攪開恐傷

其驚痛喉痺梅核膈氣

取半青半黃梅子每箇用鹽一兩淹一日夜曬

乾又浸又曬至水盡乃止。用青錢三箇夾二梅麻線縛定。通裝磁罐內封埋地下百日取出。每

用一枚含之。嚥汁入喉即消。收一年敷乳癰腫者治一人收二年者治二人神效。

毒刺入肉中

搗爛菴之即出。瘡中弩肉搗餅貼之即收。

刀箭傷膚搗

血卽止

多食損齒傷筋

經曰酸走筋筋病無多食酸若過食而齒齲者

嚼胡桃肉

以解之

鹽漬爲白梅

取大青梅以鹽漬之口曬夜漬十日成

矣久乃上霜故又名鹽梅

口衣生黴點者梅葉煎湯洗之卽去清水採梅葉洗蕉葛衣經夏不

脆有

根葉治休息痢及霍亂煮濃汁飲之

駢

根葉治休息痢及霍亂煮濃汁飲之

駢

根葉治休息痢及霍亂煮濃汁飲之

瀉破血潤燥

桃仁

苦平微甘苦以泄血滯甘以緩肝氣而生

新血

無已日肝者血之源血聚則肝氣燥肝苦急急食甘以緩之

通大腸血

秘治熱入血室

衝脉

血燥血痞損傷積血血痢經

閉欬逆上氣

血和則氣降

皮膚燥癢

肌有發熱如狂

若小腹滿痛小便不利者爲畜血

若非血瘀而誤用之大傷

通大瀉

蘇軾在陽編

陰氣 泡去皮尖炒研碎雙仁者有毒不可用

香附為使

婦人陰瘻桃仁杵爛綿裹塞之產後陰腫桃仁搗研傳之俱效

桃花 苦平下宿水除痰飲消積聚利二便

風狂

杜陽編載范純佑女喪夫發狂閉之室中夜斷臍櫺登桃樹食花幾盡自是遂愈以

能瀉痰飲滯血也○儒門事親載一婦滑瀉數

年百治不效或言此傷飲有積也桃花落時以

棘鍼刺取數十萼勿犯人手以麴和作餅煨熟

食之米飲送下不一二時瀉下如傾六日行至

數百行昏困唯

以攻決為用但可施於氣實

有餘之證若無故而因除百病美顏色諸謬說

而服之為害不小 三月三日採花揀淨以絹



宜發汗

補腎

袋盛懸簷下陰乾千葉者勿用

桃葉 苦平 殺蟲發汗

凡傷寒風痺發汗不出以火燒地用水灑之布

乾桃葉於上厚二三寸席臥溫覆取大汗被中數粉極燥使瘥凡麥麴蠶沙皆可如此法用

采嫩者名桃心入藥尤勝

桃子辛酸甘熱

微毒多食令人有熱生癰瘡

有損無益五菓列桃為下以此與

同食患心痛服木人尤忌之

桃梟

是桃子在樹經冬不落者正月採之 苦微

溫有小毒辟邪祛祟

自禿頭瘡乾桃一兩黑丑一合為末臘猪脂調搽

栗

鹹溫厚腸胃補腎氣

羊能解 小兒不可多食

生則難化熟則滯氣

小兒疳瘡生爵栗子敷之韋刺入肉金刃傷方同

補脾胃
心肺調營
衛和氣

大棗 甘溫補中益氣滋脾土潤心肺調營衛緩

陰血生津液悅顏色通九竅助十二經和

傷寒及補劑中加用之以發脾胃升騰之氣

薑並行 紅棗功用相倣差不及爾 雖補中而

味過於甘中滿者忌之 甘合人滿大建中湯心

同例。經言棗為脾藥脾病宜食之又曰脾病

人毋多食甘甘甘乃相戾耶不知言宜食者指不

足之脾也如實滿腫脹之類凡用藥者能隨其虛

實而變通之雖尋常品味必護神功苟執而泥
之雖有良劑莫展其長故學者以格致為亟也
凡風疾痰熱及齒痛俱非所宜小兒疳病亦禁

生者尤為不利 北產肥潤堅實者佳 金華南

寧所產皮薄而皺花紋甚細而可愛味雖苦而微帶酸且脂少於北棗止可克食用藥引景曰南棗大惡不堪啖蘇頌曰江南出者堅燥少脂不可入藥

忌葱魚同食 諸瘡久壞不愈者棗膏三月前水頻洗而愈○食椒閉氣食棗即

涼心潤肺利大小腸 以下山菓類 甘寒微酸

者利也流利止嗽消痰清喉降火 生之可清六

可滋五臟之陰實除煩解渴潤燥消風 大知其

痰不知其醒酒解毒 經疏曰膏梁之家厚味

散風之妙能轉重為輕變危為安 治傷寒發熱熱嗽痰喘

中風失音

搗汁頻服聖惠方梨汁煮

切片貼湯

火傷

脾虛泄瀉

乳婦及金瘡忌用

搗汁用

熬膏赤良

加薑汁蜂蜜佳清痰止咳與萊菔相間收斂則不爛

潤肺寧嗽
瀉腸

楊

俗作柿

生用甘冷潤肺止咳嗽清胃理焦煩乾

柿甘寒而瀉瀉腸止洩潤肺寧嗽而消宿血治

肺痿熱咳

產寶云產後欬逆煩亂乾柿水煮熟飲

咯血反胃

有人三世病反

胃至孫以柿乾同飯常食不飲水愈

腸風下血

痔漏

肺與大腸相表裏臟清則

肺熱亦除泊宅編柿乾燒灰飲服二錢治下血

柿霜乃其津液生津

化痰清上焦心肺之熱為尤佳治咽喉口舌瘡

方伯宅編

谷穀產



痛 柳性頗寒肺經無火及風寒作嗽冷痢滑

洩者忌之 若與蟹同食令人腹痛作瀉

蒂止呃逆 古方單用取其苦溫降氣濟生如法

和脾舒筋 瀉斂筋

木瓜 酸清而溫和脾理胃斂肺伐肝化食 斂斂

則化與止渴 酸能氣脫能收氣滯能和調營衛

利筋骨 筋急者得之即舒去濕熱消水脹治霍

亂轉筋 邪傷脾胃清濁不分揮霍擾亂上吐下

脾足肝也

日肝雖主筋而轉筋則因風寒濕熱襲傷脾胃

所致轉筋必起於足腓腓及宗筋皆屬陽明木
爪治轉筋取其理脾以伐肝也上病則企衰而
木盛故用酸溫以收脾肺之耗散而藉其走筋

寫波氣消
食化痰散

山查

古字
作檀

酸甘微溫

健脾行氣消食磨積
醒瘡

鐵反花痔瘡木瓜為末以鯉魚身上延調貼之
以紙護住○辟除壁虱木瓜切片舖於薦上

也于是盡投江中頃之溺即如舊
陳者良忌

利國效迎子視之聞四而皆木瓜香笑謂諸人

百顆置之於中舉舟人皆病溺不得出醫以通

腫腹張誤矣有大寮舟過金陵愛其芬馥購數

酸收太甚真一日木瓜乃酸齋之品世用治水

木瓜也
腰足無力
多食損齒及骨病瘰癧

中何物乃
中一袋以足倚之比及登岸足已善步矣
熱忌用補齊及淋洗昔有患足痺者趁舟見加
發熱狀類傷寒第脛腫掣痛為異爾宜利濕清
濕熱之物上輸於脾下流至足則成脚氣
瀉木以助金也
瀉痢脚氣傷脾主四肢或寒濕



油膩之積與麥芽消穀積者不同凡煮老雞硬肉投數枚則易爛其消肉積可知

化痰發小兒痘疹行乳食停畱止兒枕作痛

積於太陰少腹作痛療小腸疝氣茴香名兒枕痛砂糖調服

令人嘈煩易饑反伐脾胃生發之氣凡服不相宜者

服山查即解一胃中無積及脾虛惡食者忌服

補氣一破氣也

有大小二種小者入藥一名棠毬子去皮核

核亦有用化食磨積治疳催生

橘皮 辛能散溫能和苦能燥能瀉為脾肺氣分

之藥 脾為氣母肺為氣籀凡用補藥調中快膈

宣氣調中 瀉痰

本草

導滯消痰大法治痰以健脾順氣為主潔古定

嘔止嗽利水破癥宣通五臟統治百病皆取其

理氣燥濕之功入和中藥則畱白入疏通藥則

去白去白名橘紅兼能除寒發表皮能發散皮膚氣

雖中和亦損真元無滯勿用 廣產為勝皮厚

不脆有豬棕紋福建產者名建皮力薄浙江陳

久者良故又名陳皮陳則烈氣消無燥散之患

湯治痰咳童便浸曬治痰積薑汁炒入下焦鹽

水炒化州陳皮消痰甚靈然消伐太峻不宜輕用况此物真者絕少無非柚皮而已