

濟陰綱目卷之五

吳興 金德生 閬風父輯著 錢塘 查學淳用拙父訂正

西陵 汪 淇 懔 漪子箋釋 天都 查 望于周父叅閱

積聚癥瘕

○論婦人諸積形狀

外有腸覃石瘕
瘕瘕三症亦當
與此條參看
按七門之中而
瘕有八其病氣
或聚或散瘕瘕
之與痛俱見不
痛則隱亦可與
瘕並稱則八瘕
之外又有三積
矣又男子爲七
疝女爲瘕則疝
與瘕亦可同經

準繩云。大全良方。分瘕瘕諸氣。疝瘕八瘕。腹中瘀血。癥痞。食瘕。血
瘕。凡七門。瘕者在腹內。近臍左右。各有一條筋脈。急痛大者如臂。
次者如指。因氣而成。如弦之狀。故名曰瘕。瘕者。僻在兩肋之間。有
時而痛。故名曰瘕。疝者。痛也。瘕者。假也。其結聚浮假而痛。推移乃
動也。八瘕者。黃瘕。青瘕。燥瘕。血瘕。脂瘕。狐瘕。蛇瘕。鼈瘕。積在腹內。

男與女亦有同病是瘕不止于八也瘕一瘕二曰血曰食而不言及痰飲何也蓋瘕氣之中未嘗無飲而血瘕食瘕之內未嘗无痰則痰食血又未有不先因氣病而后形病也故消積之中當兼行氣消痰消瘕之藥為是

或腸胃之間與臟氣結搏堅牢雖推之不移名曰瘕言其病形可徵驗也氣壅塞為痞言其氣痞塞不宜暢也傷食成塊堅而不移名曰食瘕瘕血成塊堅而不移名曰血瘕若夫腹中瘀血則積而未堅未至於成塊者也大抵以推之不動為瘕推之動為瘕也至夫疝與疝瘕則與痛俱痛即現不痛即隱在臍左右為疝在兩肋之間為瘕在小腹而牽引腰脇為疝恐學者一時難了未免淆亂故總叙而條析之

○論婦人八瘕所因

病源曰八瘕者皆胞胎生產月水往來血脈精氣不調之所生也腎為陰主開閉左為胞門右為子戶主定月水生子之道胞門子

戶。主。子。精。神。氣。所。出。入。合。於。中。黃。門。玉。門。四。邊。主。持。關。元。禁。閉。子。精。臍。下。三。寸。名。曰。關。元。主。臟。魂。魄。婦。人。之。胞。三。焦。之。府。常。所。從。止。然。婦。人。經。脈。俞。絡。合。調。則。月。水。以。時。來。至。故。能。生。子。而。無。病。婦。人。榮。衛。經。絡。斷。絕。不。通。邪。氣。便。得。往。來。入。合。於。臟。若。生。血。未。盡。而。合。陰。陽。卽。使。婦。人。血。脈。攣。急。小。腹。重。急。支。滿。胸。脇。腰。背。相。引。四。肢。痠。痛。飲。食。不。調。結。牢。惡。血。不。除。月。水。不。時。或。月。前。月。後。因。生。積。聚。如。懷。胎。狀。邪。氣。甚。盛。者。令。人。恍。惚。多。夢。寒。熱。四。肢。不。欲。動。陰。中。生。氣。腫。內。生。風。甚。者。小。便。不。利。苦。痛。如。淋。狀。面。目。黃。黑。歲。月。久。卽。不。復。生。子。也。

黃。瘦。者。婦。人。月。水。始。下。若。新。傷。墮。血。氣。未。止。臥。寢。未。定。五。臟。六。腑。

虛羸精神不足。因向大風便利。陰陽開闔。關節四邊中於風濕氣。從下上入於陰中。稽留不去。名爲陰虛。則生黃瘕。黃瘕之聚。令人苦四肢寒熱。身重淋露。臥不欲食。左脇下有氣結牢。不可得抑。若腰背相引痛。月水不利。令人不產。小腹急。下引陰中如刺。不得小便。或時寒熱。下赤黃汁。令人無子。當刺關元氣衝行。以毒藥瘕下卽瘳。

青瘕者。婦人新產。未滿十日。起行。以浣洗太早。陰陽虛。玉門四邊皆解散。子戶未安。骨肉皆痛。手臂不舉。飲食未復。內臟吸吸。又當風臥。不自隱蔽。若居濕席。令人苦寒洒洒入腹。煩悶沉淖。惡血不除。結熱不得散。則生青瘕。聚在左右脇下。藏於背脊上。與肩胛腰。

下。攣。急。腹。下。有。氣。起。喜。唾。不。可。多。食。四。肢。不。欲。動。搖。手。足。腫。面。自。黃。大。小。便。難。其。後。月。水。爲。之。不。通。利。或。不。復。禁。狀。如。崩。中。此。自。過。所。致。令。人。少。子。療。之。當。刺。胃。管。行。以。毒。藥。有。法。瘕。當。下。卽。瘡。燥。瘕。者。婦。人。月。水。下。惡。血。未。盡。其。人。虛。憊。而。以。夏。月。熱。行。疾。步。若。舉。重。移。輕。汗。出。交。流。氣。血。未。平。而。卒。以。悲。怒。致。腹。中。猥。咽。不。洩。經。脈。攣。急。內。結。不。舒。煩。懣。少。力。氣。上。達。胸。膈。背。脊。少。腹。壅。急。月。水。與。氣。俱。不。通。利。而。反。以。飲。清。快。心。月。水。橫。流。溢。入。他。臟。不。去。有。熱。則。生。燥。瘕。之。聚。大。如。半。杯。上。下。腹。中。苦。痛。連。兩。脇。下。上。引。心。而。煩。害。飲。食。欲。嘔。吐。胸。及。腹。中。不。得。太。息。腰。背。重。喜。臥。盜。汗。足。痠。削。久。立。而。痛。小。便。失。時。忽。然。自。出。若。失。精。月。水。閉。塞。大。便。澁。難。病。如。此。者。

其人少子。療之以長鍼。按而刺之。法度行以毒藥。瘕當下卽瘳。

血瘕者。婦人月水新下。未滿日數而中止。因飲食過度。五穀氣盛。溢入他臟。若大饑寒。呼吸不足。呼吸未調。而自勞動。血下未定。左右走。腸胃之間。留絡不去。內有寒熱。與月水合會。爲血瘕之聚。今腰痛不可俛仰。橫骨下有積氣。牢如石。少腹裏急。苦痛。背脊疼。逆達腰腹下。攣陰裏。若生風冷。子門僻。月水不時。乍來乍不來。此病令人無子。療之瘕當下卽瘳。

脂瘕者。婦人月水新來。若生未滿三十日。以合陰陽。絡脈分胞門。傷于戶。失禁。關節散。五臟六腑津液流行。陰道稠動。百脈關樞。四解外。不見其形。子精與血氣相遇。犯禁。子精化不足。成子則生脂。

瘕之聚。令人支滿。裏急。痺引少腹重。腰背如刺狀。四肢不舉。飲食不甘。臥不安席。左右走腹中切痛。時瘕時甚。或時少氣頭眩。身體解。你苦寒惡風。膀胱脹。月水乍來乍去。不如常度。大小便血不止。如此者。令人無子。療之。當刺以長鍼。行以毒藥。瘕當下卽瘳。

狐瘕者。婦人月水當日數來。而反悲哀憂恐。若似遠行。逢暴風疾。雨雷電驚恐。衣被沉濕。罷倦少氣。心中恍惚未定。四肢懈惰。振寒苦寤。寐氣絕。精神游亡。邪氣入於陰裏。不去。則生狐瘕之聚。食人子臍。令人月水閉不通。少腹瘀滯。胸膈腰背痛。陰中腫。小便難。胞門子戶不受男精。不藏氣。盛令人嗜食欲嘔喜唾。多所思。如有身狀。四肢不舉。有此病者。終身無子。其瘕有手足成形者。殺人未成。

者可療。以長鍼急持刺之。行以毒藥。有法。瘕當下卽瘳。

蛇瘕者。婦人月水已下新止。適閉未復。胞門子戶勞傷。陰陽未平。榮衛分行。若其中風。暴病羸劣。飲食未調。若起行當風。及涉泥塗。因衝寒大早。若坐濕地。名陰陽亂。腹中虛。若遠行道路。飲汗井之水。食不潔之食。吞蛇鼠之精。留絡不去。因生蛇瘕之聚。上食心肝。長大其形。如漆在臍上下。還疔左右脇。不得吐氣。兩股脛間苦疼。少腹多熱。小便赤黃。膀胱引陰中。變急。腰目俱痛。難以動作。喜發寒熱。月水或多或少。有此病者。不復生子。其瘕手足成形者。殺人未成者。可治療之。有法。行以毒藥。瘕當下卽瘳。

鼈瘕者。婦人月水新至。其人劇作罷勞。汗出衣服潤濕。不以時去。

之若當風睡足踐濕地恍惚覺悟蹠立不安顏色未平復見所好
心爲之開魂魄感動五內脫消若入水浣洗沐浴不以時出而神
不守水精與邪氣俱入至三焦之中幕玉門先閉津液妄行留絡
不去因生鼈瘕之聚大如小枰令人小腹內切痛惡氣左右走上
下腹中苦痛若存若亡持之躍手下引陰裏腰背亦痛不可以息
月水不通面目黃黑脫聲少氣有此病者令人絕子其瘕有手足
成形者殺人未成者可治療有恣度以長針按療之行以毒藥瘕
當下卽瘳

○論婦人瘕瘕

大全云婦人瘕瘕由飲食失節脾胃虧損邪正相搏積於腹中牢

薛氏之說可爲
病久虛羸者法

固不動有可徵驗故名曰癥氣道壅塞故名曰痞得冷則發冷入
子臟則不孕入胞絡則月水不通

薛氏曰前證若脾胃虛弱用六君子加芎歸若肝脾虛弱用補中
益氣及歸脾湯若肝火鬱滯佐以蘆薈九六味丸外貼阿魏膏患
者須慎七情六淫飲食起居治者不時審察病機而藥之庶幾有
效

○論食癥

大全云婦人食癥臟腑虛弱月候來時食生冷之物脾胃既虛不
能消化與臍氣相搏結聚成塊日漸生長盤牢不移故謂之食癥
也

薛氏曰。前證若形氣弱。須先調補脾胃。爲主而佐以消導。若形氣克實。當先疏導。爲主而佐以補脾胃。若氣壅血滯。而不行者。宜用烏藥散。散而行之。散用烏藥。莪朮。醋浸炒。桂心。當歸。桃仁。青皮。木香。各等分。爲末。每二錢。熱酒調下。脾氣虛而血不行者。宜用四君。芎歸。補而行之。若脾氣鬱血不行者。宜用歸脾湯。解而行之。若肝脾血燥。而不行者。宜用加味逍遙散。清而行之。大抵食積痞塊之證。爲有形。蓋邪氣勝則實。真氣奪則虛。當養正闢邪。而積自除矣。雖然。堅者削之。客者除之。胃氣未虛。或可宜用。若病久虛弱者。不可輕試也。

○論血癥

大全云。婦人寒熱失節。臟腑氣虛。風冷在內。飲食不消。與血氣相

有以左畔爲血
藏者凡肝之部
皆可爲血病

此說甚佳

結漸生。顆塊盤牢。不移動者是也。皆因血氣勞傷。月水往來。經絡
痞塞。惡血不除。結聚所生。久而不瘥。則心腹兩脇苦痛。害於飲食。
肌膚羸瘦。

問癥一也。何以知是血癥。曰。血外之証。脊悶煩躁。迷忘驚狂。痰嘔
汗多。骨熱肢冷。其畜在下焦者。必臍下結急。外熱內痛。尺脈洪而
數也。桃仁靈脂。生地黃。牛膝。大黃。甘草。祛逐之。

薛氏曰。前証多兼七情虧損五臟氣血乖違而致。蓋氣主噓之。血
主濡之。脾統血。肝藏血。故鬱結傷脾。悲怒傷肝者。多患之。腹脇作
痛。正屬肝脾二經証也。潔古曰。養正積自除。東垣云。人以胃氣爲
主。治法當王於固元氣。而佐以攻伐之劑。必需之歲月。若期速効。

投以峻劑反致有誤。

○論腹中瘀血

大全云婦人月經否塞不通或產後餘穢未盡因而乘風取涼爲風冷所乘血得冷則成瘀血也血瘀在內則時時體熱面黃瘀久不消則爲積聚癥癖矣。

薛氏曰前証若鬱結傷脾用加味歸脾湯若恚怒傷肝用加味逍遙散若產後惡露用失笑散若肝脾虛損用六君子柴胡以補元氣爲主胃氣虛弱用補中益氣湯加茯苓半夏爲主大凡腹中作痛畏手按者此內有瘀血若形體如常屬病氣元氣俱實用桃仁承氣湯直下之若痛而肢體倦怠飲食少思此脾胃受傷屬病氣

立齋專重脾胃
改其言如此然
亦一偏之見但
攻削之藥不得
其數反致傷氣
以致不救故不
如善守之為愈
矣

有餘元氣不足。用當歸散調和之。若痛而喜手按腹。形體倦怠。飲食少思。此形氣病氣俱不足。用六君炮薑芎歸純補之。若痛而大便不實。飲食難化。此脾腎虛寒。用六君炮薑肉果溫補之。若痛而作嘔少食。此脾胃虛弱。用六君炮薑藿香。若痛而嘔吐不食泄瀉。用六君薑桂。若兼手足逆冷自汗。更加附子。此証多有因攻伐而致者。

○論弦癖

大全云。弦者在腹內。近臍左右。各有一條筋脈急痛。大者如臂。次者如指。因氣而成。如弦之狀。名曰弦也。癖者。為僻側在兩肋之間。有時而痛。故曰癖也。二者皆陰陽不和。經絡痞隔。飲食停滯。不得

宣流邪冷之氣。搏結不散。得冷則發作疼痛。○天眩痺癢痕血氣
塊硬。發作則痛甚。則欲死。究而言之。皆血之所爲。僕嘗治一婦人。
血氣刺痛。極不可忍。甚而死。一二日方省。醫巫併治。數年不愈。僕
以葱白散烏雞丸遂安。又嘗治一婦人。血氣作楚。如一小盤樣。走
注刺痛。要一人扶定。方少止。亦用此二藥而愈。尋常小小血氣用
此二藥。亦有奇効。故錄於後。

○論疝痕

大全云。婦人疝痕。由飲食不節。寒溫不調。氣血勞傷。臟腑虛弱。風
冷入腹。與血相結。所生疝者。痛也。痕者。假也。結聚浮假而痛。推移
乃動也。婦人之病。有異於丈夫者。或因產後血虛受寒。或因經水

巢氏止言胞門
傷而此直指胞
中惡血亦本病
源來

女子亦有疝男
子亦有瘕

往來取冷過度非獨因飲食失節多挾於血氣所成也其脈弦急者生虛弱小者死尺脈濇而浮牢爲血實氣虛其發腹痛逆氣上行此爲胞中有惡血久則結成血瘕也

薛氏曰子和云遺溺閉癰陰痿浮痺精滑白淫皆男子之疝也若血涸月事不行行後小腹有塊或時動移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕

一婦人小腹痞脹小便時下白帶小水淋瀝此肝經濕熱下注用龍膽瀉肝湯而愈

一婦人小腹脹痛小水不利或胸乳作痛或脇肋作脹或氣逆心吻余以爲肝火而血傷脾用四物柴胡青皮玄胡索木香而愈

此亦微積蓋氣
在則腸中之血
凝而成形矣
即痰之類故
用二陳

一婦人小腹痞悶小便不利內熱體倦懶食用八珍湯加柴胡山
梔龍膽草治之而安

○論腸覃

李氏曰腸覃乃寒氣客於大腸與胃相搏大腸為肺傳送肺主氣
氣得熱則行得冷則凝凝則清氣散而濁氣結為瘕覃延日久不
已瘕肉乃生始如雞卵久如懷胎按之堅推之移月事時下或多
或少氣病而血未病也宜二陳湯加香附以開之或香粉丸

○論婦人瘕瘕並屬血病

準繩云古方有五積六聚七瘕八瘕之名五臟之氣積名曰積故
積有五六府之氣聚名曰聚故聚有六雜病準繩言之詳矣若夫

瘕瘕積聚並起
于氣故有氣積
氣聚之說然謂
瘕屬血病者氣