

外科百效全書

下卷

手足

手背發



手斑 附肩痛

癆支名手背發此症傷肝胆小腸經患于手背及指間或如黃豆
天或如聚粟或如熱椹拔之則絲長三四寸要知不赤黑者其
狀黑者死凡人病手發如風熱血燥筋急者宜耳瘡內
如因怒火而疾者川芎黃連肉柴胡清肝湯煎服

如亡精腎枯筋縮宜腎氣丸之類 忌寒涼降火之藥及艾炙等
症若犯之則輕者反劇重者大潰腫痛發熱出血而死慎之慎
江氏治手皆發 用痰核內十六味流氣飲解毒生肌之藥

甲疽

甲疽之症乃毒氣攻于手足指努肉裹上指甲疼痛出血瘡中有
虫或因剔甲傷肌或因甲長侵肌遂成腫痛

右疽俱用綠凡五兩置鉄板上以炭火烘之吹令火熾其凡即
溶流出黑汁者是真俟流汁盡去火待冷取爲末色似黃丹敗
之先以鹽湯洗拭後用綠凡爲君入射香少許敷之重者用綠
凡五錢蘆會一錢射香一字爲末以絹袋盛藥納所患指下
中線上定以瘡爲度

代指

指頭先腫焮熱掣痛狀後以爪申邊結膿甚者爪甲自脫
治宜先用芷硝煎湯淋洗狀後用烏梅核中仁爲末米醋調成

膏入治潰之自愈或用猪脂和蚯蚓搗爛敷之

後肚口治宜天南星五倍子白芨草烏大黃酒麴酒糟搗爛
支方初起用野茅煮塊煨燠或酒糟半盞曲果四個扛豆半盞
醋半盞其搗爛罨之

天蛇頭

蛇頭瘡生手指上或足指上瘡傍一塊開口腫痛是也治宜用雞
蛋一個零搗碎一宿如指頭大將人言雄黃末五八手蛋內狀
後以患指入于其中浸一宿次早更以蜈蚣燒燠燠病指一二
次即消

如痛甚流血不止用雄黃蜈蚣金蟬為末擦瘡頭上却以麻油搽
帛上扎之

又方 山砒霜醋煨燠或先將麻油煎雞蛋撻手指一夜次日用
猪胆一個將雞黃末三錢人言末三錢射分八胆內將指搽

住一日疼痛極甚一日後去華胆即好
蛇頭臭爛久不愈用宮霜爲末麻油調搽

鵝掌瘋癬

治用川烏草烏何首烏天花粉赤芍藥荆芥蒼朮防

半肉地丁各一兩艾葉四兩煎水燂洗

一方用杏仁去皮尖輕粉等分爲末猪胆汁調搽患處炭火上炙

一二次將麥粒大的艾在摺指蓋處炙三壯水遠不發

如多年不愈者先用磁鋒磨刮次以草麻子一兩枯凡二錢爲末

桐油調

人乳極執再以炙肉三兩水銀五錢枯凡三錢搗爛

如爛丁餘下次以肥皂酒糟洗淨十次神効更多芳

宮霜

根神効

艾方黃

黑麻子研火上燂之二炷香爲度

手瘡

痒濕如豆疥爛如浸淫瘡之狀治宜以皂

更爲末麻油調敷

紅絲瘡

紅絲瘡乃因喜怒不常血氣逆生而手足間有黃痂其中

紫黑色即有一條紅絲通血上而生若至心腹則使人昏

不救或有生由三條紅絲者治宜急以針橫截紅絲所到之

處刺之令其出血以膏藥貼或嚼萍草根敷之立愈

手足腫毒治宜芙蓉葉草烏絡三天南星五倍大黃七柏絡三

酒麴三箇及頭酒糟搗爛醋調敷上

雞爪瘋手足不能搖動不能拿物者是也治宜乾姜肉桂絡二

五加皮海桐皮絡一川烏麴包八牡丹皮川芎赤芍絡五右為

細末每紅水一盞將古錢一文八清油浸每貼八此錢同煎如

婦人病此症用艾火在陰戶尖處離一分灸一丸即好

牛勒瘋是症手旁紅腫痛不能屈伸有似牛勒樣

治宜用四五枚布針畧蘸老虎葉針之即安若潰而膿出仍服

十宜散之類外煙洗化毒生肌

厥隻 是症受寒痰所發脾下核腫如雞子大

治宜防丰當歸人參小芪土烏藥大茯子肉木香川芎桔梗枳
壳粉草乳香沒藥白芷羌活白芍蘇葉姜蔥開服如有潮加連
喬無潮加官桂或用腦疽內于金托裏散洗妙

狐臭

脚腋

耳內多濕治宜蜜佗僧_一個砂_分枯白_分凡紅辰砂_分銅

青白附子猪一其爲細末用皂刺煎濃汁調末搽兩腋下夜靜
時先用皂刺煎水洗淨然後搽藥至一七又將大甘草一兩煎
濃汁服之外用耳遂末_{細猪油調搽}腋下一日夜拔出身內臭
物再將枯凡一兩蛤粉_細樟腦_一爲末搽之少許求去病根

方黑鉛二錢溶化入水銀二錢撈勻白_凡_三紺銅青_二其爲末
先將黃荆子洗患處後擦七次又一方用佗僧一兩射香半_分
粘_凡一錢輕粉_{一分}細辛_{五分}其爲末用口涎塗擦三百一_次

又方每次用嫩黃荆表七個擦上後以小便洗七後用嫩松枝
 爛投腋下每日換以小便頻洗至一七日又用田螺螭一個米
 泔洗去泥水方入射八厘朋砂一分人言三厘于內用碗盛之
 至晚放在屋上連露三四晚用螺螭水手蘸擦四五日即効
 肩疽 痒而出水負擔者多生用石灰二兩火炒赤傾于濃醋內
 內遂入水粉二錢攪勻以雞毛刷上數次則愈

腳背瘡



八面瘡

膝瘡

鶴膝瘋

鶴膝瘋症乃足三陰虧損風邪乘之以致肉熱炒食肌瘦肢體疼痛久則膝愈大而腿愈細有如鶴之膝然

初起宜用葱熨法以肉消之寒熱者五積散加散加烏蘘姜若如已潰者用活寄生湯膿清肌肉不生者用慈應八物湯

鶴膝瘋單方 用左纏藤三十餘斤銅內煮成膏以酒調開入



而愈 祖傳治兩膝虛腫或兩足痿弱痛軟或沉重不痺不能

動併用後病此症者先服換藥散一二貼治以大防風湯

○換藥散 煨耶 蘇葉 路 甘草 陳破各 錢姜葱白煎服

○大防風湯 當歸 川芎 白芍 淮地黃 人參 黃芪

白朮 羌活 防丰 牛膝 杜仲 甘草

應圓製治合膝瘋 用脂杉節 暗松節 茄根 海桐皮 川

青藤 五加皮 羌活 独活 當歸 川芎 白芍 厚桂

黃芪 杜仲 牛膝 南星 半夏 陳皮 枳壳 石南藤

細辛 藜蘆 白苓 防丰 乳香 沒藥 木瓜 檳榔

耳草節 蒼朮 生姜 取酒空心服不効再加川烏姜汁煮

草烏切碎滾濃茶泡過

過膝瘋

天過膝瘋症石脚先病愈而左脚復疾或左脚先病愈而右脚復

病是也治宜以 人參 黃芩 牛夕 苦參 朱苓 當歸

桑寄生 茵陳 陳皮 防丰 白朮 知母 羌活 蒼朮

獨活 升麻 白朮 甘草 生薑酒煎服

知虛兄傳治膝頭腫痛用朱苓 宅舍 枚郎 小商 牛膝肉

薏苡仁 各 兩 石南藤 獨活 杜仲 各二兩 木瓜 一兩半 香

附 八分 甘草 七錢 為末 每空心酒調下三服

婦人月經不調發熱口渴兩膝腫痛者用耳頰逍遙散加牛膝杜

仲黃柏

施圖製治瘋發脚痛不能動者用當歸 川芎 白芍 白芷

厚朴 枸杞 杜仲 故芷 木瓜 牛夕 防丰 枳櫛

防已 羌活 杜活 蒼朮 乳香 沒藥 甘草 真寄生

薏以仁 土烏藥 土茯苓 姜生 虎胫骨 絡等 製過煨熟

楠木香 生研 同生酒 即藥服每早用雞子下 外用各藥

生薑汁一盞乳香沒藥各二錢化開元上藥貼痛處并腫處

跌打損傷 是症兩脚痛如抽鼓然必宜以地龍 防丰 羌活

當歸 牛夕 川烏 旱烏 附香 荆芥 白芍 川芎

赤芍 灵脂 乳香 沒藥 白芷 山甲 虎腔骨 紫金

皮 柏子仁 骨碎補 共為細末酒煮糊為丸空心木瓜湯

人面瘡

星瘡似人面眼口鼻全多生膝上亦有臂患者乃冤業所致也須
清心悔過尔善禳保內服痰核類十六味流氣飲外用貝母為末
敷之或敷生肌定痛末藥乃聚眉閉口仍用生肌藥併禱愈也

腎臟瘋瘡

是疽初起兩足時熱脚根作痛多干內脰或膝上痒極抓破成瘡
如瘡癢痒滴膿水久則能漸延開失和延及兩股遍身者有之
如內症肺熱盜汗口燥咽乾吐痰熱發腰脚倦怠治宜以腎囊類

腎氣丸為主佐以四生散

○四生散 獨活 黃芪 白附子 犀角路 共為末薄荷縣

又有通身生瘡膿水淋漓兩腿尤甚而倦作痒經年不愈乃腎虛

火也宜用此類八味丸主之

外治白疹膏 赤石脂 枯元 五黃丹 沒藥 乳香

輕粉 為末乾糝或油調搽

外膿瘡初起用獨脚烏拉或根葉三七 生地 梔葉表

茶葉共搗爛每口一換搽茶洗不効或用標的 龍骨 乳

香 沒藥 鬼茶 黃柏末 血竭 鮮猪肉 輕粉

冰比紅鹽子油 黃白蠟路 一 酥油 一 提已上七

味為細末輕粉片腦 先將各 黃白蠟溶化去渣將七味

入鍋內熬沸數次提起傾入碗內候畧冷將輕粉在內調攪

冷將冰片在內搽膏每毒但期一七更念一日一換

應員製治瘰癧神方

用黃蠟四兩開化入黃丹兩輕粉二錢

一作陽骨膏貼絹片緊扎三日一換每先以鹽茶洗之如貼膏

白將愈則以黃丹輕粉為極細末一攪即乾水結益神効

又瘰癧作痛者宜用諸般神膏類金華膏或四應膏神効

瘰癧作痛者宜用五油隔指膏

瘰癧久不收口或爛痛臭穢法當貼隔指白玉膏內服蠟丸丸之

類且翹足端坐勿多行履庶可全

瘰癧瘡

瘰癧瘡生丁脚脛或因打撲而成其瘡口狹皮肉極潤皮薄如

竹膜疔疔痛終日黃水流延蔓而生甚者數十年不愈又易染人

患者須忌房室則易愈初起用塘內久浸過茶葉貼數次不効

再用黃蠟二錢麻油一兩半火熬後入飛過黃丹二兩細火熬

成膏隨瘡口大小攤膏如銅錢厚貼之或用四應膏亦妙

婦人秘福瘡用紅花焙子枯凡五倍共為末鹽

向前瘡 治宜黃連 錢壯礪人脈為末井水調敷或用松香黃

蠟溶化為膏貼以絹巾緊扎並茶洗一日一換七日全愈

脚肚上瘡 初如粟漸大抓搔不已成片黃水流出血不可忍先

用貫眾煎湯淋洗後用百藥煎為末津唾調敷自外而人

脚癰腫痛作痒抓破汁流或封撲成瘡治宜猪屎火煨栴櫚各五

片腦分花板龍骨分三有膿水加輕粉錢濕則搽乾則麻油搽

脚跟瘡

脚跟瘡症過腎脉發源腎經過脉內因飲食起居虧損足三陰所

致或被犬兔所咬而成也

是症慢腫少食者宜藥疽類補中益氣湯咳嗽吐痰者宜疥癩

類八物湯加芪桂或人味丸外治視病而施者久不氣血虛

螺螄發 初起者宜用石螺螄打爛或用小田螺燒灰一兩大

黃一兩硫黃永五錢輕粉三錢乳香沒藥各五分將黃蠟二兩
熬化調前藥作餅貼膏貼或以萬應膏久貼後脫生肌
服痠疼內十六味流氣飲加減煎服

蠟 腳骨腫痛不可忍者 外用生薑葱白醋搗爛敷患處內以當歸
川芎上烏藥木瓜極 即海桐皮秦艽獨活中桂蒼朮威靈仙黃
柏生薑蘇葉煎服

蠟 因跌破成毒紅腫 爛用細茶嚼爛併將芝麻用嚼爛如
此二灸內白將麻茶 白草霜煎水洗或麻油茶百草
蹠上先一孔約深半寸 至下牛日疼痛甚者此濕毒注成漏也用
人中白或人中黃灸出水滴人瘡口

脚發

脚發之症生足掌或指縫間色赤腫痛膿稠者屬足三陰濕熱下
注易沿微腫膿清者屬足三陽虧損難治若黑暗不腫痛不潰

陰疽熱作溺小便淋瀝者陰敗未傳惡症不治

治法濕熱下注者先用隔蒜灸法及膿疽類活命飲以解蘊毒

次用鬚疽類補中益氣湯加小茴故芷以補精氣如三陰虛者

初起用方括內托裏消毒散或托裏散加牛夕槁柳杜仲瀉後

用楊梅風內大防主湯或疔瘰類八物加芪桂附虛心托者用

當歸川芎白芍大黃知母黃柏之類

腳背發

是症又名脫疽其原因

六房室損傷脾腎或先渴

而後發或先發而後渴也

輕者色赤作痛白潰

加先用醒蘇炙肉服腦疽類活命飲或

敗毒散加銀花白芷

黃芩痛止用托裏散扶氣者用瘰癧肉

上六味流氣飲下虛者用八味丸或八物湯加芪桂

重者色黯不爛先用隔蒜灸更服補藥固內則惡肉不改上侵

庶可保生矣