

S 294.

1268

1部5

時方妙用下



時方妙用卷三

閩吳航陳念祖修園甫著

男

元豹道彪古愚
元犀道照靈石

全校字

血症

吐血
衄血

咳血
大便血

咯血
小便血

鼻衄
血淋

齒齦
血崩

經曰中焦受氣取汁變化而赤是謂血血之流溢半隨衝

任而行於經絡半散於脈外而充肌膚皮毛若外有所感

內有所傷則血不循經從上而湧則為吐血咳血咯血鼻

衄齒衄舌衄從下而走則為大便血溺血婦人血崩其源

則一或問諸書皆分別五臟六腑之血而施治茲何以能

時方妙用

卷三

血症



中醫藥大學圖書館版

統言之余曰五臟有血六腑無血觀剖諸腎腹心下夾脊
包絡中多血肝內多血心脾肺腎中各有血六腑無血近
時以吐血多者謂吐血皆耳食前醫之誤凡吐五臟血
必死若吐血崩下皆是經絡散行之血也或問旣無分別
何金匱以瀉心湯治心氣不足爲吐血乎曰百病不離於
五臟六腑臟腑病以致血不循經而爲吐血崩下非吐血
崩下之血從臟腑中脫出也循經之經字作常字解時醫
誤解謂歸脾湯引血歸脾脾能統血卽是歸經害人無算
余再爲之喝醒一語曰隨者仍其隨之常行者仍其行之

常散者仍其散之常充者仍其充之常血循經常之道則無吐衄崩下之病矣千古無一人談及朱於高士宗而不發處細繹思論大爲快事

身熱脈大者難治○身涼脈靜者易治○若喘咳急而上氣逆脈見弦緊細數有勢不得臥者死

一外感吐血先見頭痛惡寒發熱等症必取微汗則愈宜

香蘇飲加荊芥穗一錢丹皮白芍各一錢五分

五十

一夏令秋令感暑氣燥氣而吐血方治見咳嗽門不贅

一內經云不遠熱則熱至血溢血泄之病生矣凡人不辨

暑熱及過食燻炙之物以致血熱妄行宜

四生丸

一

瘀血而吐必先胸痛血色必紫或黑而成塊脈必滯澀

宜

四物湯加醋炒大黃桃仁丹皮香附各一錢五分○如

紫血盡鮮血見即用六君子湯加當歸調之

九 出高鼓峯心法

一傷寒及溫病應發汗而不汗之內熱蓄血及鼻衄吐血

不盡內餘瘀血大便黑面黃宜

犀角地黄湯

九 十



一高鼓峯心法於血症獨精其云除瘀血與傷寒外其餘俱屬七情餓飽勞力等因必見惡心分號症一味固元傷主之方用人參炙芪歸身甘草煨薑大棗白芍水煎服血症最繁以一方統治胡念齋深服之○胡念齋云補藥可用溫藥亦須急加附桂炮薑隨宜

一仁齋直指謂陽虛陰必走大吐大衄外有寒冷之狀可用理中湯加南木香或甘草乾薑湯其效更著又有飲食傷胃胃虛不能傳化其氣上逆亦能吐衄亦宜上二方○余用甘草乾薑湯其乾薑炮黑加五味子二錢甚

效從慎柔五書得來

內經云血氣者喜溫而惡寒寒則滯而不流溫則消而去之此數語爲治血之要旨所以楊仁齋高鼓峯方法神驗卽張景岳用熟地一兩澤瀉附子牛膝各一錢五分肉桂一錢炙甘草二錢水煎服名爲鎮陰煎方雖駁雜而溫藥較多亦能奏效

褚氏遺書云血雖陰類運之者其陽和平陽和二字指心肺而言也心肺之陽宣布如日月一出燭火無光凡諸般邪熱之氣俱除血無所擾則循行常道矣運之者

三字更妙血不自運必藉氣以運之既已運隨衝任而行於經絡散於脈外充於皮毛有經常之道可行何至妄行而爲失血之症耶諸家俱贊此二句之妙絕未能發明其旨甚矣醫道之難也高鼓峯雖未能悟到此旨而固元湯與之暗合慎柔和尚以保元陽爲主亦不過取黃芪補氣以生血而亦與此旨暗合合之則效速二公所以名燥一時也余於此千慮一得不敢自秘

保元湯

七煨薑三片黑棗二枚
慎柔方無肉桂有

當歸補血湯

一血症有不宜剛燥之劑者或血虛煩渴徐熱睡寤不安
五心煩熱宜

聖愈湯

八

舌上出血如孔鑽者煎香薷汁服外用槐花炒研摻蒲
黃炭亦可摻之○齒斷血出用生竹茹四兩醋浸一宿
含之○牙縫出血以紙維蘸乾蟾酥少許於出血處按
之立止○滿口齒血出枸杞子爲末煎湯漱之然後吞
下根亦可○鼻衄用生茅花或根一兩煎服
已上症或統用



中國醫藥大學圖書館版權所有

甘露飲

八十一

滋腎丸

九十四

一血淋尿血用苧麻根十枚水煎服又用海螵蛸乾地黄

赤茯苓各等分爲末每服三錢以栢葉車前子煎湯下

又用亂髮燒灰入麝香少許用米醋溫湯調下如痛

可忍以藕汁蘿蔔汁白蜜調下○又房勞兼小便尿血

宜鹿角膠半兩沒藥另研油頭髮繩各三錢爲末茅根

汁打麪糊丸桐子大每服五十九鹽湯下

下血先便後血爲遠血用灶中黃土八錢甘草生地白

時方妙用

卷之三 血症

五



米熟附子阿膠黃芩各一錢五分水煎服名黃土湯
下血先血後便爲近血宜赤小豆三兩泡令出芽晒黃
歸一兩共爲末以漿水服一錢五分日三服名赤小豆
當歸散○二方俱出金匱

大便下血不止諸藥不效者宜

濟生烏梅丸

九十

一 皮膚血汗宜郁李仁去皮研二錢以鵝梨汁調下又用
人中白焙乾入麝香少許溫酒調服立效又用六味地
黃湯加五味一錢麥門冬川續斷各二錢



諸竅出血宜頭髮敗宗陳蓮蓬各等分俱燒灰研每服

三錢木香湯下

一婦人血崩審其寒熱虛實照已上諸方擇用若脫血之頃不省人事大汗不止者宜參附湯貧者以當歸補血

湯加熟附子二三錢

一百零五

一大吐大衄大崩之頃血若稍止急用

獨參湯服後聽其熱睡切勿驚醒則陰血復生矣

癲狂癰

癲者痴呆之狀哭笑無時請言無序其人當靜狂者罵詈

時方妙用

卷三

癲狂癰

不避親疎其人當動癰者忽然猝倒無知口用流涎手足
抽掣或作五畜聲數刻卽愈愈後卽如平人作止有開斷
所以名癰也皆痰火爲病而癰病多由胎中受驚觸而
發也治宜調中服補此瀉南不必過求奇險

脈實者吉 沉細者凶

一前症屬於實痰實火者宜

滾痰丸

六十三

一肝火之爲害非泛常之藥所可療時賢葉天上獨得其

秘急用

當歸蘆薈丸每服三十九一曰兩三服不可遲疑敗事

九十

前症屬虛者宜

磁砂丸二十

二加龍骨湯加鉛丹二錢或再加阿膠三錢二十

此二方神妙非可以思議及者

一前症既愈即宜以和平之劑收功宜

硃砂安神丸二十

消渴

時方妙用

卷三 消渴



口渴不止爲上消治以人參白虎湯食人卽餓爲中消治以調胃承氣湯飲一溲一爲下消治以腎氣丸趙養葵大變其法謂治消無分上中下先以治腎爲急以六味丸料一觔人肉桂一兩五味子一兩水煎六七碗恣意冷飲之熟睡而渴如失矣白虎承氣皆非所宜也

喻嘉言曰腎者胃之關也關門不開則水無輸泄而爲腫滿關門不閤則水無底止而爲消渴金匱腎氣丸蒸動精水上承君火而止其下人之陽光彼症取其開此症取其閤一開一閤具通天手眼子和詆之何其陋也又白茯苓

丸治腎消方用白茯苓覆盆子黃連括樓根萆薢人參熟
地黃元參各一兩石斛蛇床子各七錢半雞脰胫三十具
微炒共爲細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧子大每服三
十丸食前磁石湯送下喻嘉言治駝加犀角一兩又以六
味丸加犀角收功○抄此與八味地黃丸一陰一陽相爲
表裏皆爲神方 脈宜數大 忌虛小

傷食

傷食病必有胸悶吞酸噯腐腹脹腹痛等症直以平胃散
如麥芽穀芽山查神麴蘿蔔子消之或以所傷之物燒灰
時方妙用

加人爲引導如初傷時食尙在膈服此湯以手探吐如傷
之已久腹滿拒按宜以三一承氣湯下之愈後服香砂
君子湯加乾薑調養若無吞酸噯腐等症但見頭痛惡寒
發熱是外感症切不可誤用消導之品致外邪陷人變症
百出傷寒不禁食故桂枝湯啜粥是開胃第一義讀仲景
書自明西北之人一遇頭痛惡寒發熱之症便云有食卽
服神麴山查等藥徃徃誤事余爲活人計不得不大聲疾
呼也

脈滑而實 時書以右關之上爲氣口謂氣口緊盛傷