

亥 21

3-10420

孫真人備急千金要方

二十



孫真人千金方卷之六十七

仁七

孫真人千金方卷之六十八

仁八

孫真人千金方卷六十九之七十

仁九



新真入千金方卷六十六之六



新

上海涵芬樓影印正統道藏本



新真入千金方卷六十六之六



孫真人備急千金要方卷之六十七 仁

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

發背第三

論一首  
方十五首

論曰凡發背皆因服食五石寒食更生散所致亦有單服鍾乳而發者又有生平不服而自發者此是上代有服之者其候率多於背兩胛間起初如粟米大或痛或癢仍作赤色人皆初不以爲事日漸長大不過十日遂至於死其臨困之時已濶三寸高一寸瘡有數十孔以手按之諸孔中皆膿出尋時失音所



以養生者小覺背上癢痛有異即火急取淨  
土水和如泥捻作餅子厚二分闊一寸半以  
粗艾大作炷灸泥餅上帖著瘡上灸之一炷  
一易餅子若粟米大時可灸七餅子即差如  
榆莢大灸七七餅炷即差如錢大可日夜灸  
之不限炷數仍服五香連翹湯及鐵漿諸藥  
攻之乃愈又法諸發背未作大膿可以冷水  
射之浸石令冷熨之日夜莫住差乃止此病  
忌麪酒五辛等亦有當兩肩上發者  
凡服石人皆須勞役四體無令自安如其不

仁七



爾者多有發動亦不得逐便恣意取暖稱已  
適情必須遺欲以取寒凍雖當時不寧於後  
在身多有所益終無發動之慮耳

凡腫起背胛間頭白如黍粟四邊相連腫赤  
黑令人悶亂即名發背也禁房室酒肉蒜麪  
若不灸治即入內殺人若灸當瘡上七八百  
壯有人不識多作雜腫治者皆死

治發背及癰腫已潰未潰方

右用香豉三升少與水和熟擣成強泥依  
腫作餅子厚三分已上有孔勿覆孔上布



鼓餅以艾列其上灸之使溫溫而熱勿令  
破肉如熱痛即急易之患當減快得安穩  
一日二度灸之如先有瘡孔孔中得汁出  
即瘥

治癰疽發背已潰未潰及諸毒腫方

仁七

枯荳根

榆白皮

胡燕窠

二

鼠屎土

右四味各等分爲末以女人月經衣水洗  
取汁和如泥封腫上乾即易潰者四面封  
之已覺即封從一日至五日令瘥



治發背背上初欲結腫方

大黃

升麻

黃芩

甘草

各參兩

梔子

參柒枚

右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服  
取快利便止不利更進

內補散治癰疽發背已潰排膿生肉方

當歸

桂心

各貳兩

人參

芎藭

厚朴

防風

甘草

白芷

桔梗

各壹兩

右九味治下篩酒服方寸匕日三夜二末

瘡更服勿絕外臺無防風甘草白芷

又方治癰疽發背方

蜀椒

乾薑

黃芩

人參

各貳分

桂心

壹分

小豆

壹合半

白欬

甘草

附子

三

防風

各壹兩 仁七

芎藭

貳兩

右十一味治下篩酒服方寸七日三夜二

李根皮散治癰疽發背及小小瘰癧方

李根皮

壹升

桔萎根

半夏

各伍兩

通草

白欬

桔梗



方

大內塞排膿散治發背癰腫經年瘡後復發  
此因大風或結氣在內經脉閉塞至夏月已  
來出攻於背久不治積聚作膿血爲瘡內漏

有三十餘癰癰服此散瘡

右十五味治下飾酒服方寸匕日三瘡大  
困者夜再服之曾有人患骨從瘡中出兼

厚朴

黃芩

附子各壹兩

甘草

當歸各貳兩

葛根叁兩

桂心

芍藥各肆兩

芎藭陸兩



山茱萸

五味子

茯苓

乾薑各陸兩

甘草

石斛

人參

桂心

芍藥各伍分

巴戟天

麥門冬

乾地黃

菴蓉

遠志各捌分

當歸

石韋

芎藭各肆分

附子貳分

地膽

菟絲子叁分

右二十味治下篩酒服方寸匕日三夜一  
稍加之長服終身不患癰癰

治發背方



右用亂髮灰酒服方寸匕亦治癰疽

又方猪脂傳上日四五度亦治發乳

救急云

羊脂切作片冷水浸帖上暖易之伍陸

猪方

又方三年醋滓微火煎令稠和牛脂傳上

又方猪狗牙燒灰醋和傳上日三四易

仁七

四

又方燒古蚌灰雞子白和傳之日三易

又方飲鐵漿二升取利

又方蛇頭灰醋和傳之日三易

又方燒鹿角灰醋和傳之日四五易

丹毒第四

論一首  
方三十八首



論曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗之色大者如手掌甚者徧身有癢有腫無定色有白丹者肉中腫起癢而復痛微虛腫如吹狀隱軫起也有雞冠丹者赤色而起大者如連錢小者如麻豆粒狀肉上粟粟如雞冠肌理也一名茱萸丹有水丹者由遍體熱起遇水濕搏之結丹晃晃黃赤色如有水在皮中喜著股及陰處此雖小疾不治令人至死治之皆用

升麻膏方



升麻

白薇

肘後作白欬

漏蘆

連翹

砒硝

黃芩

兩各貳

蛇噉

枳實

兩各叁

蒴藿

兩肆

梔子

肆拾枚

右十味微擣碎以水三升浸半日以猪膏

五升煎令水氣盡去滓膏成傳上諸丹皆

用之及熱瘡腫上日三經心錄無枳實以治諸毒腫

升麻湯治丹毒方

升麻

漏蘆

砒硝

兩各貳

黃芩

叁兩

蒴藿

伍兩

梔子

貳拾枚



單方

右六味呔咀以水一斗浸良久煮取七升  
冷以故帛染汁搗諸丹毒上常令濕搗後  
須服飲子并漏蘆湯方並見前癰腫條中  
服之立瘥

小品用治丹  
毒腫

水苔

生蛇啣

生地黄

生菰菜

蒴藿葉

慎火草

五葉藤

豆葉

浮萍

大黃

梔子

黃芩

已上取一味單搗塗之



砒硝

已上取一味下水和用

右十三味或擣成末單用一味立瘥

又方凡天下極冷無過藻菜最冷但有患熱  
毒腫并丹等取渠中藻菜細切熟擣傳之  
厚三分乾即易

治諸丹神驗方

右以芸薹菜熟擣厚封之隨手即消如餘  
熱氣未愈但三日內封之使醒醒好瘥止  
縱乾亦封之勿歇以絕本余以正觀七年  
三月八日於內江縣飲多至夜睡中覺四



體骨肉疼痛比至曉頭痛目眩額左角上如彈丸大腫痛不得手近至午時至於右角至夜諸處皆到其眼遂閉合不得開幾至殞斃縣令周公以種種藥治不瘥經七日余自處此方其驗如神故疏之以傳來

仁七

六

世云耳

治五色油丹方

俗名油腫若犯者多勢死不可輕之

右縛母猪枕頭卧甚良

又方牛屎塗之乾即易

治赤流腫丹毒方

