

医学六要



陰瘡

三錫曰婦人陰瘡乃七情鬱火

傷肝

脾濕熱

下注

其外症有陰中舒出如蛇俗呼陰挺有翻

突出如餅俗呼陰菌亦有如鷄冠花有生蟲腫


痛濕痒癩爛出水脹悶脫墜者其內症口乾內

熱體倦經候不調飲食無味哺熱發熱胸膈不

利脇脹小腹痛痞赤白帶下小水淋瀝治法腫

痛宜四物加柴胡山梔膽草丹皮濕痒者宜歸

脾加山梔丹皮柴胡淋瀝者宜龍膽瀉肝湯加



白朮、丹皮、潰爛者加味逍遙散、腫墜宜補中益氣、加山梔、丹皮。

一婦人陰中突出如菌、四圍腫痛、小便頻數、肉熱、晡熱似瘁似痛、小腹重墜、此肝脾鬱結之症。蓋肝家濕熱作腫作痛、脾虛下陷則重墜、先以補中益氣湯、加山梔、茯苓、川芎調理、外以生豬脂和麝香末塗之、遂收。

一婦人陰中挺出一條五寸許、悶痛重墜、水出淋瀝、小便滯澀、夕與龍膽瀉肝湯、分利濕熱、朝與



補中益氣湯升補脾氣諸症漸愈再與歸脾加
山稗茯苓川芎黃柏間服調理而愈有蟲亦用
此法有膿水腫痛用補中益氣倍升柴加茯苓
炒梔子自効

多鬱悶人肝火內鬱有此宜解鬱清肝越鞠對
小柴胡主之

歸脾湯

見驚悸門

龍膽瀉肝湯

見脇痛門

逍遙散

見婦人門

補中益氣湯 見內傷門

越鞠丸 見鬱門

小柴胡湯 見傷寒門



便濁

小便渾濁、或赤如血、或白如泔、不痛者是痛則
爲淋矣、屬濕屬熱、分虛實治、肥白人脈沉滑胸
膈不利、小便白濁屬濕、痰宜燥中宮之濕、面色
不澤、身倦、脈無力者、屬氣虛、兼補氣、

黑瘦人脈洪數、五心煩熱、頰赤、唇乾、小便赤濁、
或白者、屬相火、宜滋陰、肝脈弦數有力、火盛者、
宜龍膽瀉肝湯瀉之、

治法一分滲解熱、一燥濕健脾、一滋陰降

火 一實下固陽

濁氣下流爲赤白濁升柴二朮二陳俱最妙赤
者黃栢當歸知母白芍丹溪曰升柴二朮二陳
湯能使大便潤而小便長屢驗

兩尺脉沉弱足膝痿弱白濁頻數凝白如油光
彩不定漩脚澄下凝如膏糊古方悉指爲陽虛
亦有虛而挾相火者不可不辨革蘼分清飲專
主陽虛

靈樞經曰中氣泝便爲之變化必先補中氣使

升舉之而後分其臟腑氣血赤白虛實以治之
夫他邪所傷者固在瀉熱補虛設腎氣虛甚
火熱亢極者則不宜純用寒涼必反佐治之
在權衡輕重而已

赤者熱傷血宜滋陰

白者濕熱傷氣宜燥濕

白濁不止服珍珠粉丸佳方用樗皮炒黃栢炒
褐色燥濕熱青黛解鬱熱蛤粉鹹寒引下滑石
利竅珍珠寧神定志一方無此用之屢驗久病



南京中醫藥大學圖書館版權所有

無火症者加炒乾薑

神麴糊丸氣虛四君湯血虛四物湯氣血兩

虛八物湯下

清心蓮子飲治上盛下虛心火上炎口苦煩

渴五心煩熱小便赤或澀下白濁

石蓮肉

子即蓮

赤茯苓

人參

黃芪

地骨皮

麥門冬

黃芩

車前

甘草

空心服

白濁經年不愈或時夢遺形瘦心神不安當作

心虛治珍珠粉丸合定志丸服

定志丸

遠志

去心

石菖蒲

各二兩

人參

白茯苓

各二兩

右爲末蜜丸桐子大硃砂爲衣每服七丸加至二十丸空心米湯下

一方用炒黃栢生黃栢各一兩滑石三兩神麴半兩共爲末滴水丸空心服

茯兔丸

治思慮太過心腎虛損便溺餘瀝小

便白濁夢寐頻泄

鬼絲子

五兩

白茯苓

一兩

石蓮肉

二兩

酒糊丸桐子大每服三十丸空心鹽湯下

車解分清飲

益智仁

川草解

石菖蒲

烏藥

各等分

入鹽少許水煎服一方加茯苓甘草

小便白濁出髓條經驗方

酸棗仁

白朮

人參

白茯苓

破故紙

益智

大藿香

左顧牡蠣

右爲末青鹽酒爲末每服三十丸空心酒下



白濁方用

香附

炒黑色三錢

酸梅草取汁拌勻

酒一盞傾入服之二三服愈

酸梅草又名烏梅

又方用兔絲子一兩炒黑色淬酒一大碗去相

熱服立愈

瑞連丸

治思慮傷神小便赤濁

石蓮肉

炒去心

白茯苓

龍骨

生用

天冬

洗去心

栢子仁

炒別研

麥冬

洗去心

當歸

酒浸去

酸棗仁

紫石英

火煅七次

遠志

甘草湯煮

乳香

龍齒

各一兩

右煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服七十九空

心溫酒下

白淫痿論曰思想無窮所願不遂意淫于外入
房太甚宗筋馳縱帶脉不引發爲筋痿及爲
白淫夫腎藏天一以慳用事志意內治則精
全而瀦若思想外淫房室太甚則淫泆不守
輒隨洩溺而下也然本于筋痿者以宗筋馳
縱也

白淫責于陽虛當益火之原菹蓉鹿茸人參之
類內補鹿茸丸主之要在斟酌增損分量

鹿茸

炙酥

兔絲子

酒浸

蒺藜

炒

白蒺藜

紫苑

肉蓯蓉

蛇床子

酒浸

黃芪

桑漂蛸

陽起石

附子

炮須用童便製

肉桂

各等分

右爲細末、煉蜜丸桐子大每服二十丸、食遠

溫酒下、



漢書卷之八



夢遺精滑

夢交構而精遺出、爲夢遺、責之心、不交流、
相火妄動所致、當清心制火、

不因夢時時流出者、爲精滑、屬氣虛不能約束、
精妄走所致、當澁精、滋腎、下部濕熱盛、白液時
時粘糊、此非精、乃濕熱薰蒸而成、肝脉必弦數、
常瀉肝、滲濕解熱、當歸龍薈丸、龍膽瀉肝湯佳、
古方治精滑、用局方青州白丸子、辰砂爲衣、大
驗、濕痰明矣、

治法曰夢遺者治其心精滑者固其真滿而溢者舒其情濁而赤者調其經養其神心安神寧火來坎戶水到離宮水火交養遺濁皆清

壯年未偶時夜遺爲精氣溢泄不必治

心有所思夜見于夢乃心火動而相火隨之也

黃連清心飲主之安神丸或用補心丹

恣慾太過精滑不禁當大補加澁藥芪參牡蠣

五味金櫻膏之類或煎八物湯吞櫻根丸

五味金櫻山茱萸蓮實俱酸以收之藥

