

本草綱目十

卷十七上
卷十七下

草之六
草



本草綱目草部目錄第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃 本經

商陸 本經

狼毒 本經

防葵 本經

狼牙 本經

蘭茹 本經

大戟 本經

澤漆 本經

甘遂 本經

續隨子 開寶

葇蓉 本經 即天仙子

雲實 本經

蓖麻 唐本 博落迴附

常山蜀漆 本經

吐莖出 上紅山附

藜蘆 本經 山慈石 根馬腸根附

參朮

木藜蘆 拾遺

附子 本經

天雄 本經

側子 別錄



漏藍子 綱目

烏頭 本經

白附子 別錄

虎掌天南星 本經

由跋 本經

蒟蒻 開寶 菩薩草附

半夏 本經

蚤休 本經

鬼白 本經

射干 本經

蘆尾 本經

玉簪 綱目

鳳仙 綱目

坐墊草 圖經 不虛附

曼陀羅花 綱目

羊躑躅 本經 山躑躅 羊不吃草附

芫花 本經

堇花 本經

醉魚草 綱目

莽草 本經

茵蘘 本經

石龍芮 本經 胡椒菜

毛茛 拾遺 每畝附

牛扁 本經 麻建草附

葶麻 圖經



格注草

唐本

海芋

綱目

透山根附

鉤吻

本經

右附方舊一百三十四新四百九十五



南京中医药大学图书馆藏

本草綱目草部第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃 本經下品

釋名黃良

本經將軍之

火參

吳普

膚如

吳普

之號當取其駿快也泉口推陳致新如
戡定禍亂以致太平所以有將軍之號

集解

采根火乾晉曰生河西山谷及隴西二月八月
生黃亦其葉四四相當華高三尺許三月花黃五

月實黑八月采根根有黃汁切片陰乾弘景曰今

采益州北部汶山及西山者雖非河西隴西好者

猶作紫地錦色味甚苦瀟色至濃黑西川陰乾者
勝北部日乾亦有火乾者皮小焦不如西耐蛀堪
久此藥至勁利細者便不中服聚曰葉子莖並品

本草綱目草部第十七卷上

本草綱目草部第十七卷上



羊蹄但莖高六七尺而脆味酸堪生啖葉粗長而厚根紅者亦侶宿羊蹄大者乃如盤長二尺其性濕潤而易蛀壞火乾乃佳作時燒石使熱碾生鐵著石上煆之一日微燥以繩穿眼乾今出岩州西羌蜀地者皆佳由井以北者細氣力平蜀中者陶言蜀地不及隴西誠矣藏器曰無用分別之若取和及深洗能攻病者可用蜀中者吾片緊硬者若取湯洗駿快推陳去熱者當取西錦文者頌曰今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土番大黃正月內生青菜侶芭麻大者如扇根如芋大者如盤長一二尺其細根如牛蒡小者如芋四月開黃花亦有青紅侶蕎麥花者莖青紫色形如竹一八月采根去黑皮切作黃片以乾蜀大黃乃作緊片如牛舌形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮出者曰土大黃二月開花結細實時珍曰宋祁益州方物圖言蜀大山中多有之赤莖大葉根巨若盤藥市以大者為梳紫地錦文也今人以莊浪出者



為最莊浪即古涇原
隴西地與別錄相合

正誤

須曰鼎州出一種羊蹄大黃治疥癩其効初

內抽條出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥
而輕小五月熟即黃色呼為金蕎麥三月采山五
月采實陰乾九月采根破之亦有錦文亦呼為上
大黃時珍曰蘇說即老羊蹄根也因其似大黃故
謂之羊蹄大黃實非一類又一種酸模乃山大黃
也狀似羊蹄而生山上所謂土大黃或指此非羊
蹄也俱見本條

根修治

雷曰凡使細切以文如水旋斑緊重者剉

未至亥如此凡七次晒乾却酒浸蜜水再蒸一伏
時其大黃必如烏膏樣乃晒乾用藏器曰凡用有
蒸有生有熟不得一槩用之承曰大黃采時皆以
火石塘乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙

本草綱目草部卷十七上

蒸膏

氣味苦寒無毒

別錄曰大寒晉曰神農雷公若在

曰味苦氣寒氣味俱厚沉而降陰也川之領酒

煨熟者寒因熱用酒浸入太陽經酒洗入

餘經不用酒果曰大黃苦峻下走用之于

用若邪氣在上非酒不至必用酒浸引上至

分驅熱而下如物在高巖必射以取之也若用

者則遺至高之邪熱是以愈後或曰赤或喉痺或

頭腫或膈上熱疾生也時珍曰凡病在氣分及

寒血虛并妊娠產後並勿輕用其性苦寒能傷元

氣耗陰血故也乏才曰黃芩爲之

使無所畏懼且忌冷水惡乾漆

閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致

新通利水穀調中化食安和五臟經本平胃下氣除



痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹

諸老血留結別通女子經候利水腫利大小腸

熱腫毒小兒寒熱時疾煩熱蝕膿通宣切氣

調血脉利關節泄壅滯水氣溫瘴熱瘧射瀉諸實

熱不通除下焦濕熱消宿食瀉心下痞滿元下痢

赤白裏急腹痛小便淋瀝實熱燥結潮熱諸虛

痘諸火痞時

發明之才曰得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓驚悸

用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心

本草綱目草部卷十七上

湯更用瀉心可也答曰若心氣獨不足則當不吐
衄也此乃邪熱因不足而客之故令吐衄以苦
其熱以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用
之無不効惟在量其虛實而已震亨曰大黃若
善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不與
之陽元甚無輔以致陰血妄行飛越故用大黃
去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心
陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病肺
黃芩救肺黃連救肝肺者陰之王肝者心之母血
之合也肝肺之火既退則陰血復其舊矣冠氏不
明說而云邪熱客之何以明仲景之意而聞悟後
人也時珍曰大黃乃足太陰手足陽明手足厥陰
五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若在
氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣不足
吐血衄血者乃真心之氣不足而手厥陰心包絡
足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖
曰瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下
痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉

脾胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之則作
痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘
在于心故曰瀉心實瀉脾也素問云太陰濕致爲
痞滿又云濁氣在上則生膈脹是矣病發於陽而
反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分
野仲景人陷胸湯左皆用大黃亦瀉脾胃血分之
邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸
湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣成無已註釋
傷寒論亦不知分別此義成無已曰熱淫所勝以
苦泄之大黃之苦以蕩滌瘀熱下燥結而泄胃強
頌曰本草稱大黃推陳致新其効最神故百方下
積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒
藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一切輕用
也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是
快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁元
帝嘗有心腹疾諸醫咸謂宜用大黃無瘥理帝從
坦曰脈洪而實此乃宿妨非用大黃無瘥理帝從
之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其伺

中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不戒哉

附方

三十七

吐血衄血

治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之

兩黃連黃芩各一兩水三升煮一

升熱服取利

張仲景金匱玉函

吐血刺痛

兩為散每服一錢以生地黃汁一合水

半盞煎三五沸無時服

簡要濟衆方

傷寒

病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為

病也

以麻沸湯二升漬之須臾絞汁

熱病譫狂

分作二次溫服

仙景傷寒論

熱病譫狂

炒微赤為散用臘雪水五升煎如

膏每服半匙冷水下

聖惠方

傷寒

氣壯者大黃一兩水二升漬一宿平旦煎汁一

升人芒消

傷寒類要

脚風氣

令焦搗篩每用二錢空心以水三大合入

薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷一切壅滯

方治風熱積壅化痰涎治痞閉消食化氣導血

大黃四兩牽牛子半炒生四兩為末煉蜜丸如梧

子大每服十九白湯下並不損人如要微利如一

二十丸○衛生寶鑑用皂莢熬膏和丸名墜痰丸

又名全真丸金宣宗服痰為百病百病惟水瀉胎

之有驗賜名保安丸

前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生薑

芩八兩沉香半兩青礞石二兩以焰消二兩同入

砂鍋固濟煨紅研末二兩右各取末以水和丸梧

子大常服一二十九丸小病五六十九丸緩病七八十

九急病一百二十九丸溫水吞下即吐勿動候藥逐

上焦痰滯次日先下糟粕次下痰涎未下再服王

隱君歲合四十餘斤愈男女諸病無極九治婦人

疾數萬也養生主論男女諸病經血不通赤白

帶下崩漏不一腸風下血五淋產後積血癥瘕腹

痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等證其効甚速

本草綱目卷十七上

本草綱目卷十七上

宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分一分
用童尿一盞食鹽二錢浸一日切曬一分用酒
黃去豆不用一分切曬再紅花四兩泡一盞浸
切曬一分用當歸四兩入淡醋一盞同浸
歸切曬為末煉蜜九梧子大每服五十九
酒下取下惡物為驗未下再服此心腹諸疾
武當高上孫碧雲方也醫林集要心腹諸疾
九治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各
兩揚篩蜜和搗一千杵九小豆大每服三九
客卒忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒
者以暖水或酒服之或灌之未知更服三九腹中
鳴轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉即
瘥此乃仲景方司空裴秀改為散用不及九也
圖經腹中痞塊煎九梧子大每服三十九生薑湯
本草下利為度腹脇積塊風化石灰末半斤瓦器炒
外臺秘要

炒熟入佳心末半兩罌炒下米醋磨成膏貼

之○又方大黃二兩朴消一兩為末以大蒜煎

膏和貼之或加阿膠一

兩九妙丹溪心法

久患積聚二便不利上

大黃白芍各二兩為末水丸梧子大每服

湯下四十九日三以知為度千金方

不拘大人小兒錦紋大黃三兩為末醋一盞

內文武火熬成膏傾瓦上日曬夜露三日再研

船上硫黃一兩形如琥珀者官粉一兩同研勻

歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切生

冷魚肉只食白粥半月如服不愈半月之

後再服若不忌口不如勿服聖濟總錄小兒

無辜閃癖瘰癧或頭乾黃聾或疳癰疳瘻諸狀多

朽即不中用削去皮搗篩為散以好米醋三升和

置瓦罎中於大鍋內浮湯上炭火慢煮候至成膏

可丸乃貯器中三歲兒一服七九梧子大日可服

以下出青赤膿為度若不下或下少稍稍加丸

本草綱目卷之七上

下多又須減之病重者七八劑方盡根大人亦可

用之此藥相下宿膿不令兒利也須禁食毒物乳

母亦禁之一加木香小兒諸熱一兩為末煉蜜丸

一兩半崔知悌方

麻子大每服五丸至十九蜜湯下

加黃連各三黃九錢氏小兒方

大黃四分以童子小便五六合煎取四合去滓

空腹分為二服如人行五里再服

白濁淋入藥攪勻蒸熟空心食之不過三服愈

簡便相火秘結三錢有厥冷者酒服無厥冷五心

煩密湯服劉諸痢初起錢壯人各一兩水煎服

河間保命集

取利或加檳熱痢裏急煎服取利集簡方忽喘

柳集簡方

悶不能語言涎流吐逆牙齒動搖氣出轉大絕

而復蘇各湯寒併熱霍亂大黃人參各半兩

而復蘇各湯

寒併熱霍亂

大黃人參各半兩

大黃人參各半兩

大黃人參各半兩

大黃人參各半兩

大黃人參各半兩

大黃人參各半兩

水二盞煎一盞熱服
可安
危氏得効方
食已即吐
胸中有火也大黃

水一升煮半升溫服
仲景金匱玉函方
婦人血癖
作痛大黃二兩酒

取利
千金翼
產後血塊
大黃末一兩頭醋半升煮九

久當下
千金方
乾血氣痛
錦紋大黃酒浸晒乾四兩為末

時酒化一丸服
乃調經仙藥也或加香附
二行紅漏自下
婦人嫁

痛
小戶腫痛也大黃一兩酒一
男子偏墜
黃末和

醋塗之乾則
易
梅師方
濕熱眩暈
不可當者酒炒大黃為末

也
丹
小兒腦熱
常安閉目大黃一分水三合浸

上乾即再土
姚和衆至寶方
暴赤自痛
四物湯加大黃酒煎

本草綱目草部卷十七上
七
芥子園