

醫方考綱

六



# 消渴門 第三十五

○本作消

叙曰消渴無水也易義。曰火炎則水乾故消渴責之無水然證有三。○鑑之判病有虛實之分常變不同治療亦異方藥十二考示人以下得耳。

## 丹溪消渴方

黃連末

括蔞根末

人乳汁

藕汁

生芉汁

古稱三消上消者令人消渴此方主之。○氣厥論曰心移熱於肺傳爲膈消夫心火也肺金也金得火而燥故令膈消燥者潤之故用括蔞人汁藕汁。

生苦火原于心故瀉以黃連此言可治者爾又曰飲一洩一者先不治得非以火來賊金之故乎若時熟者主暑門人參白虎湯

△按丹溪曰消渴養肺降火生血爲主須分上中下治云云大法黃連天花粉一味爲末藕汁人乳汁生地黃汁佐以生蜜薑汁爲膏和二味留舌上徐徐以曰湯少許送下能食者加石膏云按此丹溪啓治消渴之一端未曾立爲方法也故其活套云三消者多屬血虛不充津液但宜四物湯爲主治上消者本方加人參五味子麥門冬天花粉煎人生藕汁生地黃汁人乳飲



酒人加生葛汁○中消者本方加知母石膏滑石寒水石以降胃火○下消者本方加黃柏知母熟地黃五味子之類以滋腎水又間當飲繅絲湯爲上策○按本艸插薑根與天花粉雖未曾分出其中不無些斯異應吳氏旣曰丹溪消渴方則當還原名以就天花粉治消渴聖藥之言矣用根作粉潔白美好其味純甘故名天花括蒼根爲末未必如天花之潤枯止渴之純且後學多從簡省或厭煩者多醫方所題之藥務要精詳

調胃承氣湯

大黃

四  
錢

芒硝

五  
錢

甘艸

二  
錢

○史一本作寒下  
同

中消者善食而瀉此方主之○經曰癰成爲消中  
癰者熱也消中者善食而瀉也太黃苦寒可以攻  
熱芒硝寒可以潤燥甘艸甘平可以調中

△按東垣曰膈消者以白虎加人參湯治之中  
消者善食而瘦自汗太便硬小便數叔和謂口  
乾飲水多食飢虛成消中者調胃承氣三黃丸  
治之云云此吳氏取則編方之依怙也愚謂不  
然當是時也精氣被熱火消爍胃中血氣已虛  
豈能消受太黃芒硝之苦寒重渴胃液哉醫者  
臨機審問病情或誤傷於酒色耶誤服熱藥耶

思慮忿怒過制耶。其他一二問得病情明白，  
后藥之是治本也。間以硝黃，抑之乃治標。  
之不中徒損腸胃，轉增其危。須謹護之。稍中片  
標，即當治本輔正可也。張子和慣用泄劑者，也  
於儒門事親立三消當從火斷論用。一千九百  
餘字竟無言及吐下之法者，爲其血耗液消之  
故也。又劉河間二十六論六千五百餘字廣引古  
經諸論，立方八首，亦闕自擬之三乙承氣也。茲  
因旁短事長姑置，弗論唯能者得之。

大黃甘艸飲子

大黃

一兩

甘艸

四兩

大豆

五升

先煮二三沸去苦水再煮

○河間大黃芽艸  
飲子三味用沸水



南京中医药大学图书馆版权所有

一桶煎藥同煮三

五時如渴強更添

水煮豆爛軟爲度

盛於盆中放冷令

病人食豆渴飲湯

水無時候食盡如

燥渴止罷藥未止

依前再煮食之不

過三劑其病悉愈

此治中上二焦消渴之方也○太黃能去胃中熱，甘艸能緩燥急之勢，大豆能解毒家熱毒，冷服者寒因熱用也

六味地黃丸

熟地黃

八兩

山茱萸

山藥

各四兩

白茯苓

牡丹皮

澤瀉

各三兩

下消者煩渴引飲小便如膏此方主之○先有消渴善飲而後小便如膏者名曰下消懼其燥熱漸深將無水矣故用此方以救腎水熟地山萸質潤味厚爲陰中之陰故可以滋少陰之腎水丹皮澤

瀉取其鹹寒能制陽光山藥茯苓取其甘淡能療膏濁

△東垣六味地黃丸東垣曰煩燥引飲耳輪焦乾小便如膏叔和謂煩燥水易虧此腎消也六味地黃丸治之云云或問此非錢氏所定耶曰雖定於仲陽補小兒之腎至於易水師弟始制腎消故云然

八味丸

熟地黃

八兩

山茱萸

肉

山藥

各四兩

白茯苓

牡丹皮

澤瀉

各三兩

恐衍

○肉桂炮之炮字

肉桂

炮

附子

炮去皮臍各一兩

渴而未消者此方主之○此卽前方六味地黃丸加附子肉桂也渴而未消謂其人多渴喜得茶飲不若消渴之求飲無厭也此爲心腎不交水不以濟火故令上液口乾乃是陰無陽而不升陽無陰而不降水上不下不相既濟耳故用肉桂附子之辛熱壯其少火用六味地黃丸益其真陰真陰益則陽可降少火壯則陰自升故竈底加薪枯籠蒸滯稿禾得雨生意維新惟明者知之昧者鮮不以爲迂也昔漢武帝病渴張仲景爲處此方至聖玄闕今猶可想

△金匱腎氣丸本經云男子消渴小便反多以

飲一斗小便一斗腎氣尤主之西昌法律

上接

王太僕註內經云火自腎而起謂龍火龍火當以火逐火則火可滅若以水治火則火愈熾此必然之理也昌更謂用桂附蒸動腎水開闔胃關爲治消渴喫緊太法但至理難明淺見易惑局方變其法爲加減八味丸加五味子一兩半全去附子豈非以五味子之津潤勝於附子之燥熱卽舉世咸樂宗之太惑不解可奈何哉○用藥之說詳見全書愚謂西昌之言是也夫消渴證小便反多嘗之味尚帶鹹者則有可生之理或甘或酸則雖有死而耳此時此侯精於醫

者從用附子燥熱乎或用五味子津潤乎斯猶  
南渡以后敵勢愈強議者唯以割地乞和爲事  
和之不已直至祚亡縱有岳武穆之忠勇而當  
事者不用而反戮此蓋君臣併懦之故也和劑  
之棄附子而加五味子之方殆若是也小便味  
尚不變縱變而淡當以金匱神方蒸動腎水開  
闔胃關味甘酸縱雖神方亦不能濟者亦猶宋  
末文天祥之孤忠非不然也祚已亡吾本經明  
言飲一斗洩一斗者腎氣丸主之至如飲一斗  
洩二斗者俞氏所謂飲入胃中遊溢精氣而上  
則肺通調水道而下今火熱人之高源之水爲

暴虐所迫合外飲之水建瓶而下飲一溲二不  
但不能消外水且并素醞水精竭絕而盡輸於  
下較太腑之暴注暴泄尤爲甚矣故死不治也  
○按仲景先生姓張名機南陽人受業於同郡  
張伯祖舉孝廉官至長沙太守三國志載張松  
見曹操以其川中醫有仲景爲誇后在京師爲  
明醫當時爲上手云然則后漢獻帝建安時人  
也吳氏謂漢武帝病渴張仲景爲處此方云者  
却差三百年事實矣况見于傷寒論自序中歷  
歷可考乎

取朽木方寸者三十枚煎湯飲之得水土中  
者良

此消渴之良方也○經曰熱中消中富貴人蓋以  
消渴之病責之肥甘炮炙嗜酒耽辛之所致也非  
富貴人何以得之朽木年深而質腐腐者水之氣  
水足以制火故腐足以勝焦熱中消中皆焦證也  
故此物主之

△按朽木湯用朽腐之木安能止消渴哉作河  
中朽木或可時珍云凡手足掣痛不仁不隨者  
朽木煮湯熱潰痛處甚良而本艸未載治消渴  
之能也予蚤年從事先達化林公有一貧士患

消渴，兩月服藥不愈。尋請治公曰：貧士無肥，纏難以辨藥餌。可用堤邊近河木樞截作方木，以千里流水煎湯飲之。予教服之，不十日告愈。蓋扶堤之在河水間，不計年月，自朽成樞者，得水土之氣化純也。故制火勝，焦之良能也。速矣！此乃手裁造化，意奪天機。物理之妙，非尋行數墨之事也。

葛花葛根

飲酒消渴宜主。葛花以其善解酒毒，故耳。或用葛根，其功不相上下也。

淡豆豉

喜食肥甘焦炙，令人消渴者，此物宜用益以豆豉。由於盒造味苦而氣竈，苦能勝熱，腐能勝焦，故耳。  
**烏梅**

前有梅林聞者生液，故胃乾，暴渴者宜用之所謂酸，能致液也。

△前有梅林聞者生液，乃曹操征北軍士途中苦渴，乃曹公一時計智之所發也。人之舌下有四竅，兩竅通膽液，梅得木之全氣，故言梅則膽溢觸類相從也。然其人津液未乾者用之可也。稱乾，則不宜用之。方中不得不不用酸收，則五味芍藥輩之事，而非烏梅之所關也。吳氏謂胃乾。



暴渴者宜用又粗疎也故繩胃乾二字

香薷

夏月消渴者多是暑邪入于心包絡宜以香薷君之

比梨甘蓀

○按比字當是北

字李氏本艸曰好

梨多產於北土云  
蓋北梨云者謂  
好梨也

富貴之人飲酒必多置酢醬海味酒能灼人真陰  
鹹能衰人真液故每每病致消渴然酒以釀而濃  
以水而淡鹹以燥而堅以濕而化故食此梨甘蓀  
可以解酒亦可以解鹹冬月宜煮而啖之

人參

凡汗吐下後渴者皆胃液不足宜以人參補之蓋



首  
卷四  
氣能蒸濕故耳

△吐汗下后渴者皆胃液不足以入參補之言乃正法也然富家尚不肯辨其如貧家何以瑞玉膏或肯首焉所以然者倭人不至脉微氣脫不敢服參湯焉

## 水腫門 第三十六

叙曰水由地中行順道也壞山裏陵逆道也治之者行其所無事則智大矣故治水腫者亦因其勢而利導之宜汗宜下宜滲宜清宜燥而藥惟宜焉則醫之大智也考方八首而治水之大可知矣

