

疾飲

羅氏會約醫鏡卷之八

湖南整齋羅國綱振占氏著輯

俊賓初氏

胞弟羅國興盛世氏校定

英冠羣氏

男定鴻
泰編次

論反胃噎膈十六

經曰三陽結謂之膈。三陽者大腸小腸膀胱也。結者謂熱結也。

大腸主津。小腸主液。大腸熱結。則津涸。小腸熱結。則液燥。膀胱爲州都之官。津液藏焉。膀胱熱結。則津液竭矣。然而三陽何以致熱結。皆腎之病也。蓋腎主五液。與膀胱爲一臟一腑。腎水既乾。則陽火偏盛。煎熬津液。變而爲痰。初則痰火未結。咽膈乾燥。飲食不得流通。則爲噎。膈久則痰火已結。胃之上脘不開。飲食難下。停滯膈間。須臾便出。謂之嘔吐。至於飲食雖進。停滯胃中。而胃之下脘不開。良久方出。謂之反胃。腎又主二便。三陽熱結。前後亦必閉。下既不通。必反於上。所以或久或暫。復吐原物。雖屬胃病。實由命門火衰。腎經虛寒之病。而水不能灌溉而然。

論此病治
之宜早

也。斯時方欲健脾理痰，恐燥劑有妨於津液。方欲養血生津，恐潤劑有碍於中州。若泥於舒鬱快膈，則辛香助火，散氣耗血。胃中之汁速乾，去死不遠矣。夫噎塞由於津液乾稿，故莫如養血養血，又莫如滋陰。六味丸是也。反胃由於胃脘虛寒，故莫如辛溫。辛溫則不如補火。八味丸是也。但此方惟於病初起時丸藥可下，急爲救本可也。若丸不能下，或下而復反，此時改用湯劑，有所不可。蓋欲入下補腎，不知先滯中州。濕脾又不如用後桂附散，或可挽回。大凡人得此病者，治之宜早。以真火有根，培之則活。若熱湯入而水與痰卽刻逆上，吐出冰冷者，是火絕矣。雖

論病之由來

用桂附亦何益哉。王太璞云。食不得入。是有火也。予謂是無水也。以津液乾竭故耳。至於所言食入反出。是無火也。此說中。腎但脉大有力。當作熱治。脉小無力。當作寒醫。以脉合證。審其陰陽。火盛者。當以養血爲急。勿用涼藥。脾傷陰盛者。宜以溫補爲重。勿用燥劑。變動因心。不可偏執也。黃帝針經云。胃病者。膈咽不通。飲食不下。咽者。嚥物之門戶。膈者。心肺之分野。不通者。腎肝吸入之陰氣。不得下而反在上。病在胃也。夫胃病者。平日氣血虧損。復因悲思憂慮。則脾胃受傷。血液漸耗。胃脘乾澁。飲食難進。噎塞所由成也。脾胃虛傷。運行失職。不能熟腐五穀。變化

精微食入復出反胃所由成也。二者在膈間受病。故通名爲膈。經曰人迎四倍以上爲格陽。寸口四倍以上爲關陰。關格者內經以脉論。非言病也。究之陰陽偏盛之極爲孤陽之逆候。實眞陰之敗竭也。論脉論病。議雖不同而爲害則一。諸家以關格爲病名。可顧名而思義矣。

凡人入房太甚。只有孤陽。大宜養陰爲主。絕嗜慾。戒惱怒。薄滋味。却思慮。外治以藥餌。庶可挽回而壽終矣。

論脉

脉弦者爲中虛。浮大者爲陰虛。屬腎水大虧。有陽無陰也。數而

無力。或瀉小為血虛。沉緩無力。或大而弱為氣虛。緊而滑者吐逆。弱小而瀉者反胃。弦滑為痰。寸緊尺瀉。胸滿而吐。革則吐逆。

死證

年五旬難治。

能調治保養亦有生者

糞如羊屎者不治。

食少津盡腸已乾矣

吐白沫

者不治。

飲水上騰脾敗不化也

胸腹嘈痛者死。

營虛血枯也

治血燥噎

潤燥湯

新

治噎塞而食不下者。

火燥而津液枯也。宜養血以潤之。

當歸 二錢

熟地

再用姜汁入磁器內炒乾二錢

麥冬

去心炒一錢

陳皮

白

八分 威參 四錢

白豆蔻

去殼炒研八分

肉蓯蓉

錢半

水煎加牛乳

白蜜竹瀝姜汁各四五匙。合服。每用半盃。頻頻服之。不得間。

斷或食稀粥或猪肉湯。羊肉湯。至於飯食雞鴨炙燂之類忌之。如是者調養幾月待津液一足方可無虞。服藥而有氣不足者加人參最妙。否則或加沙參黃芪之類。但由輕而重不得頓加。

治食入反出

桂附散

新

治飲食一下痰水同吐多而且冷藥下亦吐火將熄

矣

上肉桂

去粗三錢

製附子

或用生者焙乾三錢

乾姜

炒黃一錢

白豆

蔻肉

炒一錢

共研極細末時常挑於口中以火酒運下

治血膈

潤腸化瘀湯

治死血在膈大便秘脉吼證實

當歸

三錢

生地

錢半

乾漆

炒烟盡二錢

大黃

酒煨錢半

陳皮

一錢

治氣膈

枳殼炒一錢

威參四錢

紅花酒炒七分

桃仁去皮尖一錢

水煎入

酒韭汁服。

香砂寬中湯

治氣滯胸痞。胃寒嘔吐。

木香生磨三分

白木錢半

茯苓 厚樸姜炒各一錢

陳皮去白

檳榔 白豆蔻肉炒研

半夏各八分

青皮六分

甘草三分

香附 砂仁各七分

生姜一錢。水煎入蜜五六匙合服。

治寒膈

四逆湯

治裏寒外熱。面赤煩躁。口渴乾嘔。脉微欲絕。

附子一枚生用

乾姜炒一兩

甘草炙二錢

水煎。米泔服。

代赭旋覆湯

治胃氣弱而上逆。心下痞鞭。并反胃噎食俱炒。

胃噎

治咽喉阻
塞

代赭石

煨醋淬
二錢半

旋覆花

即金沸草
七錢半

甘草

炙四錢

半夏

生薑

一兩

紅棗

三枚

水煎溫服

加人參更妙

生薑汁煎

治噎食不下

咽喉閉塞

胸膈煩悶

生薑自然汁

六兩

牛乳

五兩

百合

二兩

加人參更妙

共入銅

銚內慢火熬成膏。常用二匙嚥下。

治脾虧痰
甚反胃

香砂六君子湯

治脾胃虛寒

飲食一下

即帶冷痰水退出

人參

少者以沙參或條
參三五錢代之

白朮

錢半

茯苓

二錢

甘草

炙一錢

陳皮

去白

藿香

各一錢

法半夏

姜汁炒
錢半

砂仁

去殼微炒
搗碎八分

煨姜

一錢

水煎服如下

喉即吐者加桔梗

一錢

胃寒者加炒

治血燥噎
塞

二法盡之矣

乾姜一錢。氣滯者加香附。童便炒六分。兼血燥者加當歸錢半。白蜜三錢。若中焦胃不納者加石菖蒲微炒。白豆蔻仁微炒。搗碎八分。但要順取。流水煎服。凡上焦之噎膈其責在脾。下焦之閉結其責在腎。治脾者宜從溫養。治腎者宜從滋潤。

大營煎 治噎膈便結陰虛無火者此血燥也

當歸 二三錢

熟地 三錢

枸杞 二錢

炙草 一錢

杜仲 半錢

牛膝

酒蒸 錢半

肉桂 一二錢

肉苁蓉 三錢
酒洗

水煎服。如氣虛者加人

參。若中氣虛寒嘔惡者加炒乾姜一錢。如乾燥之甚者加蜜

糖三四錢生威參七八錢得大便潤而下之早服八味午服
六君子湯如氣血未至大虛而下焦脹閉之甚者則不得不
暫爲通之

治便秘腸
關

千金潤下丸 治大便秘結。脹悶之甚而脉未至大虛者。

大麻仁微炒一兩

郁李仁泡去皮

兔絲子酒蒸

枳殼麩炒

牛膝

山藥酒浸

車前子各七錢

肉苁蓉酒洗兩半

威參蜜蒸二兩

大黃酒蒸兩

陳皮去白五錢

桃仁去皮五錢

先將威參大黃杵成

膏。後加藥末煉蜜爲丸。白湯送下。四十丸。早晚各一服。若腸
潤而肛門緊用猪胆汁少加皂角末。和以導之。便下宜止。卽

服滋陰養胃之劑以扶其本。

脩據古來治膈至簡至穩神方於後以便取用

柿餅燒灰存性酒調服一錢日三服或以柿餅於飯上蒸熟同乾飯食之旬日愈有三世死於反胃者得此方救○噎食不納用華澄茄白豆蔻肉爲末乾舂之○噎塞膈滯用威靈仙四錢醋蜜煎服痰吐卽愈○喘咳嘔逆全不入食用威靈仙焙乾半夏姜汁炒等分爲末皂角熬膏糊丸綠豆大每服七丸日三服一月愈九卽止○噎塞吐食以胃脘停有痰血之類故胸中刺痛用韭汁入鹽鹵少許細呷得入漸加定吐

稠痰而愈。若反胃加姜汁牛乳。反胃吐食七八日不大便者。死。用水牛喉一條。去兩頭并筋膜。節節取下。米醋一碗。浸之。微火炙乾。再浸。再炙。以醋盡爲度。研末。密收。或潮濕。以微火烘之。再收。遇有此病。每用錢餘。陳米湯調下。輕者一服立效。反胃用石灰熱姜汁泡之。淬炒附子三次。合丁香粟米煎服。或爲末。舐服。脾寒反胃用白豆蔻肉丁香砂仁陳米等分爲末。姜汁糊丸服。胃虛食少用華澄茄一兩神麴三錢炒黃姜汁糊丸。姜湯送下。膈噎揀蒲公英高尺許者。掘下數尺。根大如拳。搗汁酒服。如神。噎膈是胃槁也。服香燥藥。

必破氣燥血。是速其死也。惟飲牛乳加姜汁。陳酒或加韭汁。熟蜜。兼服四物湯。爲上策。不可服人乳。以有五味之毒。七情之火也。反胃吐食。不拘男女。遠年近月。用五靈脂。有瘡心者真爲末。黃狗胆汁和丸。三錢重一粒。每用一粒。好酒半盞磨化。服三服卽效。

論痞滿十七

痞者。痞塞不開。而內則不見脹也。滿者。脹滿不消。而內則常苦脹也。二者有虛實之辨。實痞者。有邪有滯。實滿者。有脹有痛。治者。散之消之。虛痞者。無邪無滯。虛滿者。胃弱食少。久日不大。則

治脾虛痞

之此而誤認多致誤人

治中湯

治脾胃虛寒雖無脹悶但不知饑亦不欲食脉弱氣

怯不得妄用消耗再損胃氣

人參

少者以山藥三錢炒黃代之

白朮

錢半

甘草

炙

乾姜

炒

陳皮

去白各一錢

青皮

六七分

溫服如嘔逆加半夏錢半如脾胃虛

弱似滿不食宜異功散人參白朮茯苓炙草陳皮如心脾氣

虛或氣不順者宜歸脾湯

方載脾胃門

如中焦不煖或暖腐或吞

酸宜溫胃湯

方見脾胃門

治胃寒痞

厚朴溫中湯

治脾胃寒滯或傷生冷心腹痞滿疼痛

治氣秘痞

治食滯痞

厚朴姜炒

陳皮去白

乾姜炒

茯苓各一錢

草豆蔻

八分

木香

甘草

各五分

溫服

河澗厚朴湯

治大便氣秘。上下不通。胸腹痞滿。

厚朴

錢半

白朮

錢二

半夏

枳殼

陳皮

甘草

各一錢

姜枣引如大便不通。加大黃一二錢。

大和中飲

治飲食留滯痞滿。或疼痛者。

陳皮

錢半

枳實

錢一

砂仁

分五

山查

麥芽

炒各二錢

厚朴

姜炒

澤瀉

各錢半

溫服。如脹甚者。加白芥子。如胃寒惡心者。加炮

乾姜。痛者。加木香。烏藥。香附之屬。