

臟腑圖說症治要言合璧卷下

足太陽膀胱經

膀胱之脈起於目內眥上額交巔入腦下項循行肩膊夾脊抵腰循脊脊絡腎

屬膀胱其支者從肩膊貫胛復從腰脊下行由膝後曲處貫脚肚至足小指外

側至陰穴止太陽為諸陽之長風寒之來必先由太陽而入太陽傷風之症頭

痛發熱有汗惡寒發熱者發於陽也無汗惡寒發熱者發於陰也若其人頭項

強痛鼻鳴乾嘔噎噎惡寒淅淅惡風翕翕發熱無論有汗無汗脈來浮緩者陽

於風也桂枝湯主之若其人頭痛身痛腰痛骨節痛發熱惡風無汗而喘脈陰

陽俱緊者傷於寒也麻黃湯主之若發汗後而煩渴脈浮數者津液為熱所耗

非細故也急服五苓散若其人發熱惡寒身疼痛無汗而煩躁脈浮緊者風寒

兩傷也大青龍湯主之若發汗後其人發煩熱目瞑而流鼻血及未經發汗流

鼻血而脈浮緊者仍以麻黃湯主之若其人無身體疼痛又無發煩目瞑只流

鼻血者受寒甚輕寒隨衄愈不可再服麻黃湯若其人形似傷寒頭痛發熱渴

而不惡寒脈來不弦緊而弱者瘟病也銀翹散與九味羌活湯主之此治太陽



外感之法也。膀胱與腎相表裏。以小腸為嚮導。膀胱熱甚。則下焦壅塞。小便不通。膀胱寒甚。則氣化不行。小便遺溺。膀胱熱甚。溺塞者。左尺之脈必洪大。導赤散合四苓湯。膀胱寒甚。氣化不行。小便遺溺者。桂附地黄丸。去澤泄。加益智仁主之。

足太陽膀胱經列方

桂枝湯

仲景

治太陽中風。陽浮而陰弱。發熱而痛。自汗。惡風。惡寒。鼻鳴。乾嘔。及

陽明病。脈遲。汗出多。微惡寒。表未解者。

桂枝

芍藥

生姜

三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

熟服。須臾啜稀熱粥。以助藥

力。溫覆取微似汗。不可令如水淋漓。汗出病瘥。停後服。服一劑盡。病症猶

在者。更作服。太陽病發汗。遂漏不止。惡風。小便難。四肢微急者。加附子。

若太陽症未罷。醫者誤下。表邪乘虛入裏。胸不滿而肚腹時痛者。本方減

甘草一半。加芍藥一倍。若大實大痛者。依本方加大黃。若下之後。病微

喘者。表仍在也。本方加厚樸杏仁。若傷寒八九日。風濕相搏。身體痛煩。

不能轉側。不嘔不渴。脈浮虛而濡者。加附子去芍藥。若汗後身痛。脈來



沈遲者。本方加芍藥。生姜各一倍。更加人參三兩。
人參議

按古方概用人參。方下註云。無人參者。以沙參代之。今時所用沙參。功力不及上古。故又有代以高麗參。洋參。潞黨參。防黨參。明沙參。蘇條參。五竹參者。高麗參價值甚昂。貧者無力構買。近時復多假冒偽作用者。難於辨識。不唯無益於醫。而且有損於病。不如選用時下各參。但性味不同。必須先為辨識。臨症方有把握。沙參色白。體輕。味甘淡而浮。補肺虛而兼實表。清肺熱。可以入表散藥中。及肺經有虛熱者。洋參色白。體堅。味微苦。入肺兼入心腎。肺虛而心腎有熱者。宜之。潞黨參色黃。味甘。心有花紋如菊。體柔和。補肺氣而兼補脾胃。肺脾虛弱者。宜之。防黨參色白。味微甘。心亦有花紋如菊。性體堅硬。入肺脾兩經。但滋補之功。不及潞黨。益氣之力。勝於沙參。明沙參。即俗稱明黨。參色微黃。味甘而淡。入脾兼入肺腎。但皮骨多自脫離。可以入補脾藥中。若用以入肺。其功不及沙參。蘇條參。即防黨參刮去外皮而造作者。味淡而不甘。色白而體細。可以入表散藥中。實表以

祛邪但不能如沙參之兼清肺熱。補中有瀉。不燥不寒。藥雖微而功效鉅也。玉竹參色白味甘。性柔和。體滋潤。補肺生津。功力稍緩。如多用獨用。亦可取效。以上各參。隨病斟酌。取用一味。以代人參可也。

麻黃湯

仲景

治傷寒太陽症。邪氣在表。發熱頭痛身痛。腰痛骨節痛。項背強。惡風寒。無汗而喘。脈浮而緊。亦治太陽陽明合病。

麻黃

三兩

桂枝

二兩

杏仁

七枚

甘草

一兩

先煮麻黃數沸。去沫。

入諸藥煎。

熱服。覆取微汗。中病即止。不必盡劑。無汗再服。發汗後。汗出而喘。無大熱者。去桂枝加石膏。感冒風寒。咳嗽鼻塞者。去桂枝名三拗湯。

忌汗諸症

咽喉燥乾者。不可發汗。津液不足也。

咳而小便利。若失小便者。不可發汗。肺腎虛冷也。

下利雖有表症。不可發汗。恐走津液而損胃也。

淋家不可發汗。發汗必便血。亡耗津液。反增客熱也。

衄家諸失血家。不可發汗。發汗則陰陽俱虛。病轉危也。



瘡家雖傷寒身痛不可發汗。汗之則表虛熱盛。變成瘡也。

汗家不可重發汗。汗之必恍惚心亂。汗為心液故也。

少陰病。脈沈細數。病為在裏。不可發汗。汗之則大便難而譫語。

傷寒壞病。及女人經水適來。不可發汗。汗之則變症百出。

寸脈弱者。不可發汗。汗之則亡陽。

尺脈弱者。不可發汗。汗之則亡陰。

臍之上下左右。有動氣者。不可發汗。汗之則病轉危殆。

大青龍湯

仲景

治太陽中風。脈浮緊。身疼痛。發熱惡寒。不汗出而煩躁。又治傷

寒。脈浮數。身不痛。但重。乍有輕時。無少陰症者。

麻黃

六兩桂枝

甘草

二兩

杏仁

四十枚

石羔

大鷄子

生姜

三兩

大棗

十二枚

先煮麻黃去沫。入諸藥煎。一服汗者。止後服。

銀翹散

瘟疫

治膚熱頭痛。微惡風寒。身熱自汗。口渴。或不渴而咳。午後熱甚。

及但熱不惡寒而渴為瘟病者。

連翹 一兩 銀花 一兩 桔梗 六錢 薄荷 六錢 竹葉 四錢 甘草 五錢 芥穗 四錢



南京中醫藥大學圖書館藏

淡豆豉 五錢 牛旁子 六錢

右杵為散。每服六錢。鮮葦根煎湯。香氣大出。即取服。勿過煮。肺藥取輕清。過煮則味厚而入中焦矣。病重者約二時一服。日三服。夜一服。輕者三時一服。日二服。夜一服。病不解者。作再服。胸膈悶者。加藿香三錢。鬱金三錢。護臚中。渴甚者。加花粉。項腫咽痛者。加馬勃元參。衄者。去芥穗。豆豉加白茅根三錢。側柏炭三錢。梔子炭三錢。咳者。加杏仁。利肺氣。二三日病猶在肺。熱漸入裏。加細生地。麥冬。保津液。再不解。或小便短者。加知母。黃芩。梔子之苦寒。與麥地之甘寒。合化陰氣。而治熱淫所勝。

九味羌活湯

元素

治傷寒傷風。憎寒壯熱。頭痛身痛。項痛脊強。嘔吐口渴。太陽

病無汗。及感冒四時不正之氣。並瘟病熱病。

羌活

防風

蒼朮

半錢

細辛

五分

川芎

白芷

生地黄

黃芩

甘草

錢

加生薑

葱白煎。如風症自汗者。去蒼朮。加白朮。黃芪。胸滿去地黃。加枳壳。

桔梗。喘加杏仁。夏加知母。石膏。汗下兼行。加大黃。藥備六經。治通四時。用者當隨症加減。

五苓散

仲景

治太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲飲水者少少與

之令胃氣和則愈。若脈浮小便不利微熱消渴者此湯主之。又治中風

發熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲水水入即吐名曰水逆及傷寒

痞滿服瀉心湯不解渴而煩躁小便不利者

猪苓

茯苓

白朮

炒十八銖澤瀉一兩六銖半桂半兩

共為末每服三錢服後多飲熱湯汗出而愈

有表症用桂枝雜病用桂

四苓散

仲景

通治諸濕腹滿水飲水腫嘔逆泄瀉水寒射肺或喘或咳中暑煩

渴身熱頭痛膀胱積熱小便祕塞等症

猪苓

茯苓

白朮

炒十八銖澤瀉一兩六銖半

為末每服三錢

導赤散

錢乙

治小腸有火便赤淋痛面赤狂躁口糜舌瘡咬牙

生地黃

木通

甘草稍

淡竹葉

等分煎服

六味地黃丸

仲景

通治肝腎不足真陰虧損精血枯竭憔悴羸弱腰痛足酸自

汗盜汗水泛為痰發熱咳嗽頭暈目眩耳鳴耳聾遺精便血消渴淋瀝失

血失音舌燥喉痛虛火牙痛足根作痛下部瘡瘍



地黃

砂仁酒拌九兩

山萸肉

酒潤

山藥

四兩

茯苓

兩

澤瀉

三兩

右蜜丸空

心益湯下。虛而遺溺者。去茯苓加益智仁三兩。

桂附地黃丸

即前方加肉桂附子各一兩。以補命門真火。

此仲景八味丸原方也。錢氏仲陽減去桂附。用治小兒諸疾。今用通治大

小疾。王冰所謂益火之原以消陰翳者。六味丸加桂附是也。所謂壯水之

之主以制陽光者。桂附地黃丸加黃柏知母各二兩是也。桂附八味丸尺

脈弱者宜之。知柏八味丸尺脈旺者宜之。金匱桂附八味丸加車前并膝

名腎氣丸。用治蠱脹亦治消渴。

手太陽小腸經

小腸之脈起於手小指之端。由手臂出肘上肩。繞肩胛直絡心中。循咽嗑下膈。

抵胃屬小腸。其支者從肩下橫骨上頸頰抵鼻。至於目內眥。與足太陽膀胱相接。

復由目內眥入耳中。至聽會穴止。與心經相表裏。以膀胱為化導。小腸上口接

胃之下口。小腸下口接大腸之上口。此處分別清濁。以清者滲入膀胱。以濁者

歸於大腸。如心熱不已。則移熱於小腸。心寒不已。則移寒於小腸。小腸熱盛則

耳痛。噤痛。頸腫。頰腫。頭目疼痛。及尿血淋閉。或小便短赤痛澀。小腸寒盛。則耳聾目黃。小便不禁。及渾濁遺溺。小腸有熱。尿血不痛者。生地四物湯。如割痛難忍者。瘀血蓄於莖中也。方內加紅花。桃仁。淋瀝短赤者。萹蘆分清飲。閉塞者。以正散。耳痛。噤痛。頭目疼痛。及頸腫頰腫者。如聖散。小腸有寒。則小便自遺。膀胱失化。則小便自遺。腎氣虛。肺氣陷。則小便亦自遺。膀胱失化。而自遺者。桂附地黃丸。去澤瀉。加益智仁。主之。腎虛者。耳必聾。小便必渾濁。六味地黃丸。主之。陽氣下陷者。目必黃。氣必不接。補中益氣湯。主之。若久病淋瀝。服通利小便藥過多。而淋瀝不愈者。仍服補中益氣湯。遺溺一症。唯老人與小兒獨多。老人多挾寒。宜服十全大補湯。小兒多挾熱。宜服六味地黃丸。並服鷄腸散。

手太陽小腸經列方

生地四物湯

治一切血虛血熱吐血衄血尿血腸風下血血痢及婦人月

經不調崩中等症

當歸酒洗 生地黃 三錢 芍藥 二錢 川芎 錢半

小腸熱結加山梔仁木通如

有血瘀莖中加桃仁紅花

凡治血症通用四物湯如欲涼血心加黃連肝加條芩肺加枯芩大腸加枳實黃連腎膀胱加黃柏脾加生地胃加大黃三焦加地骨皮心包絡加丹皮小腸加山梔如欲瀉氣心與心包絡加麥冬肺加枳殼肝加柴胡青皮脾加白芍胃加乾葛石羔大腸三焦加連翹小腸加赤茯苓膀胱加滑石血虛加龜板血燥加人乳瘀血加桃仁紅花韭汁重便行之暴血加薄荷元參散之血不止加炒蒲黃京墨久不止加升麻引血歸經婦人經血紫黑脈數為熱加黃芩黃連血淡脈遲為寒加肉桂附子人肥有痰加半夏南星橘紅人瘦有火加黑梔知母黃柏鬱者加木香砂仁蒼朮神麴經血瘀滯加桃仁紅花延胡肉桂氣虛加人參黃芪氣實加枳實厚樸

十全大補湯

治氣血併虛陰陽兩竭此藥極能助陽固衛

大熟地

錢四

人參

錢三

白朮

炒

當歸

茯苓

錢二

白芍

一錢

川芎

一錢

炙甘草

五分

黃芪

錢二

肉桂

分六

生薑

三片

棗二枚

煎服

萆薢分清飲

治陽虛白濁小便頻數凝白如油名曰膏淋

川萆薢

石菖蒲

烏藥

益智仁

等分

甘草稍

減半

入鹽少許食前服一方有茯苓

八正散局 治濕熱下注咽乾口渴少腹急滿小便不通或淋痛尿血或因尿

熱秘閉為腫

車前仁 木通 瞿麥 扁蓄 滑石 甘草梢 梔子 炒黑

大黃

各等分加燈草煎一方有木香

如聖散

治節

治剛柔二症

瘕者太陽中風重感寒濕而為病者風則燥而動寒則引而緊濕則着而拘故頭搖口噤項強反張筋急

抽搖無汗為剛瘕有汗為柔瘕

面赤項強頭搖口噤角弓反張與瘕瘕

音纖

同法並治頸

羌活

防風

白芷

柴胡

甘草

黃芩

半夏

川芎

芍藥

當歸

烏藥

加姜煎入姜汁竹瀝服

柔瘕加白朮桂枝

剛瘕加蒼朮麻黃

口噤咬牙大便實加大黃

尋常頭目疼痛頸腫強項只用姜煎

鷄腸散

專治小兒遺溺屢試屢驗

鷄腸一具

洗淨焙乾男用雄女用雌桑蛸七個

益智仁 炒五錢

共為末每服三錢米飲下。

補中益氣湯

治煩勞內傷身熱心煩頭痛惡寒懶言惡食脈洪大而虛或

喘或渴或陽虛自汗或氣虛不能攝血或瘧痢脾虛久不能愈一切清

下陷中氣不足之症

黃芪

錢半

人參

甘草

一錢

白朮

土炒

陳皮

留白

當歸

各五分

升麻

三分

柴胡

三分

姜三片

枣二枚

煎服

血不足加當歸

精神短少加人參

肺熱咳嗽去人參加桑皮杏仁

喘乾加葛根

頭痛加蔓荊子痛甚加川芎

腦痛加藁本細辛

風濕

相搏一身盡痛加羌活防風

有痰加半夏生姜

胃寒氣滯加青皮菴

仁木香益智

肚腹膨脹加枳實厚朴木香砂仁

肚腹疼痛加芍藥甘

草熟痛加黃連

能食而心下痞加黃連

咽痛加桔梗

濕勝加蒼

木

有寒加肉桂

陰火加黃柏知母

陰虛去升麻加熟地山萸肉山

藥

寒勝加附子

大便秘加酒煨大黃

咳嗽春加旋覆花款冬花

夏加麥冬五味子

秋加麻黃黃芩

冬加不去根節麻黃

天寒加乾

姜 泄瀉去當歸加茯苓蒼朮益智仁 瘧痢加黃芩木香

六味地黃丸

桂附地黃丸

俱見太陽膀胱列方內

足陽明胃經

胃經之脈起於鼻額循鼻外入上齒環唇下腮由耳前髮際上至額顙其支者循喉嚨下膈屬胃絡脾經其直者下乳挾臍復由胃口行腹裏過氣街下行膝蓋貫脚面從足中指通入足大指厲兌穴止傷寒表散未透邪入陽明胃腑微發煩小便數大便因硬者與小承氣湯和之腹脹滿者與調胃承氣湯若腹滿潮熱繞臍痛大便硬煩躁譫語者大承氣湯下之若下痢譫語者有燥屎也宜小承氣湯若渴欲飲水口乾舌燥腹滿而喘者人參白虎湯若脈浮而發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯若但頭汗出劑頸而還身無汗小便不利渴飲水漿者此為瘀熱在裏身必發黃可與茵陳蒿湯若發熱頭痛脇痛寒熱猶在表症未除復煩渴譫語腹滿便秘脈洪或沈實弦數者急與大柴胡湯胃屬中土主納受水穀胃如過健則消食善飢胃如不強則飲食難下胃如有熱則目痛



鼻乾唇焦面浮腫兼發斑疹右關脈必洪大胃如有寒其唇必白其胃腕必痛必發吐必發噎膈右關脈必軟弱胃過健者歸芍四君子湯補脾以平胃胃不強者香砂六君子湯開胃以健脾胃有熱而唇焦面腫鼻乾目痛者葛根湯若發斑疹加大力子重則三黃瀉心湯白虎湯調胃承氣湯胃寒而吐者砂仁二陳湯加乾姜噎膈者啟膈散胃腕急痛者寒盛也四逆湯加肉桂丁香砂仁痛而痞悶者氣滯也痛而不走者血滯也氣滯木香順氣湯血滯失笑散痰結者痛連胸脇水結者腹內咽咽作聲無論痰結水結但見胃腕作痛胸膈脹滿痛而乾嘔腹內腸鳴者通用十棗湯

足陽明胃經列方

調胃承氣湯

治傷寒陽明症不惡寒反惡熱口渴便閉譫語腹滿中焦燥

實及傷寒吐後腹脹滿者及陽明症不吐不下而心煩者亦治渴症中消

善食而溲

大黃

酒浸

芒硝

一兩

甘草

炙五分

少少溫服

小承氣湯

治傷寒陽明症

譫語便硬潮熱而喘及雜病上焦痞滿不通並

支飲胸滿者

大黃

四兩

厚朴

姜炒二兩

枳實

麴炒三枚

水煎熟服

大承氣湯

仲景

治傷寒陽明腑症

陽邪入裏

胃實不大便

發熱譫語

自汗出不

惡寒痞滿燥實全見及雜症三焦大熱脈沈實者亦治胸滿口噤臥不着

席寧足齟齒而無汗者

大黃

酒洗四兩

芒硝

三合

厚朴

半斤

枳實

五枚

先煎朴實將熟入大黃煮

二三沸傾碗內和芒硝服得利即止

忌下諸症

傷寒太陽症外症未解者不可下下之則成結胸

身惡寒脈浮大者病尚在表不可下下之則成痞氣

太陽陽明合病胸滿而喘者不可下下之則成痞滿

欲吐欲嘔者邪在上焦不可下

惡水者不可下下之則胃冷不嗜食完穀出

陽氣微者不可下下之則逆呃

陽氣微者不可下下之則逆呃



尺脈弱澁者不可下。下之則亡陰。

臍上下左右有動氣者不可下。下之則變病百出。

咽中閉塞者不可下。下之則下輕上重。水漿不入。

病人平素胃弱不能食者不可下。

小便清白者不可下。

病人腹滿時減。減時如故者不可下。

頭眩目黃者不可下。

病人手足厥冷者不可下。

雜病中有高年血燥大便不通者不可下。有婦人新產去血過多大便不

通者不可下。有病後亡津液大便不通者不可下。有亡血家血虛失潤

大便燥結者不可下。有汗出過多津液不足大便燥結者不可下。有日

久不大便腹中並無所苦者不可下。

人參白虎湯。

治傷寒脈浮滑。表有熱裏有寒。及三陽合病。脈浮大。腹滿身

重。難以轉側。口不仁而面垢。譫語遺溺。發汗則譫語。下之則頭上生汗。手



足逆冷自汗出者。通治陽明病。脈洪大而長。不惡寒。反惡熱。頭痛自汗。口渴舌胎。目痛鼻乾。不得臥。心煩躁亂。日晡潮熱。或陽毒發癰。胃熱諸症。

石羔一斤 知母六兩 甘草二兩 粳米六合 人參三兩 先煎石羔數十沸。再投藥米。米熟湯成。溫服。

猪苓湯仲 治陽明病。脈浮發熱。渴欲飲水。小便不通。少陰病。下利六七日。咳

而嘔。渴心煩不得眠。通治濕熱黃疸。口渴溺赤。

猪苓 澤瀉 茯苓 滑石 阿膠 各一兩 水煎服。

茵陳蒿湯仲 治傷寒陽明病。但頭汗出。腹滿口渴。二便不利。濕熱發黃。脈沈

實者。

茵陳蒿 六兩 大黃 酒浸二兩 梔子 炒十四枚 水煎服。

大柴胡湯仲 治傷寒發熱。汗出不解。陽邪入裏。熱結在裏。心下痞硬。嘔而下

利。或往來寒熱。煩渴譫語。腹滿便秘。表症未除。裏症又急。脈洪或沈實弦

數者。

柴胡八兩 半夏半斤 黃芩 芍藥 三兩 生姜 五兩 大棗 十二枚 枳實 四枚