

S294

1559

部3冊

泰西裏紮新法圖解

異症怪疾
紮法全圖



泰西裏紮 新渡

俞曲園題
於蘇臺




今將裏紮各式形圖列左




圖一第




圖四第



圖七第




圖十第



圖二第



圖六第




圖八第




圖三第



圖五第



圖九第



圖一十第




圖三十第




圖二十第


南京中醫藥大學圖書館版權所有




圖六十第



圖四十第




圖五十第




圖八十第




圖七十第



圖一十第




圖十二第




圖九十第



圖五廿四廿第



圖三十第



圖二十第



中國醫藥大學圖書館藏



圖 六 廿 第




圖 八 廿 七 廿 第




圖 九 廿 第




圖 一 十 三 第




圖 十 三 第



圖 二 十 三 第



圖 三 十 三 第


UNIVERSITY OF CHINA
中醫藥大學圖書館版印所



圖五十三第



圖四十三第



圖九十三第




圖七十三第



圖六十三第




圖八十三第




圖一十四第




圖十四第




圖三十四第




圖二十四第





圖七十四第



圖四十四第



圖五十四第



第四十八圖此
圖因脚生瘡先敷
以合口膏後用布
帶紮之是也

第四十九圖此
因脚迴血管生大
即用布裏緊以線
縫密其口是也



圖六十四第

繪圖中西裹紮新法

美國 嘉約翰口譯

莆田 林湘東筆述

論割症裏紮諸法

割症一道。醫者固當洞悉全體血管部位。及胸有定見。方可下刀。若割後敷藥裏紮。尤宜小。蓋務使其骨肉交粘。方為妥適。即至換藥巡視之人。仍當鄭重。倘不加意。縱使割得甚妥。亦反無益也。大抵割口血水。宜先拭清。次則敷以藥膏。令其滋潤。倘或天氣之不齊。毋使侵入衣裏之相礙。毋使觸傷。又況裏以布包。紮以布帶。尤貴平時嫻熟。至收口有宜於速者。有不宜於速者。神而明之。存乎其人。誠以此中治法。概宜精細也。學醫者。欲知其詳。須玩下文。

一 凡遇割症。所有應用之物。如海絨藥膏。棉花布袋等項。宜先預備。以免臨時窒手。

一 凡器具通用之物。貼皮包內者。首先自開鉗。次則手鉗與血管鉗。其餘曲直二鉗。剪銀針。坑針。割刀。鉤刀。刺膿瘡刀。開膏藥刀。及男女放尿管。銀丹甬。綁血管線等物。均宜次第預備。

一 自開之鉗。用以鉗去腐肉血線。及污穢布等物。此固可代醫者之手。且免沾其污毒也。

一 血管鉗。蓋取其鉗口畧圓。凡用以拊血管。須先繫之以線。俟拊起而線即褪下。綁實。頗微妙用。

一直絞剪。用以剪去各項什物。曲絞剪。用以剪去貼肉之物。至補崩口者。與其用曲剪。不如用直刀之妙捷也。

一探針。原藉以代手指之用。倘能用指探入傷口。則尤勝探針。蓋以指具知覺。而所探較真也。一坑針。較大於探針。蓋其中有一坑路。能帶刀直入也。但割時宜左手持定。勿使偏側。始可下刀。

一割刀。有數種。長短大小。各有所宜。但審何症用之可也。

一膏藥刀。固用以開勻膏藥。亦可用刮去皮膚之腐。

一銀丹甬。乃用銀製成。其形恍如筆管之目。其口畧較。但甬口則以白金為之尤妙。其或甬骨用銀製者。未幾必爛。至用銀丹點眼。宜先以濕布抹去。庶為合用。

一外治瘡口。有用麥糠合口膏。即隔收口膏。紙膏。又有用大針穿其數線。刺入皮肉。時或動之。而令其發膿。

以棉花。或布碎。

而藉口蓋護傷口者。又有用大針穿其數線。刺入皮肉。時或動之。而令其發膿。

者。且更有淋水之法。俾病者除其熱。去其污。而使之安然者也。

一擦絨體毛。輕軟。最為合用。嘗有家中自作擦絨者。法用白洋麻布一幅。用舊的。先將其布四角繫定。即用刀刮之。刮至有毛絨浮起為度。然仍不及機器所製之佳也。法國有善作擦絨



者其法用白洋布一幅方長約三四寸即將布內紗線每條折開由是用法安排則隨意或作絨布或作線笋樣圖見第一或作線條樣圖見第二俱可蓋線笋則在中間先用一線綁緊反轉自成笋樣也而用以開調膏藥俾貼傷處甚妥至線條則用以塞入傷口令其口由漸生潤俾易發膿也

又法先將黃蠟煮鎔即以海絨投入其內令其灌滿黃蠟俟乾後則驗傷口之闊若干即將刀切此海絨務使合度然後塞入傷口處久之則內發熱而蠟自鎔即行流出其海絨在內未幾又復發開而自然撐潤傷口亦一善法也凡搥絨用之過多則反令傷口尤劇若少則又易生膿而濕透未免溢出惟用之得中俾病者庶得安然也若無法國搥絨則以棉花麻絲代之凡治肛門痔瘡若用搥絨宜先塗以膏藥後用銀針帶入令其肉芽由下而漸生上可也間有以棉線而製成線毬樣者圖見第三即用以止血或塞入傷口使之發炎生膿亦妙又有用白布一幅裏以軟布碎即將四圍綁緊使成小袂包樣者圖見第四彼小兒或小腸氣發宜將此包蓋護用帶纏實以代氣夾之用抑或將此小袂包壓實血管用以止血均妥若脫牙後血流不止即將小木削尖纏以搥絨塞入穴內而血自止至用麻絲棉花以代搥絨必須先行揀淨方安大抵用棉花以裏湯火傷症固可免天氣侵入且使之扯乾膿

水俾壓易生而口易收也已上數法各有妙處是在善用之者

一布包用以蓋護傷口而或用絨布洋布並花洋布為之俱可但布包有數種其中有三角形者有四角形者而且長短方圓其形不一即用之亦各不同惟變通用之可也夫抵布包務宜平滑且當先以恰可格式合其傷處而後纏之庶得妥妥也

一三角布包形

圖見第五

即將四方之布一幅對角摺之使成三角符樣是也凡鋸斷手足敷藥後

即用以包裹最妥但裹時宜先摺起左右兩角後復摺起中間一角依此裹之另用布帶繫實自有效驗

一四角布包形

圖見第六

仍用方布一幅先對摺兩度成一長形再將兩頭一摺便成四角之形也

凡遇身胸手足及大髀等處受傷敷藥畢即當以此布包蓋護後復用帶纏緊自得安痊

一篩眼布包形

圖見第七

法將方布一幅一連對摺數層即以絞剪剪成鋸齒之形則展開而中間

有眼儼如篩箕此篩眼之名所由取也但此布包用以開塗藥膏貼在患處甚妙蓋令其膿血必由布眼流出且能助生肉芽而易告痊也

一十字布包形

法將方布一幅連摺兩度先摺成一小四方樣再摺成三角符樣

圖見第八

即將

散口之一角剪開少許則展開而觀其剪口自衍成十字之形

圖見第九

但此布包亦用以開調



藥膏敷貼。割手割足等處。再以布袋繫之。自有妙用。

一半十字布包形。圖見第十即於十字布包剪去一半是也。凡割斷膊頭骨手臂骨及大髀骨等處。

宜將此開塗膏藥用以敷貼。而奏效頗捷。蓋其妙用尤勝於十字布包也。學醫者欲剪此布等布包之形。宜先以紙練習剪到熟處。而後臨時庶無窒手之弊。

一套骨兩尾布帶。法用長布一幅。合而摺之。即向中心剪開一孔。以備套骨之用。次在孔下用

剪分開。便有兩條帶尾。圖見第十一凡遇割鋸單骨枝者。即當預備此帶。務使布心一孔先套骨

枝。復將兩條帶尾牽着用以蓋護肉體。然後鋸之。此固可免錯傷皮肉。亦不至有礙割鋸工夫也。

一套骨三尾布帶。仍用長布一幅。即分三分摺之。先向中心剪開兩孔。次在兩孔下用剪分開。

便有三條帶尾。圖見第十二凡遇連鋸雙骨枝者。務宜使布心兩孔恰好套繫雙骨枝。為妙。後復扯

緊三條帶尾。用以衛護肉體。而後鋸之。方得穩妥。

一套鉸骨布包法。用白布一幅。連摺數層。蓋取其厚也即向中心剪開一孔。圖見第十三凡遇骨鉸跌斷。即

將此布心之孔恰好套繫。然後紮實。如此則凸鉸骨既免受壓。方易療治。西國有用樹膠即俗名象皮而製為氣袋者。先滿以氣。即將此袋以套凸鉸骨。亦取其免受壓也。而用法更為巧。

妙

一砌級布包。其兩頭形狀。則儼如橋之石級也。圖見法用長布一幅。即向兩頭摺砌而成。每

切高一級。即宜褪短一級。如此砌去。則兩頭自衍成石級之形。惟中間則不用砌。凡遇傷處

用以蓋護。蓋取其首尾無力。而力祇在中間壓實。亦頗見妙用。

一疊高四方布包。法用方布數塊。層次疊成者也。但每逢疊高一層。即宜摺小一層。如此則自

然越疊越高。圖見即將針線縫緊。用以蓋護傷口。蓋取其中間凸拱。而足以壓實患處也。

一合口膏。蓋用以牽合兩邊傷口。俾免天氣侵入。而口自易狀也。但剪此膏時。亦宜細驗布紋

方可下剪。至傷口之闊窄不一。尤須按照患處剪之方妥。凡貼此膏。宜先焙熱貼之。法須

先向傷口之邊下貼。而使之牽合。惟須留一隙。以備膿水流出。斯為得法。至于洗濯換藥之

時。其扯起此膏之法。又須先從首尾處扯起。及至傷口宜輕輕扯去。以免掣潤傷口。或並傷

其肉芽可也。圖見間有爛瘡。而用貼膏壓緊者。蓋欲使血管流行。俾易生肉收口也。若外腎

發炎之後。或用貼膏火緊。令其消小亦妙。圖見至或被湯火所傷。與及骨鉸生大頸。瘰生膿

皆可以此膏貼愈也。近有以此膏。或能潰爛皮肉。而多用魚膠。宜用大酒鎔。即以西國油布

間塗此膏。亦頗有功效。

一 呀羅顛。其功力頗同合口膏。製法用伊打酒三安士。量火酒一安士。量大綿五分六厘。和化再加入甘油一地廉。調勻。由是用筆蘸此藥水。搽落患處。少頃伊打酒即行飛去。而只遺下一層光薄之皮。龍草該處醫者觀之。自可洞徹見底。此亦一巧妙法也。又法或用布及絲網蘸此呀羅顛水。即鋪在傷處。以手壓實。俟乾後。則該布自然交粘。而較之貼合口膏尤緊也。凡被湯火所傷。抑或週身皮肉腐爛。及婦人乳頭腫爛等症。宜用布蘸此藥水敷之。若藥布乾硬。即用伊打酒或火酒濕透。自可復用。

一 敷瘡科藥。料有數種。或用麥糠。或用漿。或用爛飯等物。不一。惟按傷處所宜用之可也。而敷後自有減退紅熱腫痛之功。至於所敷藥料。有溫烈兩性。又當辨之。如芥末。其性烈如麥糠。爛飯。蘇仁粉。及爛麵飽類。其性溫。但溫性之料。功力尤勝烈性。而且省費。不過只用沸水煮至凝結。即鋪在洋布刮平。^{十八}復加入生油。或豬油在面而已。依此敷之。甚妙。惟再用沙布一幅。鋪隔面上。俾免沾污於肉可也。^{十九}若藥料一凍。即宜速換。務令其時常溫熱。乃妥。凡敷藥後。另用油紙。或油布。蓋護。庶不覺其硬也。

一 收斂藥料。法用白礬。或鉛霜水。與濃牛乳同煎。後將濾出之水。以煮麥糖。並加入橡皮。或柿皮。或石榴皮。和勻于麥糠內。即用以敷瘡疥等症。頗有收斂退病之功。

一發酵藥料。先將酒餅發起。次以熱水開調。米粉然後加入酒餅和勻。鋪在布上刮平。仍用紗布蓋隔。凡遇紅腫及爛肉等症。用以敷治。甚為應驗。抑或加些鴉片。用以止痛。亦可至敷後。另用油紙蓋護。外面免覺其硬。庶得安然。

一用芥末敷治。即將清水開調。攪至稠結。鋪在布上以敷患處。若一二刻。其皮肉即發紅熱。宜速撤去。否則輒起水泡。蓋芥末之性。用水開調。則功力甚猛。故敷貼不宜過久。若用米粉開調。則功力自緩。亦在乎善用之耳。然要之醫道。不能拘泥。正宜變化從心也。

一敷貼乳瘤膏藥。法用方布一幅。先摺成三角符樣。即將鉸剪向下角尖剪去。並令剪成圓樣。而所有圓邊。又均剪三四分。令其邊俱有布緒。則展開而中間便有一孔。此孔蓋用以套入乳頭也。圖見二十由是將此布開塗藥膏。以敷乳瘤。自有交粘之妙。

一割症及裹纏之法。固貴熟手。尤貴小心。手不熟。則恐無益而有損。心不細。則或得此而失彼。也。惟平時習熟諸法。加以詳慎。而臨時乃無遺憾。誠以此中治法。正當無微不至也。茲謹擬章程數款。學醫者宜遵行焉。

一割症最宜鄭重。所有一切器具。固當預先整備。而醫者。仍宜觀想。如何緊要物件。方可下手。二須多用。人佐醫。如或裹布包。或紮布袋。或貼合口膏。或司熱水等物。醫者宜預先派定。



各司其事。以免臨時忙於調用。庶得週到。三宜預備卧榻。俾病者一敷藥後。即得安寢。四病者寢所。宜預先整頓停當。以免卧時。尚有不妥。五每逢換藥。醫者面目。必須向着病者。此固便於洗滌敷治。亦免病者有勞動之苦。六佐醫之人。亦宜小心調理。慎勿浮躁。致有疎忽之虞。其餘法式。詳見下文。

一纏紮布袋。最要得法。務使與患處交粘。方能奏效。其布帶或用絨布。或用夏布。與及洋布。洋布俱可。惟布性總貴軟弱。凡布布邊。務須剪去。其或有破綻處。宜先補好。方為合用。而且布帶一長一濶。應用若干。須預先按法剪備。至于或捲單頭樣。或捲雙頭樣。均宜將布捲定。俾臨時持此布轆。庶便於運紮也。

一單頭布帶。法將布之一頭。捲成轆樣是也。或用機器捲之。或用手捲之。俱可。務宜捲實為妙。一雙頭布帶。十一見二。即向布之兩頭。俱捲成轆樣也。若紮在身體等處。宜將兩頭布轆持定。即向患處纏緊。勿令鬆脫為要。

一凡用布帶。務宜合度。其纏在身者。則長約二丈四尺。濶約二寸半可也。其纏在頭者。則長約丈餘。濶約一寸二可也。其纏在四肢者。亦長約丈餘。濶約二寸可也。至纏在大髀等處。其布帶之長濶。酌量加之。餘則按照部位。務使合式。庶幾投無不應。