

痘疹精詳卷四

朱水周 冠甄陶氏編輯

○起脹辨症賦

五六日間痘出齊矣點至足心勢方安定猶有陸續不出之狀或隱隱於皮膚之間而不見其起發者古名不懷若非風寒壅遏之因必有氣虛不振之過是故五六日間痘已出齊身表宜涼八九日後痘欲釀膿身表宜溫涼則痘之毒氣盡出皮膚而內不留鬱熱溫則人之血氣自爾流通在外易於運化至此而身不微熱雖未至於水伏而痘瘡斷乎弗長六七日來痘顯已成瘡宜肥大而粗頂要發光而白方有行漿之勢若還赤色過頭雖見嬌紅有可愛延綿八日依然到頭空殼虛花其內並無凝影若皮薄而光亮如燈內含是水雖頭尖而根脚不紅行漿弗定如熱毒盛而未解則為紫為黑壅而不起則為臨為塌滯而不榮則為乾為枯為青為灰怯而不振則為不快為停漿或有肉先腫脹而痘反不起者漿則滯而不行面已虛浮而痘反退伏者毒則過而不出身不熱而痘不起恐成水代之形此際宜行溫藥氣血弱而不興恐成臨伏之弊治此斷用補劑他如紫色乾枯切忌溫中滯補止宜活血鬆肌若或皮薄漿清則宜健皮助氣切勿解毒清涼為壅為滯列藥雖然可發透肌尤是良方溼泄雖宜溫補瀉甚當佐升提界地不分安能起水焦紫不退必致內攻頂有亂紋宜解毒猪鬃眼現是危機此際猶堪解毒急施拯救之功遲之二日則難措手嗟何及乎

○起脹調治宜急

痘出皮膚要漸漸起脹蓋痘起一分則毒出一分必痘脹滿而毒乃盡出倘痘不起脹則痘雖見點其毒仍留臟腑數日之後其毒內攻不可救矣故出齊三日之內其時日十分要緊急於此時觀察形色審症用藥猶如拉溺而不可緩救焚而不可遲也夫痘之安全必要膿膿飽滿其次亦要膿漿六七分方保無虞痘瘡既出形色顯然其膿之成與不成漿之足與不足此時皆可逆觀蓋痘出齊後潮熱已退雜症又除稀疎明朗尖圓紅潤皮粗而厚體寔而堅者氣血俱盛毒氣又清必能起脹必能成漿此固可預知也若或稍生不順或熱不退雜症不除色暗而不明勢

弱而不振界地不分顆粒不圓紫而不鮮焦而不潤淡而無血薄而不堅著非毒盛之失解即氣弱之當扶此症若無藥救則必不能起脹不能灌漿亦可以先知也故必於此時力為調治猶可救也失此不治則不能起脹又安望其成漿乎痘之生死決於痘之起伏痘起則毒從外出而可化痘伏則毒留內攻以為殃故起脹方有生機臨終必從死例此萬古不易之論決無倖全之理此際可不慎乎

○起脹用藥宜慎

痘當出齊宜固肌表安脾胃蓋肌表為痘瘡運化成功之地肌表不固則有皮薄漿清潰爛難癒之患故八九日上必用炙蒼炙草以其補氣而寔腠理也脾土不堅則有泄瀉下陷之虞而痘安能起脹以成漿故凡滑利下瀉之物戒之切莫與服且痘當起水之際又忌利水之劑雖小便不長乃津液上升之故切不可疏利膀胱而通小便蓋小便大利則痘瘡之水不能起矣是故木通車前猪苓澤瀉滑石茯苓一切利水之藥此時禁而不用又恐土能制水凡補脾之藥能燥乾津液其痘必致乾枯故蒼朮白朮淮藥棗仁苡仁茯苓訶子粟殼藿香砂仁一切乾燥除濕之劑總不宜投況津液盡行痘內多好飲而常口乾勿用葛根知母而驟與之止渴蓋此時忌發表宜此清涼也縱有痰涎止宜用款冬花粉而南星半夏恐燥烈而漿不行川貝竹瀝又寒涼而慮毒冰伏至不得已而用苓連八九日來須用參耆監制若有熱而水不漲前胡在所必用頭面之痘不起川芎在所必用血熱而界不分紫草紅花生地赤芍以及丹皮是活血之聖藥而補血之歸芎則禁而莫用蓋血既熱而復補必成一片紅毯或頃刻轉為焦紫惟血虛而痘不紅則歸茸必當重用兼以川芎白芍大元稜以助補血之力而紫草紅花是血虛之忌藥遇此症切莫輕投若熱盛而壅毒不起則連翹牛蒡地丁慈菰理必用之而解毒毒之盛者當用此等以為君略用荊防以達表更加陳梗以疏通蟬蛻殺毒上行不可多與多則恐致空癰山查宣通滯氣或清或補皆當以之為佐其毒乃不滯留穿甲透裏攻漿或托或解總宜以之為使臟毒乃得外宣若藥雖皆行血之藥然赤能涼血白能聚量故血熱用赤六日以前多取赤芍而生用血散用白七日以後須用白芍而炒之黃耆雖最補氣然生則補中帶發熟則專秘腠肌甘草雖謂和平然生則清胃解毒熟則補氣溫中是以二者之藥六日以前生用七日以後炙施至於升麻乾

葛羌活柴胡紫蘇麻黃防風荊芥枳殼枳柳皆走表散氣之藥。至此皆不敢用。即不得已而用之。此等但須少無要兼參耆以扶正氣。而後乃不傷元。他如人中黃雖善解毒。用此必合人參。始不至於耗本。淫羊藿雖能改癯。亦不敢多服。多則痘必生痒。遍身起而頭面猶伏。則重川芎而加升麻為引。用蟬蛻而以筭尖作湯。若頭面起而四肢不脹。則去川芎而除桔梗。用桂枝以達四方。若皮薄而軟。頂白而平。總以氣虛而斷。必用人參黃耆川芎肉桂以補氣。藥為君。若或赤色貫頂。久而血不下附。頂不放光。亦是氣虛不能統血。陰盛陽衰之義。宜以扶陽為主。而參耆丁桂總要多施。最忌此時泄瀉。瀉則中虛內陷。頃刻立變白灰。此症最為險要。必須補氣安脾。參耆更加訶藟。甚則豆蔻丸施。雖謂起水忌脾強。而急則治標為貴。止朮苓淮山莫用。以訶藟為便宜。蓋猛藥方能止泄。泄定而痘乃升提。氣虛下泄待何醫。土炒升麻堪濟。提氣上行能止泄。又堪起痘。以高飛。此方奇妙。少人知。曾經屢驗。休疑。倘或搖頭點額。其間尚有驚風。莫謂痘出此非凶。鎮驚丸猶堪用。七八日上或朦朧未免心驚。熟蘆若用寧心補血定。加變症無功。若夫失聲咽痛。此際不必驚慌。定是喉中有痘。痘脹故不聲揚。噲水而兼吐飯。總因內痘攔當。迨至十日以後。此症一概平康。最怕痘瘡。臨伏孩兒十個九亡。又畏痘色青黑。十日內返泉鄉。頂焦終不放毫光。有如癩瘡模樣。十日舌上生疔。十一日見闔王紅毡一片。勢難當。又怕面如錫盞。蚕形蚊跡。惡非常。無藥能醫。此應湯泡燈燒。莫治。灰黑二陷難醫。若是紫白血陷。此症尚可維持。此時雜症是危機。勿謂尋常容易。腹脹喘噓痰壅。皆為毒臨內攻。大小二便來血。悉為臟敗中傷。時時張口欲吐。是毒鬱而不祥。漿未行而咬牙寒戰。此症已云難治。痘不起而失智無魂。吾知立見死亡。目上視而不轉。或牽衣而弄裳。此等已為鬼錄。何須懇禱宮蒼。

痘之毒氣出於臟腑。氣血拘攝。送於皮膚。故成瘡形。初出乃是血點。其後漸漸運化。血化為水。水化為膿。必漿足膿成。毒乃化盡。然必出於皮膚。而毒始能化也。故痘必起而水乃行。水將行則痘光潤。是以痘宜光而不宜暗。宜滑而不宜瀼。宜起而不宜伏。究之痘之起與不起。毒之化與不化。皆氣血盈虛之故。邪正盛衰之由也。必正氣盛而邪氣衰。陰陽調和。血氣通暢。乃能化毒以成漿。

痘之起脹。雖在六日之後。而調治之藥。當施於七日之前。蓋痘之所以難起者。必是毒盛痘稠也。凡解毒之藥。多是

清涼惟七日以前可用。若八九日上候當用補。毒若未清則畏首畏尾難施治矣。故六七日間毒之盛者急宜解之。斷不可稍遲延也。

○起脹順症

痘出齊後熱退身涼飲食如舊精神清爽體暢心寧上無咳嗽吐逆之弊下無泄瀉秘結之虞痘稀而朗顆粒分明頂尖圓而日起脹脚不濶而聚紅暈痘頂放光而起瘡底帶漿而升先出者先起脹痘若出齊至足而面部水汁俱行天庭地角總光明左右頰腮俱潤澤水至八分其脚便有漿膿又或水至而即帶行漿更為氣強而盛此等易變易靨尤為至美之苗其次漸漸升灌亦為最吉之痘吉痘何須用藥只要飲食調和起居謹慎自獲平安勿莫妄服藥餌恐庸醫反致誤人又莫冒犯穢氣致外邪而觸內毒且肥滑不宜與服恐滑利而生泄瀉以犯痘家之忌不可與食恐冰伏而生腹痛以致終身之疾此保赤之良言故向天下而致囑

○起脹險症

起脹而壯熱不退則毒滯留於內矣毒氣盛則痘色赤紫甚至焦枯稠密而不分地界元氣虛則痘色灰白而不紅活嬌嫩而不蒼老此皆險症也但神氣清爽飲食二便如常雖險可治

○起脹逆症

一頭面不起雖遍身皆起不治

一痘不腫起而肉先浮腫不治

一痘紫黑不起乾燥不潤慘暗不明者不治

一痘有紫黑泡刺出黑血旋而處處有此泡者不治

一痘灰白不起漸成塌陷氣促神昏者不治

一起脹時痘之四畔旋出小豆攢簇本痘成叢似粟者凶

一起脹時痘頂即含白漿者凶

一痘遍身紫點如蚊所咬者不治

一手足之痘見而復隱起而復塌或上身帶水下身枯者凶

一痘頂上有黑眼如猪鬃者毒入臟腑也急宜用內托散托之托而不起則難救矣

一起脹時漿水未行而口唇即有黃漿者俗名鵝口最惡候也急解脾胃之毒用調元化毒湯加石膏為君又用石

膏牛子甘草煎水時時搽於口唇而且與噙或可解也不然唇崩齒落而死

### ○起脹治法

痘已出齊熱宜退熱愈甚今毒留中壅滯調元大成妙元虛內托可奏功

釋

凡痘出齊必要退熱潮熱已退則毒盡出於皮膚矣若出齊猶熱是毒猶少留於內也出齊大熱是毒盛滯於

中也急宜宣毒出外毒不留滯則熱自退而痘自長矣但毒之所以滯者有二有毒氣壅盛而熱甚者其毒必

紅紫乾焦兼之煩悶宜用調元化毒湯以解之若仍不退則用大成散以攻之服此而痘光潤起水即熱未盡

退亦當更用補劑蓋八九日上候當用補不敢復試清涼也有元虛不能送毒而熱甚者痘必淡白雖現點稀

疎亦是留毒未出不可玩忽視之宜用千金內托散托出痘毒方可無虞

### 調元化毒湯

見一卷初熱門

### 大成散

錄

穿山甲一兩人中黃明雄黃各三錢麝香二分共為細末冷症溫酒送下熱症紫草燈心湯送下泄

瀉者忌

千金內托散

見卷三七暈門

### ○痘不起脹

痘不起脹宜無由毒盛元虛可推求傷風傷食皆為累對症施藥莫亂投

釋

痘出齊後當漸次起脹然有毒氣熾盛血燥而凝不能起脹者痘色必紅紫而焦枯宜以清毒活血湯主之有



中國醫藥大學圖書館藏

元氣虛弱血寒而凝不能送毒而不起脹者痘色必淡白頂必不尖圓根必無紅暈宜用千金內托散及參歸鹿茸湯治之有因風寒閉塞不能起脹者痘色淺淡黯滯外症鼻塞惡寒宜用蘇解散以治之有因內傷飲食中氣為食積所滯不能宣暢痘毒而不起脹者腹必飽脹疼痛宜用寬中快癰湯治之此外更有過天時胎毒又加包裹以致毒火過鬱而不起脹者宜用白虎快癰湯治之誤食生冷致脾虛而不能起發者宜用理中快癰湯治之

清毒活血湯

千金內托散

參歸鹿茸湯 三方俱見三卷七章門

蘇解散 見三卷應出不出門

寬中快癰湯

錄陳皮 厚樸 山查 神曲 川芎 白芷 砂仁 木香 香附 炙甘草

白虎快癰湯

錄人參 石膏 甘草 麥冬 升麻 竹葉

理中快癰湯

錄人參 白朮 黃耆 官桂 木香 丁香 乾薑 炙甘草 泄瀉加肉苳蔻訶子

○面部不起天庭不起手足不起

面部不起最為凶天庭不起死相逢手足不起脾氣弱三處看清是醫宗

釋

凡痘須看面部面乃五臟元陽之會面部若起則遍身雖陷亦氣血灌漑未至以藥力扶之自能徐徐而起也若面部不起而手足先脹此陽氣不能上升而流竄於四肢最為凶兆急用千金內托多用川芎加炒升麻以提氣上升必頭面起脹方保無虞面部又以天庭為緊要天庭不起則兩顴地角雖起亦無生機蓋天庭乃至



高之所是諸陽之首此處不起則元陽已衰諸部安能運化急用升天散治之若遍身俱起而手足不起乃脾氣弱而不能灌溉四肢也宜用補脾快癰湯治之

升天散  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯

補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯

補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯

補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯

補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯

補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯

補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯

補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯

補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯  
補脾快癰湯

所觸者必惡風寒。而皮毛標起。用生薑附子桂枝。令出微汗。而痘復起。為穢氣所衝者。其痘必痒。用平和湯外。以沉檀棗核薰之。其痘即起。誤服寒涼者。其痘必白。用內托散加丁香附子以補中氣。則痘復起。

### ○郭郭

郭郭充肥。充且堅。色多蒼蠟。或紅鮮。如逢破損。多露薄。縱有良方。恐莫延。

凡痘郭郭充寔。皮囊堅厚。擦之不破。色蒼蠟。而紅活皆順症也。若痘雖紅鮮。反乾燥而不充肥。此火甚而血不足。宜退火滋陰。血用四物快癍湯。如痘充肥而帶濕淫。此濕盛而氣不足。宜利濕補氣。用四君子快癍湯。如痘雖紅活充肥。而皮薄嬌紅。擦之即破者。此血有餘而氣不足。宜大補快癍湯。

### 四物快癍湯

方錄

當歸

川芎

赤芍

生地

升麻

粉乾葛

連翹

紫草

荊芥

牛蒡

水煎和燒過人糞服

### 四君子快癍湯

方錄

人參

茯苓

白朮

甘草

黃耆

荊芥穗

防風

白芷

赤芍

陳皮

肉桂

水煎服

### 大補快癍湯

方錄

人參

黃耆

當歸

生地

川芎

赤芍藥

牛蒡

連翹

肉桂

防風

甘草

水煎入燒過人糞同

### ○形色

形色須教着意觀。紫紅寔熱。白虛寒。倘然錯認。分毫處咫尺雲泥禍害端。

釋

凡痘瘡起發。須諦觀形色。以定吉凶。如根窠紅潤。頂蒼蠟色者。上古根窠紅頂灰白色者。次之。若痘色紅紫而焦枯者。乃毒火熾盛。血燥而凝。不能起脹而化也。宜用清毒活血湯主之。若痘色淡白。泡不尖圓。根無紅暈。而不起脹者。乃元氣虛弱。血寒而凝。不能送毒外化也。宜用十全大補湯加丁香鹿茸。回其陽氣。四肢冷加附子。

清毒活血湯

見卷三十七 藥門



十全大補湯 見卷三怪痘門

○中陷

四圍起發陷居中陽氣虧衰尚未通若是中枯成黑子此名疔痘類非同

釋

痘瘡起發其形不一有緊小而充實者俗呼珍珠痘此痘易壯易靨有粗大而飽滿者俗呼大痘此症早壯遲

靨有四圍起中心落陷者俗呼菜葉痘此痘有輕有重痘稀者輕痘密者重乃中氣不足之故宜用內托散托

之中自起矣若中心陷而黑者此毒留於裏中氣鬱而不升也宜理中化毒湯治之若先有水忽然黑硬乾枯

而中陷者是痘疔也急宜剔破吮去惡血以拔疔散敷之仍用前方與服

內托散

錄

人參 黃耆 川芎 當歸 防風 白芍藥 白芷 桔梗 厚樸 木香 肉桂 生薑一片大棗一枚

同煎服色紅紫者去肉桂木香加紫草蟬蛻漿不滿者用酒水各半煎加糯米不食加人乳丁香

理中化毒湯

錄

人參 黃耆 當歸 白芍 川芎 牛蒡子 連翹 人中黃 穿山甲 防風 加雄黃及燒過人糞

拔疔散

見卷三印堂見點門

○四圍乾枯

中心微起四圍乾不久焦枯變一般毒火薰蒸津液竭理中化毒麥前攪

釋

痘有中心微起而含水意其四圍却乾枯者此毒火薰蒸津液將枯之兆必身熱煩躁若不急治則盡焦枯而

死矣宜理中化毒湯加前胡麥冬以治之

理中化毒湯 見上

○黃漿

方脹帶黃漿毒火內猖狂急宜針剔破敷用拔疔良



釋痘方起脹而即帶黃漿者此毒火熾甚故易成漿俗號搶漿痘不拘何處俱急剔破去其漿膿以拔疔散敷之不然能滯漿路令諸痘不能成漿矣

鋪錫

起發猶如錫餅鋪皮膚光若水精壺其人能食方無慮不食將為鮑肆枯

釋凡痘瘡稠密要依次起發紅活尖圓者吉若一齊起發遍身白色如錫餅形頭目浮腫此惡候也若其人能食

無他症延至日久渾身皮脫而愈倘不能食後必生吐瀉熱渴搔痒之症而死矣能食者宜服助脾快癰湯以扶其中氣

助脾快癰湯

陳皮 查肉 荊芥 牛蒡 木香 杭青皮 枳殼 木通 甘草 水煎服一二劑不宜多

渴

起發之時渴又臨火邪內迫熱偏深急宜解毒生津液休得俄延向外尋

釋痘瘡作渴此是常事蓋由於中毒數內則煎熬於毒火外則灌潤於瘡故宜渴耳凡一切瓜果生冷之物不可與食惟炒米湯飲之為宜若渴大甚其人飲食如常大便堅寔此內熱也宜生津地黃湯潤之若泄瀉而渴此內虛津液不足不能上潮於口宜七味白朮散滋之

生津地黃湯

生地 麥冬 知母 花粉 甘草 淡竹葉十片為引水煎熱服

七味白朮散

人參 白朮 木香 藿香 茯苓 粉乾葛 甘草 生薑大棗為引水煎服

泄瀉

自此常宜大便堅如逢泄瀉痘難全調脾散貴如期服豆蔻丸須應候煎



釋痘自起發之後大便要堅若泄瀉無休則痘必內陷宜急用調脾散豆蔻丸止之

### 調脾散

錄白朮

茯苓各七錢

白芍

神曲

砂仁

蓮子

苡仁

查肉

訶子肉

肉豆蔻各五錢

陳皮

香附

厚樸

木香

甘草各三錢

共為細末米清湯送下虛甚者加人參

### 七味豆蔻丸

錄赤石脂

煨五

枯白礬

各七錢

肉豆蔻

煨熟去油

砂仁

訶子肉

煨去核

白龍骨

煨

木香

各五錢

麵糊為丸如菜豆大用清米

飲下量兒大小與之不能吞丸者將丸研碎入粥內服之亦可

### ○嘔噦

痘兒嘔噦不堪聞不是寒邪是火焚妄進湯丸如拙匠內傷臟腑匪妖氣

釋

凡痘瘡乾嘔無物或時常噦逆此臟腑內傷衝任之火上犯清道故為嘔噦惡聲經曰絃敗者聲必嘶木陳者葉必落臟敗者聲必噦鍼灸無功湯藥無效此之謂也如曾傷冷物受寒氣此寒嘔也宜二陳理中湯如未傷冷物及寒氣此熱嘔也宜二陳一連湯若咽中有瘡必作痛悶塞而嘔宜加味鼠粘子湯外用控涎散吹之

### 二陳理中湯

錄人參

白朮

陳皮

半夏

甘草

生薑三片為引水煎服

### 二陳一連湯

錄陳皮

半夏

茯苓

黃連

甘草

竹茹生薑為引水煎熱服

### 加味鼠粘子湯

錄桔梗

牛蒡

射干

防風

山豆根

陳皮

荊芥

連翹

甘草

水煎熱服

### 控涎丹

錄辰砂

雄黃

黃蘗

兒茶

共為末吹喉中



中醫藥大學圖書館藏

○大汗不止

起脹不宜常大汗。汗多陰液必消亡。保元湯治陽虛症。陰虛須用六黃湯。

釋痘毒之火由裏達表初見有微汗者是榮衛通暢毒從汗解。寔順症也。但汗為血液大過則陰液必亡。故起脹時大汗不止未行漿恐不能灌既行漿恐不能壓既壓尤恐氣血虛脫最為可畏。自汗為陽虛急於斂汗以保元湯主之。盜汗為陰虛急於降火以當歸六黃湯主之。

加味保元湯

歸人參

黃耆各錢半

白芍八分

浮小麥七分

桂枝六分

甘草三分

水煎服

當歸六黃湯

歸人參

黃耆各錢半

白芍八分

浮小麥七分

桂枝六分

甘草三分

水煎服

○寒戰咬牙

同一寒戰咬牙症起脹之時屬裏寒桂附理中須急進莫待臨伏轉手難

釋起脹時二便清利不煩不渴而寒戰咬牙者乃氣血虛弱正不勝邪故也。以桂附理中湯治之。

桂附理中湯

歸人參

黃耆各錢半

白芍八分

浮小麥七分

桂枝六分

甘草三分

水煎服

○咳嗽

至此猶聞咳嗽頻毒留於肺氣難勻調方化毒湯為穩加入欬桔與天陳

釋初熱時多有咳嗽之症至此宜減若仍咳嗽不止則毒留於肺矣。以加味化毒湯治之。

加味化毒湯

歸人參

黃耆各錢半

白芍八分

浮小麥七分

桂枝六分

甘草三分

水煎服

○失聲咽痛

失聲咽痛

失聲咽痛

失聲咽痛

失聲咽痛

失聲咽痛

失聲咽痛

失聲咽痛

失聲咽痛

失聲咽痛



肺管脹塞音故啞食入咽疼不須憂加味甘桔湯煎水時時口含病即廖

釋痘當起脹肺管之痘亦起脹阻塞氣道故音啞脹塞咽中故食痛此無妨但以加味甘桔湯煎水時時含服

加味甘桔湯

自愈

甘草

桔梗

元參

牛子

黃芩

山豆根煎水含之不用服



南京中醫藥大學圖書館藏

痘疹精詳卷五

來水周 冠甄陶氏編輯

○灌漿辨症賦

九日十日順候發行半足。若或稍為不順。此時方作膿窠。痘內之漿行否。外觀便見分明。毒重而壅遏者。乾枯退縮。氣盛而升發者。充飽光榮。頭面行漿。四肢未起。見之切莫慌張。腿膝發泡。而面頰焦枯。見之且休歡喜。既已慮其發。噎且又慮其喘急。飲食不多。或因臟虛而內陷。水漿頻進。恐來泄瀉。而復顛調。理失宜。倒戈反掌。熱甚煩渴。到此休。依寔論。吐兼瀉泄。此時定作虛看。紫黑乾枯。急攻發。而或可生。氣虛塌陷。重溫補。而幸能活。發噎懼其失聲。喘急恐其腹脹。瘡或白而少神。根雖紅而難治。頂不起而軟弱。腳雖赤亦難生。淡白而濶塌。此內必無漿汁。皮薄而嬌紅。有漿亦是清稀。犯此數端。八九日必然發痒。若還壯熱。燎人不痒。定行乾燥。紫黑乾枯。不須着眼中。凝血迹。或可倖生。漿既行而半足。時則未宜收斂。忽爾一時紫黑。古名倒靨。請君莫謂結痂。攻發若得其宜。此症猶堪復活。旁生血點。再行漿。危症也。當文治。若見痰鳴而喘喘。黃泉其過。失聲而淒淒。陽數無幾。論死生之決斷。總看膿漿之有無。有漿則生。無漿則死。漿有六分。猶可活。三分漿汁亦歸陰。內托補劑。速宜攻救。遲延一日。莫可誰何。醫若救焚。豈可緩乎。

○灌漿三日調治法

凡痘至七日宜灌。八日宜滿。九日十日乃漿期也。初出是血。其後血化為水。水化為膿。至於成膿。其毒方化。然必漿滿。毒乃出盡。必漿濃。毒乃化盡。痘雖起脹。若不成膿。則毒雖出而未化。勢必擾擾於皮膚。倒流入裏。故在外則為痒。塌在內則為內攻。而痘瘡抓碎。滿面無皮。腹脹喘急。音啞痰鳴。不可救矣。是以人之生死。判於膿之有無。有膿則生。無膿則死。理必然也。此灌膿三日之中。乃生死存亡之界。此際可不慎乎。然膿之所以不成者。皆由五六日前失於解毒。以致毒壅而熾。血燥而凝。氣滯而餒。故不能運化以成漿也。然至九日十日以來。內臟空虛。候當用補。且正氣與毒氣相持已久。至此元氣必衰。斷以扶元為主。況痘為臟中之毒。既斬關破壁。出於皮膚。臟腑必為不固。若不內

托以衛元神則方出之冠恐復乘虛而入此倒陷倒壓之所自來也至於倒陷倒壓則毒返內攻雖有良醫莫能救矣故時至九日總宜溫補不敢清涼固肌肉托是此時之要領健脾補氣為此日之綱常參黃耆乃助氣行發之要藥當歸善於補血欲行氣須用酒洗恐滑泄則土炒為宜鹿茸最善攻漿補血而又能助氣酒酥原是良方白芷排膿止痛行漿劑中必用川芎提氣行血起脹方內宜加欲飲血以行漿功莫勝於白芍欲滋陰而活血勢必用干元枝攻毒排膿在川甲起漿灌汁喜淫辛丁香煖胃又攻漿肉桂扶陽而補氣木香行氣且行膿山查健脾散毒白朮淮山乃除泡寔漿之聖藥凡漿清皮薄者非此不能解其厄附子乾薑乃煖胃行陽之上品凡咬牙寒戰者非此孰可救其危泄瀉若來則求苓訶蔻力健脾而不畏嘔吐或至則參砂丁藿宜溫胃以為良至此虛症若形任是辛熱之劑總恐之而不懼縱或稍形熱症亦不敢純用清涼石膏大黃慮傷脾故不用前通猪澤恐利水而乾痘漿雖熱毒未清祇用雄黃牛子凡芩連梔葉戒之切莫輕試恐臟寒而告變須臾即或偶中風寒用薑附桂枝而發汗凡羌獨柴荆升防蘇葛走表散氣之藥慎之切莫妄行慮表虛而變症旋生若咳嗽痰涎欬久白附桔梗陳皮可用而川貝胆星清痰之藥休行忽然驚譫狂言莫謂此為寔熱妄作驚風施治而用清解之劑此是血耗神馳只宜養心補血歸脾湯寔得其宜又有足攣手戰勿謂風生手足而用驅風峻藥此亦氣血有虧而不能藥四體必大補湯加續斷以滋筋血之榮腹痛多為不吉平胃散是良方任他腫脹總無妨只要痘瘡肥壯七孔流膿不怕此是內中有痘於今潰出膿漿大便或瀉膿血亦非腸胃有傷皆因腹中有痘痘潰不要驚慌調脾解毒最為濃五苓散加牛蒡他如口渴身熱是作漿之本症偏宜用補切勿投涼號啼叫痛是行漿之吉兆最喜作痛切忌發痒痛則其漿必成痒則其毒不化頂尖脚聚是氣血之調和知其漿之必滿便不滑利是脾土之堅剛勿慮膿之不成試觀痘形外明內暗則其行漿已寔粗肥堅硬喜其中氣不虛由白而黃其漿已熟紅暈漸小其漿已行至脚不紅而痘蒼蠟此是成功之地見此喜出眉端其後總無變症面部漿充遍體之膿雖有三分未足吾知生氣已成頭面蒼黃四肢漿即清稀斷不至於死地若其痘也內外俱明其中必含清水起而不潤其內必是空瘡脚漸濶而暈漸散此為平塌頂漸平而中漸陷毒入內攻皮易破而痒愈甚豈能外化最忌灰白而伏尤嫌紫黑為殃疔在舌上最難富人在其

魂已往。抓破並無膿血。十兒九個必亡。若還復堆膿汁結聚。猶帶赤黃。此症尚為可救。急用內托之方。汁結形如雞糞。色灰枯而不光。抓破大出之。兆十三日見闕。王九日十日腫忽退。此兒端的赴泉鄉。十一日間聲忽啞。丹田氣絕。必傾亡。喘噓而兼腹脹。咳甚而且痰鳴。更或泄瀉不留停。藥物值下死症。糞門如同竹管。將來定赴幽冥。吐瀉蛔虫必死。此其臟腑已傾。遍身魚泡。死堪憐。皆是勿療之症。若見如此之症。何須罔用精神。

凡治痘之法。須宜預慮。莫待變症而始。愴惶發熱之初。當為出痘之計。見點之日。宜思起脹之謀。出齊起水。即要立行漿之地。蓋漿之不行。多由毒之內滯。毒之不滯。必解於七日以前。若以前失於解毒。至九日以後。不敢清涼。明知毒入內攻。而亦難於救藥。故犯痘之家。必於六日以前。宜急請醫調治。勿遷延以致自誤。治痘之師。當於七日之內。速為力救危亡。毋忽以致誤人。若至九日十日以往。而始慌忙求治。則猶苗已稿。即有甘注。亦何益乎。余所以痛心疾首。而為天下告戒也。

### ○灌漿順症

九日十日為灌漿之期。其痘圓滿光澤。而有膿窠者。其毒漸化而漿行也。色如綠水。而漸變蒼蠟。將手按之。其皮堅硬。身體溫和。二便如常。飲食能進。並無雜症者。順候也。不必服藥。但節飲食。謹風寒。慎起居而已。痘至九日。面上即帶漿脚。其漿漸升。其暈漸小。其初則如葡萄色。其後則如黃蠟色。而根脚漸收。紅暈則漿熟矣。頂射黃漿。則漿滿氣充。此順症也。

痘至起脹。腹中作飽。不思飲食。是毒猶滯於內也。若知飢餓。貪慕飲食。是毒不內留。盡皆發出。臟腑清快。而又空虛。乃吉兆也。

### ○灌漿險症

痘當起脹之後。氣血虛弱者。漿乃遲緩。且皮薄而清稀。毒氣盛者。痘色紫赤。且板硬而乾枯。皆險症也。然無他壞症。故尚可治。

### ○灌漿逆症

痘色紫黑乾枯塌陷者不治

諸痘有漿而天庭不起乾枯而陷者不治

頭面甚腫瘡皆抓破臭不可聞者不治

面腫早退瘡陷無膿目無神光者不治

灰白無膿擦而即破者不治

反薄無膿純是清水形如水晶者不治

二便閉結腹脹聲啞肌肉焦黑目閉無魂者不治

痘頂不起脚漸散濶平塌乾燥此為倒靨不治

灌頂之際面部諸處即有乾枯黑靨者亦為倒靨不治

抓破之痘復與內托亦不生膿不補漿目開腫退是毒入內攻也不治

痘頂有孔滿出膿水堆結乾枯而色灰白如天泡瘡及癩頭之形者不治

起灌之時忽舌上有黑點此疔生舌上也不治

灌漿治法

○毒盛漿滯

痘至灌期漿不升祇因毒盛氣血凝清毒活血湯為主壯寔參耆何須增

釋痘至九日十日為灌漿之期而痘暈紅紫或帶乾枯間有焦黑此毒火內盛傷其氣血必不成膿急宜用清毒

活血湯治之湯內人參黃耆形氣壯寔者去之

清毒活血湯見卷三七暈門

○元虛漿清

血虛氣弱漿難生雖生皮薄漿亦清內托參歸真妙劑七真寔漿効並宏

