

90 (ip)

S25-6

998

SS71
055

178



丹溪心法附餘卷之十五

寒鬱門

心脾痛七十二

丹溪心法

○心痛即胃脘痛雖曰數多不喫食不死若痛方止使喫物達痛必須三五服藥後方喫物痛甚者脉必伏用溫藥附子之類不可用參朮諸痛不可補氣大凡心膈之痛須分新久若明知身受寒氣口喫寒物而得病者於初得之時當與溫散或溫利之藥若曰病得之稍久則成鬱久鬱則蒸熱熱久必生火原病式中備言之矣若欲行溫散溫利益無助火添病耶古方中多以山梔子為熱藥之向導則邪易伏病易退正易復而病安然病安之後若縱恣口味不改前非病復作時反咎醫之失良可嘆哉方用山梔子炒去皮每服十五枚濃煎湯一呷入生姜汁令辣再煎水沸又入川芎一錢尤妙山梔子大者或七枚或九枚須炒用大概胃中有熱而作痛者非山梔子不可須佐以姜汁多用台芎開之痛發者或用二陳湯加川芎蒼朮倍加梔子痛甚者加炒乾姜從之反治之法也輕者川芎一兩蒼朮一兩山梔炒去皮二兩姜汁蒸餅糊丸如梧子大服七八十丸熱辣姜湯下重者桂枝麻黃石鰾各等分姜汁和蒸餅丸梧子大服五十丸熱辣姜湯下一本輕者散之麻黃桂枝之類重者加石鰾川芎蒼朮炒山梔子去皮作丸服凡治此證必要先問平日起居何如假如心痛有因平日喜食熱物以致死血留於胃口作痛用桃仁承氣湯下之切記輕者用薑汁桔梗能開提其氣血藥中兼用之以物柱按痛處則止者揆虛以二陳湯加炒乾姜和之有虫痛者面上白斑唇紅能食屬虫治以苦練根錫灰之類痛定便能食時作時止者是虫上半月虫頭向上易治下半月虫頭向下難治先以肉汁及糖蜜食下則引虫痛向上然後用藥打出練樹根皮板柳鵲虱夏取汁飲冬濃煎湯下萬應丸最好脉堅實不大便者下之心痛用山梔子鉉叔藥止之若又復發前藥必不効可用玄明粉一服立止左手脉數熱多脉瀉者有死血右手脉緊實痰積強大必是久病胃脘有滯而痛者宜小胃丹下之

入方 黃連 炒山枝 炒吳茱萸 湯洗各五錢 荔枝核 燒存性三錢 滑石 五錢 右為末姜汁糊丸服

又方 山枝子仁 炒黃色 右為末姜汁調粥丸亦得冷痛者加草豆蔻仁炒末姜汁炊餅丸服

又方 白朮 五錢 白芍藥 砂仁 半夏 當歸 各三錢 桃仁 黃連 神麴 炒陳皮 各二錢 吳茱萸 一錢 右為末姜汁糊丸服

又方 人參 甘草 各一錢 右為末蒸餅丸服

又方 白朮 三錢半 白芍 炒陳皮 歸尾 各二錢半 人參 黃連 炒一錢半 吳茱萸 半錢 右為末蒸餅丸服

又方 治氣實心痛者 山枝子 炒焦六錢 香附 一錢 吳茱萸 一錢 右為末蒸餅丸如花椒大以生地黃酒洗同生薑湯煎送下二十丸

又方 胡椒 華撥 各半兩 右為末以醋調捏作團子吞之

又方 治心痰亦治哮喘又治痰涎 半夏 切碎香油炒 右為末姜汁炊餅丸姜湯下二三十丸

又方 黃荊子 炒焦為末米湯調下亦治白帶

一人脉澁心脾常痛

白朮 半夏 各一兩 蒼朮 枳實 神麴 香附 茯苓 台芎 各半兩 右為末神麴為丸

治死血留胃脘作痛者 玄胡 一兩半 桂 滑石 紅花 紅麴 各五錢 桃仁 三十箇 右為末湯浸蒸餅為丸

治痰飲積胃脘痛 螺螄殼 燒上研 滑石 炒蒼朮 山枝 香附 南星 各二錢 枳殼 青皮 木香 半夏 砂仁 各半 右為末生薑汁浸蒸為丸菜豆大每服三四十九丸姜湯下 春加芎夏加黃連冬加吳茱萸各

半兩 有痰用明礬溶開就丸如雞頭大熱姜湯吞下一丸 青黛亦治心痛 藍葉搥碎取汁姜汁和服

亦可如無葉處用水一小瓶用藍安在刀頭火中燒紅焯水服

○治脾痛用海粉佐以香附末用川芎山施生薑汁煎疎湯調服為佳又方治脾痛氣實者可用牡蠣煨為粉

用酒調一二錢服 有脾痛大小便不通者此是痰膈中焦氣聚下焦

附諸賢論



王節齋曰凡治心腹疼痛但是新病須問曾服何飲食因何傷感有無積滯便與和平消導之藥若日數已多曾多服過辛溫燥熱之藥嘔吐不納胸膈飽悶口舌乾燥大小便澀難則內有鬱熱矣或原有舊病感而發綿延日久見證如前者俱用開鬱行氣降火潤燥之藥如川芎香附炒山梔黃連姜汁之類甚者再加芒硝但治心腹久痛須於溫散藥內加苦寒鹹寒之藥溫治其標寒治其本也

附脉理

脉訣舉要曰沉弦細動皆是痛證心痛在寸腹痛在關下部在尺脉象顯然附諸方

落蓋湯 治急心痛 陳皮 香附子 良姜 吳茱萸 石菖蒲 各等分

右水煎先用碗一箇用香油三五點在內小蓋蓋之將藥淋下熱服

丁香止痛散 治心氣痛不可忍 良姜 五錢 茴香 炒 甘草 各一兩半 丁香 半兩 右為末每服二錢沸湯點服

一方 治卒心痛 用乾姜為末每服一錢七米飲調服

二姜丸 和劑方 治心脾冷痛溫胃消痰 乾姜 炮 良姜 去皮各等分

右為末麵糊丸如梧子大每服三十九丸食後橘皮湯下

桂靈散 治心腹大痛危急者 良姜 麩炒 厚樸 五靈脂 明淨者各等分

右為末熟醋湯調一錢立止世不可闕此

安痛散 治心胃痛 五靈脂 去沙石 玄胡索 炒 去皮 蒼朮 煨 良姜 炒 當歸 去蘆洗各等分

右為末每服二錢不拘時熱酒醋湯調下

順氣木香散 和劑方 治氣不升降胸膈痞悶時或引痛及酒食過傷噎氣吞酸心脾刺痛女人一切血氣刺痛

蒼朮 浸 桔梗 蘆香 炒 各三兩 乾姜 炮 陳皮 去 厚樸 去 砂仁 丁皮 不見 良姜 肉桂 去 甘草 各三兩

右為末每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分熱服或鹽少許點沸湯下亦可

燒脾散 濟生方 治飲啖生冷果菜停留中焦心脾冷痛 乾姜 炮厚樸 姜炒 草萊仁 宿砂仁 甘草 炙神麴

炒麥藥炒陳皮 高良姜 炙各等分 右為末每服三錢熱鹽湯點服不拘時

溫胃湯 拔粹方 治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛 益智 五錢 砂仁 甘草 各二錢 姜黃 三分 白豆蔻 三分 陳皮 一分

澤瀉 三分 乾生薑 三分 黃芪 一分 厚樸 二分 人參 三分 右咬咀每服八錢用水二盞煎至八分食前服之

一方 用延胡索胡椒等分為末每服二錢酒調下

抽刀散 治急心痛 用斑貓七箇胡椒四十九粒同炒令斑貓焦碎去斑貓不用取淨胡椒為末作一服熱

酒調下不拘時

一方 用胡椒四十九粒乳香一錢為末男用姜湯下女用當歸湯下

扶陽助胃湯 治寒氣客於腸胃胃脘當心而痛得熱則已 乾姜 炮一揀 參 草豆蔻 甘草 炙官桂

白芍 錢各一 陳皮 白朮 吳茱萸 各五 附子 炮二 益智 五分 右剉作一服水二盞生薑三片棗二枚煎至

一盞溫服不拘時 有積聚備急丹良 見傷食類

神保丸 治心膈痛腹脇痛腎氣痛血疳痛 方見諸氣

○已上數方治寒痛之劑 初則為寒

草豆蔻丸 拔粹方 治客寒犯胃痛者宜此丸熱痛亦可服只可一二服 草豆蔻 一錢四分 麴 吳茱萸 湯泡去

益智 橘皮 殭蚕 人參 黃芪 各八 生甘草 三分 炙甘草 三分 歸身 青皮 各分 神麴 炒姜黃 各四分 半夏 湯洗

澤瀉 半錢 小便數者減 桃仁 七箇去皮 麥芽 一錢五 柴胡 四分 詳用 右除桃仁另研餘為末和勻湯浸

蒸餅丸 如梧子大服三十丸白湯下食遠旋斟酌多少用之 應痛丸 瑞竹堂方 治心氣痛不可忍 好茶末 四兩 陳乳香 二兩 右為細末用蠟月兔血和丸如雞頭大

每服一丸溫醋下不拘時

金錢子散 聖惠方 治熱厥心痛或發或止久不愈 金鈴子 玄胡索 各一兩 右為末每服二三錢酒調

下溫湯亦可

治心氣疼不可忍 用真蛤粉炒轉色白湯淬隨意服之

一方 治熱心氣疼 生蛤粉 多用百草霜少許 右為細末冷水茶清皆可調下

一方 取鍋底墨以童子熱小便調服三錢即愈

一方 用枯礬為末煉蜜丸如芡實大每服一九空心細嚼淡姜湯下如食後白湯下有虫苦參煎湯下

又方用醋半酒盞白礬三分鉄杓內化開溫服痛即止蓋白礬有去熱涎之功

沒藥散 宣明方 治一切心肚疼痛不可忍者 沒藥 乳香 各三錢 川山甲 五錢 木鱉子 四錢 右為末每服半錢至一錢酒大半盞同煎溫服

○已上數方治熱痛之劑久則為熱

失笑散 治心氣痛不可忍及小腸氣痛 蒲黃 五靈脂 酒研淘去砂土各等分 右先以醋調二錢煎成

膏入水一盞煎食前熱服

手拈散 治心脾氣痛 草菓 玄胡索 五靈脂 沒藥 乳香 各等分

右為細末每服三錢空心溫酒調服

愈痛散 治急心疼胃疼 五靈脂 去砂 玄胡索 炒去皮 蓬莪朮 煨當歸 去蘆 良姜 炒各等分

右為末每服二錢熱醋湯調服不拘時

一方 治九種心痛惡心吐水腹脇積聚滯氣

用乾漆二兩炒煙出為末醋糊丸如梧子大每服五七丸熱酒或醋湯下

○已上數方治血痛之劑婦人宜此

萬應丸 治虫噓心痛

八仙丹 治虫咬心痛 俱見積聚

足本丹溪心法附餘 卷十五 寒鬱門 三 范江海左書局印行

烏梅丸 治胃冷蚘虫攻心痛嘔吐四肢冷 烏梅 三百箇 黃柏 炙 細辛 肉桂 附子 炮各六兩 黃連 十六兩

人參 六兩 蜀椒 炒去閉口 當歸 各四兩 乾姜 炮十兩

右為末取烏梅肉和蜜丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下

一方 不拘新久用生地黃搗汁隨人所食多少搜麵作飭飭或令淘食良久下虫長一尺頭似守宮不復動

換柳散 秘方 治男婦心脾痛 五靈脂 枳榔 右為末煎薑蒲湯調三錢服膈夜先將猪肉鹽醬煮熟令患

人細嚼休吞了吐出却服前藥空心食前服 ○廣按用肉味所以引虫頭向上用藥所以殺虫也

○已上數方治虫痛之劑

桃仁承氣湯 見吐血

小胃丹 見疾類

○廣按痛則不通通則不痛夫胃脘痛者或因身受寒氣口得冷物鬱遏陽氣而不得上升也或因胃脘素

有頑疾死血阻滯怒氣而不得條達也然寒冷自外而入初則是寒鬱久變熱怒氣自內而起始終俱是

熱也遇此証者若不分寒熱而治之若之何而能愈乎今予將古方分作寒熱血虫四條是寒則溫之是

熱則清之是血則散之是虫則殺之庶乎臨証而不眩惑也矣

腹痛 七十三

丹溪心法

○腹痛有寒 積熱 死血 食積 溼痰 脉弦食脉滑蒼 作瀉清痰多作腹痛台蒼蒼木香附白芷為末

以生薑汁入棗子服大法之方若此 腹痛者氣用氣藥如木香枳榔香附枳殼之類 血用血藥如當歸川

芎桃仁紅花之類 初得時元氣未虛必推瀉之此通因通用之法久必難壯實與初病宜下虛弱衰與久病

宜升之消之 腹中水鳴是火擊動其水也用二陳湯加黃芩黃連梔子亦有臟寒而鳴者 凡心腹痛者必

用溫散此是鬱結不行阻氣不運故痛 在上者多屬食食能作痛宜溫散之如乾姜炒蒼木川芎白芷香附

姜汁之類不可用峻利藥攻下之蓋食得寒則凝熱則化更兼行氣快氣藥助之無不可者 一老人腹痛年高不禁下者用川芎蒼朮香附白芷乾姜茯苓滑石之類

戴云寒痛者綿綿痛而無增減者是時痛時止者是熱也死血痛者每痛有處不行移者是也食積者其欲大便利後痛減者是溼痰凡痛必小便不利

入方 枳榔 三棱 莪朮 香附 官桂 蒼朮 厚樸 陳皮 甘草 茯苓 木香

右為末神麴糊丸每服五十丸白湯下

腹痛治例

心法附錄曰凡腹痛以手不可按者屬實宜大黃芒硝下之實痛者不可用參朮白朮蓋補其氣氣旺不通而痛愈甚也 凡腹痛以手重按者屬虛宜參朮姜桂之類

東垣云腹痛須用芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃柏或云白芍藥只治血虛腹痛諸腹痛不可用蓋諸痛宜辛散芍藥酸收故也

如感寒而腹痛宜姜桂嘔者加丁香 如傷暑而腹痛宜玉龍丸

如癱撲損傷而腹痛者乃是瘀血宜桃仁承氣湯加當歸蘇木紅花入童子小便并酒煎服下之 凡肥人

腹痛者屬氣虛兼溼疾宜人參蒼朮白朮半夏或曰疾豈能作痛殊不知氣鬱則疾聚疾聚則碍氣道不得運行故作痛也 如飲食過傷而痛者氣寔宜木香枳榔丸下之

如稟受素弱飲食過傷而腹痛者當補脾胃以消導宜參朮山查麥蘗枳實木香 有全不思食其人體素

弱而腹冷痛者以養胃湯仍加桂枝茱萸各半錢木香三分又或理中湯建中湯皆可用內加吳茱萸良

絞腸沙作痛以樟木煎湯大吐或白礬調湯吐之鹽湯亦可探吐宜刺委中出血

臍下忽大痛人中黑色者多死

附諸方

玉龍丸 又名黃龍丸 見中暑

養胃湯 見瘧類

理中湯 見中寒

小建中湯 芍藥 三兩 甘草 一兩 生姜 一兩半 大棗 六箇 桂枝 兩半 膠飴 半斤 湯有微瀝或嘔者不用

右劉每服五錢水盞半姜三片大棗一箇煎八分去滓下飴膠兩匙許再煎溫服

七氣湯 和劑方 治七情之氣鬱結于中心腹絞痛不可忍 人參 一兩 去蘆 甘草 兩 夏 湯泡七次 肉桂 一兩 去皮

右咬咀每服三錢水一盞姜三片煎七分空心熱服

撞氣阿魏丸 治五般噎疾九種心痛痞氣塊冷氣攻刺腹痛 見諸氣

異香散 和劑方 治心腎不和腹脇膨脹飲食難化噎氣吞酸一切冷氣結聚腹中刺痛此藥最能治之

石蓮肉 去皮 兩 甘草 炙 蓬莪朮 益智仁 炒去 三棱 炮 各 青皮 去白 陳皮 去白 各 厚樸 姜製 二兩

右為末每服三錢水一盞姜三片棗一枚鹽一捻同煎七分熱服

端慈散 治脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇膀胱疝氣及婦人血氣刺痛 見諸氣

沉香降氣湯 御藥院方 治三焦痞滯氣不宣暢心腹痛滿嘔吐痰沫五噎五膈並皆治之

沉香 木香 丁香 藿香 人參 去蘆 甘草 炙 白朮 各 一兩 肉豆蔻 桂花 樺柳 陳皮 去白 砂仁

川姜 炮 枳實 炒 白檀 各 一兩 白茯苓 去皮 青皮 去白 白豆蔻 各 半兩

右咬咀每服三錢水一盞入鹽少許同煎七分溫服不拘時

桂靈散 治心腹大痛危急甚者

手拈散 治腹痛心痛不止 俱見心脾痛

木香調氣散 和劑方 治氣滯胸膈虛痞惡心宿冷不消心腹刺痛者 白豆蔻仁 丁香 檀香 木香 各 二兩

藿香葉 甘草 炙 各 砂仁 四兩 右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服 又名均氣散

燒脾散 治飲啖生冷菜果停留中脘心腹冷痛 方見心脾痛

丁香脾積丸 和劇方 治諸般食積氣滯胃膈脹滿心腹刺痛 丁香 木香 不見已豆心曠高良姜各半兩

蓬朮一兩京三稜二兩青皮洗一兩兒角三大瓶燒存性

右入百草霜三匙同碾為末麵糊丸如麻仁大每服十九至二十九止脾積氣陳皮湯下口吐酸水淡姜湯

下嘔吐藿香甘草湯下小腸氣茴香炒酒下婦人血氣刺痛淡醋湯下嘔吐薑蒲湯下小兒疳氣史君子湯

下此藥以五更初服利三五行後用白粥補

○已上諸方辛溫消散疎利之劑

調胃承氣湯 小承氣湯

大承氣湯 已上三方治心腹痛初得時元氣未虛用此藥推蕩 俱見傷寒

桃仁承氣湯 治因跌撲損傷瘀血作腹痛者 內加當歸蘇木紅花入酒童便煎服下之 方見吐血

木香枳榔丸 治因飲食一切積聚作腹痛者用此藥消導漸去為桂 方見鼓脹

神妙列仙散 治因酒所傷以致心腹痛者此藥消導最妙 見傷食

備急大黃丸 治心腹諸痛卒暴百病用此藥推逐即愈 見傷食

○已上數方辛寒消導推蕩之劑

丹溪心法 腹中窄狹須用蒼朮 若肥人自覺腹中窄狹乃是滯痰流灌臟腑氣不升降燥飲用 蒼朮行

氣香附 如瘦人自覺腹中窄狹乃是熱熱氣薰蒸臟腑宜黃蒼朮

丹溪心法附餘卷之十六

火鬱門

脇痛七十四

丹溪心法

○脇痛肝火盛 木氣實 有死血 有痰流注 肝急 木氣實用蒼朮川芎青皮當歸之類 痛甚者肝

火盛以當歸龍會丸姜汁下是瀉火之要藥 死血用桃仁紅花川芎痰流注以二陳湯加南星蒼朮川芎

肝苦急急食辛以散之用枳芎川芎蒼朮血病入血藥中行血 治咳嗽脇痛以二陳湯加南星香附青皮青

黛入姜汁 脇痛有瘀血行氣藥中加桃仁不去失并香附之類 有火盛者當伐肝木 左金丸治肝火

有氣鬱而胸脇痛者看其脉沉澁當作鬱治 痛而不得伸舒者蜜丸龍會丸最快 脇下有食積一條拉起

用吳茱萸炒黃連 控涎丹一身氣痛及脇痛痰挾死血加桃仁泥丸服 右脇痛用推氣散出嚴氏方 左

脇痛用前藥為君加柴胡或小柴胡湯亦可治

入方

小龍會丸 當歸 草龍膽 酒洗 山梔 炒 黃連 炒 川芎 各半兩 大黃 煨 半兩 蘆會 三錢 木香 一錢

一方有黃芩柴胡各半兩无大黃木香一方有甘草柴胡青皮无當歸梔子 右為末入麝香少許粥糊

丸如菜豆大每服五十九丸姜湯下仍以琥珀膏貼痛處 龍會丸亦治有積因飲食大飽勞力行房脇痛

當歸龍會丸 治内有溼熱兩脇痛先以琥珀膏貼痛處却以生姜汁吞此丸 痛甚者須炒令熱服

草龍膽 當歸 大梔子 黃連 黃芩 各一兩 大黃 蘆會 半兩 木香 一錢 半 黃柏 一兩 麝香 半錢

右十味為末麵糊丸 一方加柴胡川芎各半兩 又方加青黛半兩 蜜丸治脇痛 麝丸降肝火

抑青丸 瀉肝火 黃連 半斤 右為末蒸餅糊丸服

附諸方

推氣散

治石脇疼痛脹滿不食

枳殼

桂心

片子姜黃

各半兩一本作續發甘草錢半

右為末

每服二錢姜棗湯調下酒亦可

枳芎散

治左脇痛刺不可忍者

枳實

川芎

粉草

各半

右為末每服二錢姜棗湯下酒亦可

鹽煎散

和劑方

治男婦人一切冷氣攻上胸脇刺痛不能已及脾胃虛冷嘔吐泄瀉膀胱小腸氣婦人血氣

縮砂仁

甘草

炙

茯苓

炙

草果仁

煨

肉豆蔻

川芎

洗

茴香

炒

華澄茄

大麥芽

枳櫚

良姜

枳殼

蒼朮

陳皮

白

羌活

厚樸

右

吹咀

每服三錢水一盞入鹽少許煎至七分去渣空心溫服

沉香升氣丸

御藥院方

治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞塞

沉香

枳櫚

錢半

人參

訶子

煨

大腹皮

半兩

白木

紫蘇葉

香附子

炒

神麴

炒

麥蘖

烏藥

各一

陳皮

白

甘草

大腹皮

半兩

白木

紫蘇葉

香附子

炒

神麴

炒

麥蘖

烏藥

各一

陳皮

白

甘草

炒

姜黃

略

四

京三棱

煨

蓬莪朮

煨

益智

炒

厚樸

去皮

姜製

右

吹咀

每服三錢水一盞煎七分不拘時去渣溫服

分氣紫蘇飲

治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛氣促喘急見喘類

調中順氣丸

拔萃方

治三焦滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛

木香

白豆蔻仁

青皮

去白

陳皮

去白

三棱

炮

大腹皮

半夏

湯

七次

縮砂仁

枳櫚

沉香

各半兩

右為末

水糊丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸陳皮湯送下

復元通氣散

和劑方

治氣不宣通或成瘡癰并閃挫腰脇氣滯不散方見腰痛

枳殼煮散

治悲哀傷肝氣痛引兩脇方見氣滯

一方

治脇下疼痛如神效

小茴香

炒

枳殼

五錢

炒

右為末

每服二錢鹽湯調下

十棗湯

治脇痛甚効病人氣實可用虛人不可用

甘遂

芫花

慢火炒紫色

大戟

各等分

右為末

水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢人實更加一錢量虛實加減

控涎丹

見痛風

二陳湯

見痰類

左金丸

見火類

小柴胡湯

見溫熱

琥珀膏

見積聚

或謂予曰脇痛之症多是肝火上升不得條達之故而局方鹽煎散沉香降氣散分氣紫蘇散調中順氣丸

俱是辛溫之劑但能行氣開鬱豁痰消積而已其於降火未之有也病源是火而用辛溫之藥治之則是火以濟火而痛愈甚矣予曰不然古人之方必經有驗而筆之於書豈肯妄作而誣後人哉但後人不善於用也丹溪曰脇痛肝火盛木氣實有死血有痰流注于每度之凡左脇痛甚者即是肝火盛木氣實也宜用龍會丸左金丸辛涼之劑以治之凡右脇痛微者即是痰流注并食積宜用鹽煎散順氣丸等藥辛溫之劑以治之是也又嘗論夫左脇痛胃脘痛二證婦人多有之以其憂思忿怒之氣素蓄於中發則上衝被濕痰死血阻滯其氣而不得條達故作痛也故治婦人諸痛諸疾必以行氣開鬱為主而破血散火兼之庶乎得法矣諺云香附縮砂婦人之至寶山藥從容男子之佳珍此之謂也

跌撲損傷 七十五

丹溪心法

○跌撲損傷須用蘇木和血黃連降火白朮和中童便煎妙 在下者可先須補接後下瘀血 在上者宜飲

韭汁或和粥喫 切不可飲冷水血見寒則凝但一絲血入心即死

入方 治跌撲損傷 跌撲出血者姜汁香油各四兩酒調服之

治顛傷骨折及血出者 用滑石甘草為末人參湯調服次用生姜自然汁一盞米醋一盞獨核肥皂四箇敲

破按於姜汁米醋中紗片濾過去渣入牛皮膠煎成膏藥貼之遍身者皆可

接骨散 沒藥 乳香 各五錢 自然銅 一兩 滑石 一兩 龍骨 三錢 赤石脂 三錢 麝香 一錢 右為末好醋浸沒煮多為上

乾就炒燥為度臨睡服時入麝香抄以茶匙留舌上溫酒下分上下食前後服若骨已接尚痛去龍骨赤石

脂而服多儘好極效

○世以自然銅為接骨藥然此等方儘多大抵在補氣補血補土俗工必在速效以罔利迎合病人之意而

銅非煨不可服若新出火者其火毒金毒相扇挾香挾藥毒雖有接傷之功而燥散之禍甚於刀劍戒之

又方 冬水皮 阿膠 各等分 右炒乾為末以酒調飲醉為度

附諸方

加味芎藭湯 三因方 治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血如豆汁 當歸 白芍藥 芎藭 荆芥穗

百合水浸百日等分 右咬咀每服四錢水一盞酒半盞同煎七分不拘時服

紫金散 楊氏家藏 治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或有瘀血停積於內心腹脹滿 紫金藤皮 二降真香

續斷 補骨脂 無名異 海七次酒琥珀蒲黃 牛膝 酒浸當歸焙桃仁各一兩 大黃 銀紙裹槌碎 各半

右為末每服二錢濃煎蘇木當歸酒調下并進三服利即安

復元活血湯 拔粹方 治從高墜下惡血留於脇下及疼痛不可忍 柴胡 錢五 花粉 當歸 各三錢 紅花 甘草 各

一錢 大黃 酒浸一兩 川山甲 三錢 桃仁 五十箇酒浸研如泥

右咬咀每服一兩水一盞酒半盞加桃仁泥煎至八分服以利為度

當歸導滯散 聖惠方 治落馬墜車打撲傷血瘀大便不通浮腫痛昏悶畜血內壅欲死 大黃 一兩 當歸 二錢

射香 少許 右為末每服三錢熱酒下和劑方只大黃當歸二味等分酒調下或以酒煎服亦可

雞鳴散 治從高墜下及木石壓傷瘀血凝積痛不可忍並以此藥推陳致新 大黃 酒蒸一兩 桃仁 七粒去

當歸尾 錢五 右為末酒一碗煎去渣五更雞鳴時服取下惡血即愈若氣絕不能言急以熱小便灌之即甦

奪命散 濟生方 治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積心腹疼痛大小便不通

大黃 黑牽牛 各二兩 紅蛭 用石灰慢火炒令乾黃色半兩

右為末每服二錢用酒煎調下約行四五里再用熱酒調牽牛末二錢崔之須下惡血成塊以盡為愈

○已上諸方并涼疎導瘀血之劑

花蕊石散 和劑方 治一切金刃所傷打撲傷損身軀出血者急於傷處糝藥其血自化為黃水如有內損血入

臟腑熱煎童子小便入酒少許調一錢服之立效若牛舐腸出不損者急送入用細絲桑白皮尖直為線縫

合肚皮縫上糝藥血止立活如無桑白皮用生麻縷亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之

然後藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死腹中胎衣不下並用童子小便調下

硫黃上色明淨者四兩搗末 花蕊石一兩搗末

右二味相拌和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦罐子一箇候泥乾入藥

於內再用泥封口候乾安在四方磚石上書八卦五行字用炭一秤籠壘周圍自己午時從下着火令漸漸

上徹直至經宿火冷炭消又放經宿罐冷取出細研以細絹羅了羅極細磁盒內盛依前法服

沒藥降聖丹和劑方

治打撲閃胸筋斷骨折攣急疼痛不能屈伸及榮衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨緩縱

皮內刺痛肩背拘急身體倦怠四肢少力並皆治之

自然銅大煅醋淬十二次 川烏頭生去 骨碎補去毛

白芍藥

沒藥研乳香研當歸洗焙各一錢 生乾地黃

川芎錢半 右並生用為細末以生薑自然汁與蜜等

分煉熟和丸每一兩作四丸每服一丸匙碎水酒各半蓋入蘇木少許同煎至八分去蘇木熱服空心食前

治打撲內損筋骨疼痛本事方

沒藥 乳香 芍藥 川芎 川椒去目及當歸各半兩 自然銅三錢半

右為末黃蠟二兩溶開入藥末不住手攪勻丸如彈子大每服一丸用好酒煎開乘熱服之隨痛處臥霎時

連進有効

乳香定痛散

治打撲傷損落馬墜車一切疼痛 乳香 沒藥 川芎 白芷 芍藥 甘草 牡丹皮

生地黃

右為細末每服二錢溫酒并童子小便調不拘時服

沒藥乳香散

御藥院方 治打撲損傷痛不可忍者 白木剉五兩 當歸焙 白芷 沒藥剉研 肉桂去 乳香剉研

甘草炒各一兩

右為末入研藥并研令勻每服二錢溫酒調下不拘時

乳香黃耆散

應驗方 治打撲損傷筋骨及瘡腫焮作疼痛 乳香五錢 沒藥五錢 黃耆 當歸酒浸 赤芍藥

川芎 甘草 麻黃 陳皮

各一兩 栗殼去項蒂實人參去蘆 一兩 另研沒藥五錢 黃耆 當歸酒浸 赤芍藥

右為散每料分作十服每服用水二盞煎至一盞去滓溫服

接骨散和劑方 治從高墜下及馬上折傷筋骨碎痛不可忍者此藥能接骨續筋止痛活血

定粉二錢 當歸二錢 鵬砂二錢半

右為末每服二錢煎蘇木湯調下服後時時進蘇木湯

足本丹溪心法附餘

卷十六

大撈門

三 虎江海左書局印



補損當歸散和劑方療墜馬落車傷腕折臂呼吸痰痛連進此藥其痛即止筋骨接續澤蘭炒附子炮去皮

當歸炒蜀椒炒出甘草炙桂心各三分川芎炒六分右為末每服二錢溫酒調下日三服忌生葱猪肉冷水

治打損接骨方本事方接骨木半兩乳香半錢赤芍藥川當歸川芎自然銅研各一兩右為末每服二錢溫酒調下日三服忌生葱猪肉冷水

右為末用黃蠟四兩溶藥末攪勻候溫眾手丸如龍眼大如只打傷筋骨及閃肭疼痛者用藥一丸好舊酒

一盞浸化藥蒸熱服之若碎折筋骨先用此藥貼之然後服食

治打撲損傷骨折百一選方此藥專能接骨夜合樹俗謂之萌葛即合歡花越人謂之烏頭樹芥菜子炒一兩右為末酒調二錢澄清臨臥服又以粗淳卷瘡上扎縛之

治打損折骨損斷經驗方服此藥自頂心尋病至下兩手遍身遇受病處則颯颯有聲覺藥力習習往來則愈

矣乳香沒藥蘇木降真香松明節川烏去皮自然銅大瓶醋淬七水蛭油炒血蝎三錢土狗十箇油浸焙乾為末右為末每服五錢無反酒調下病在上食後服病在下食前服

治打撲傷損經驗方用胡孫姜研爛取汁以酒煎服渣傳傷處

接骨散張子和方并治惡瘡金頭蜈蚣一箇金色自然銅半兩燒紅醋淬研為細末乳香一錢研為細末

銅錢重半兩者或二文或五文燒紅醋淬研細金絲水蛭一錢半每箇作三截瓦上煨去氣道為度右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見出膿血先用粗藥末少許小油少半匙同打勻再入小半匙

再打勻又入前藥接骨散半錢再用銀釵子打成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止痛天明一宿自破便效

如打破骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加馬兜鈴末半錢同好酒一盞熱調連渣溫服如骨折損以接

定不疼如不折了喫了若立便止住疼痛此方累經効驗不可具述

神聖接骨丹治打撲傷損跌折肢體水蛭用糯米於砂不內兔絲子髮灰好綿灰沒藥乳香

血竭各一半兩錢一文燒七次射香一錢右研令勻每服三錢熱酒調下損在上食後服損在下空心

服約車行六七里聞骨作聲忌聽鐘鼓砧杵之聲震動恐生蘆節忌食驢肉一服見效

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com