

胎產心法
三



胎產心法卷之中

各論目錄

脈訣歌

保產論

胎殺方位

房中遊神方位

生子宜向方

安產藏衣方向宜忌

借地法

胎產心法

卷中

各論目錄



南京中醫藥大學圖書館版權所有

臨產須知

難產五因

催生論

子死腹中論

胞衣不下論

交骨不開論

諸方目錄

保產門 預服易產

達生散



北京中醫藥大學圖書館藏

密傳達生散

養胎散

神寢丸

保生無憂散

千金不換方
一名保產無憂散

保氣丸

滑胎煎

滑胎散

家傳胎產金丹



臨產須知

救逆湯

三補丸

催生門

催生獨參湯

附論

催生萬全湯

附論

催生佛手散

油密飲

三合濟生湯



魚膠散

催生簡易方

催生如意散

催生芎歸湯
即佛手散

葱白益母湯

神柞飲

秘錄加味神柞飲
附論

乳硃丹

伏龍肝散



二脫散

膠葵散

催生如神散

催生如聖散

手握丹
一名兔腦丸

琥珀黑龍丹

催生起痘神驗方

尊生救生湯

神應丹
又名萬全膏



子死腹中門

立候下胎散

烏金散
局方名黑神散○靈苑名肉桂散

脫花煎

香桂散
一名桂香散○附救苦散

牛膝丸

琥珀丸

新法下胎方

千金神造散



扶羸小品方

仙傳保命丹

一名安襁丸。一名奪命丹

官桂散

黑神散

鷄戩下死胎法

下胎聖方

千金榆皮湯

返魂丹

胞衣不下門

益母丸 一名返魂丹。附益母膏

良方奪命丹

失笑散

下胎衣單方

又方

血極膏 一名醋大黃丸

三柰下胎方

花蕊石散

良方牛膝散



灸足小指法

千金牛膝湯

蛇蛻烏金丸

半夏散

交骨不閉門

參便佛手散

加味芎歸湯

開骨膏

胎產心法中卷目錄

畢



南京中医药大学图书馆藏

胎產心法卷之中

脉訣歌

上谷閣純璽

欲產之婦脉離經。

一息六至一息三至皆曰離經。又云脉如歇止亦謂之離經。

沉細而

滑也同名。

腎脉沉滑與離經同。

夜半覺痛應分娩。來朝日午定當生。

身重體熱寒又頻。舌下見脉黑且青。捲舌流涎腹覺冷。腹

中子女已歸陰。面赤舌青細尋看。母活子死是定斷。唇口

既青沫又出。母子雙雙入鬼案。面青舌赤沫又頻。母死子

活定知正。新產婦脉緩滑吉。實大弦急死相侵。若得沉而



小者昌。忽若堅牢。命不長。寸口澁疾不調。死沉細附骨不絕生。吉凶生死全憑脉。診者須教指下明。
啟蒙曰。欲產之婦。脉離經離經之脉。認分明。其來大調勻。或如雀啄。屋漏。應腰疼腹痛。眼生花。產在須臾。却非病。脉經云。脉勻細易產。大浮緩氣散難產。

保產論

凡妊娠之於分娩。母子性命懸於頃刻。調理失宜。安反成危。將養有方。逆可使順。故凡胎前諸證。當隨證加減保護調理。甫及臨月。若婦女初產。原未慣經。不免驚畏失錯。雖



南京中醫藥大學圖書館藏

憤產之婦。然氣血亦傷。又安得恃爲無虞也。是以保產之方。斷不可廢。故達生散宜用於八九月之時。而養胎神寢等藥。當用於臨月之際。倘過月不產。則補血行氣之方。不可稍緩。至於居處失宜。頓撲動胎。及身居安逸。食物不節。憂樂不常。致胎氣難轉。或胞漿先破。惡水來多。胎乾不下。則保生千金不換萬全保氣滑胎等劑。猶宜按證選方。製服。予家傳胎產金丹。不特治胎前產後爲第一奇方。卽臨產服之。保生易產。且勝催生諸藥。更無產後諸患。若製此藥。脩用較勝諸藥萬萬矣。至於神煞符咒。亦難謂盡妄。



北京醫學院圖書館藏

如受胎之後。胎殺所在。不惟損胎。甚至損母。俱宜謹慎。而
臨月安產。產下藏衣。猶爲緊要。不可不知。至所謂雷
搖。運兒力士。天狗等神方向。及生氣方之宜向。禍害
命方。入床方之宜避。昔人填入產圖。使人知所趨避。似屬
太瑣。若拘拘於圖。又不免避此觸彼之疑。不若體元子之
借地法。既可以避神煞。又可以消俗疑。因並錄之於後。

達生散 孕婦八九個月時宜服數劑。

人參

陳皮

紫蘓各五分

白芍酒炒



白朮上炒

當歸酒洗各一錢

炙甘草三分

大腹皮一錢五分用黑

黃楊腦三個即黃楊樹葉稍

葱白三根

水煎服。春加防風五分川芎五分夏加酒炒黃芩

五分酒炒黃連五分五味子十粒秋加澤瀉五分

冬加砂仁五分或通加炒枳殼砂仁。胎動不安加

金銀箔此須野苧根一錢生地黄一錢氣上逼心加

柴胡紫蘊。多怒人加炒黃芩佐之。食少者加砂仁

炒神麴。口渴加去心麥冬酒炒黃芩。能食倍加黃



楊腦。此味瘦胎。若。有痰加薑製半夏。炒黃芩。予樓

連生散。即紫蘓飲方。去川芎。加黃楊腦。白朮。

無常歸。白芍。白朮。

密傳連生散。孕至八九個月。服之易產奇效。

大腹皮。三錢。黑豆水洗淨。人參。

紫蘓。連莖葉。陳皮。

炙草。砂仁。各五分。

白朮。土炒。白芍。酒炒。

當歸。酒洗。各一錢。枳殼。七分。麝炒。

