

壽世保元五



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

新刊醫林狀元壽世保元成集卷之五

以目金男

太醫

院吏目金船雲林龔廷賢子才編

男

龔安國校

眩暈

脉風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊濕細暑虛涎弦而滑虛  
脈則無治眩暈法尤當審諦先理痰氣次隨證治

眩者言其黑暈言其轉言言其昏眩暈之與言眩其義一也其狀目閉眼眩身  
轉耳聾如立舟車之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取執也  
風則有汗寒則掣偏暑則熱悶則重滯此四氣乘虛而眩暈也喜怒哀樂  
悲恐憂思鬱而生痰隨氣上厥七情致虛而眩暈也淫慾過度腎家不能絕  
氣歸原使諸氣逆奔而上此眩暈之出於氣虛也明矣吐衄漏崩肝家不能  
收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暈之生於血虛也又明矣以致新產之後  
血海虛損或瘀不行皆能眩暈是可不推尋致病之因乎治法隨機應敵其



問以升降鎮墜行焉最不可妄施汗下發汗劇者言亂自眩與夫少陰病下利止而頭眩時時自汗者此虛極而服也識者將有採薪之憂

清量化痰湯 主方治眩暈之總司也

陳皮

去白

牛夏

姜升火

白茯苓

王皮各一錢半

枳實

炒熟一錢

川芎

錢炒

黃芩

酒炒八分

防風

羌活各七分

甘草

三分

白芷

細辛

南星

姜升火

黃連

薑炒七分

羌活

各七分

甘草

三分

○右剉一劑生薑三片水煎服以此作丸亦可○氣虛加人參七分白朮去蘆一錢○血虛加當歸倍川芎○有熱加黃連薑炒七分

○一論頭旋眼黑惡心煩悶氣短促上喘無方言語心神顛倒目不敢開如在風雲中頭苦裂身重如山四肢厥冷不得安睡此乃胃氣虛損停瘀而致也半夏白朮天麻湯

方見頭疼

○一論勞役之人餓寒眩暈者脉虛弱也

補中益氣湯

方見內傷

依本方加半夏大

麻白芍熟地黃

○一眩暈屬氣虛有

濕痰者依本方去柴升加白茯苓川芎

半夏天麻桔梗白芷

半夏天麻桔梗白芷

○一論陰虛火動眩暈者脉必數也

清離滋坎湯

方見勞瘵  
依本方加川芎

天麻山梔竹茹少許

○一論真陽不足上氣喘急氣短自汗虛極欲倒如坐舟車眩暈手足冷

脚冷

參附湯

人參

五錢

大附子

炮三錢

右剉

一劑生薑十片水煎熱服

○一論眩暈之症因氣虛痰火炎上故也

清陽除眩湯

人參

六分

白朮

去苦一錢

白茯苓

一錢

陳皮

一錢

半夏

湯泡一錢

天麻

八分

檳榔

八分

旋復花

八分

甘草

四分

右剉一劑生薑三片水煎服

○一論肥白人日常頭眩眼花卒時暈剉者名曰瘀暈

清痰祛眩湯

南星

菖泡

半夏

姜升

天麻

蒼朮

米泔

川芎

陳皮

茯苓

去皮

清痰祛眩湯

桔梗

枳殼

主壞馬藥

酒芩

羌活各八分  
甘草三分

右剉生薑水煎臨服人竹瀝薑汁全服

○一論體虛之人一時爲塞所中口不能言眩暎欲倒手足厥冷

薑附湯

乾薑

一麻

大附子

生桂一兩

右剉每五錢水煎溫服

○一論一切失血過多眩暎不醒者

菖歸湯

川芎

當歸各等分

右剉水煎溫服○虛甚加炮過大附子

○一論氣血兩虛而挾寒作頭目眩暎者

十全大補湯

方見補益

依本方如有痰加陳皮半夏

○一治一人形體魁梧不憚酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上壅手足麻痺口乾

引飲六腑洪數而虛予以爲賢經虧損不能納氣歸原而頭暈不能攝水歸



而爲痰陽氣虛弱而麻痺虛之而已

火上炎而作渴以補中益氣湯合地黃丸

○一人氣短痰暈服辛香之劑痰

盛遺尿兩尺浮大按之如無子以爲腎氣不

能納氣歸元香燥致甚耳用八味丸

見補益

○一人形體豐厚勞神喜怒面帶

陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從眼起左

三脉洪而有力予爲足三陽虧

損用補中益氣湯加麥門五味及加減八味

丸而愈

○一大方痰暈湯

半夏法製橘紅一錢亦茯苓

一錢七分黃芩酒洗白朮五分川芎五分

黃連五分黃柏酒炒知母七分

一分石膏一錢薄荷五分甘草炙五分

右剉一劑生薑三片水煎臨卧

服

一生員形體魁梧不慎酒色因

勞怒頭暈仆地痰涎上湧手足麻痺口乾少  
飲六脉洪數而虛余以爲腎經虧損不能納氣歸源而頭暈不能攝水歸源而爲痰陽氣虛熱而麻痺虛火上炎而作渴補中益氣合六味丸治之而

愈其後或勞役或入房其病卽作用前藥而愈

○一孟都憲氣短痰量服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無余以爲皆家不能納氣歸元者燥致甚耳用八味丸料三劑而愈

○一孫都憲形體豐厚勞神善怒起左三脉洪而有力右三脉沉而無力余謂足三陰虧損用補中益氣丸參門五味及加減八味丸而愈

子全大補湯見補益補中益氣湯見內傷八味丸見補益六味丸見補益

## 麻木

脈浮而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後得之麻在下體也脈浮而緩屬濕爲麻痺脈緊而浮屬寒爲痛痺脈濡而芤屬死血爲木不知痛癢內經曰風寒濕三氣合而爲痺故寒氣盛者爲痛痺濕氣勝者著痺河間曰留着不去四肢麻木拘攣也經又曰痺者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久人深榮衛之行滯經絡時疎故不痛皮膚不榮故爲不行天所謂不仁者或

周身或四肢唧唧然麻木不知痛癢如繩扎縛初解之狀古方名爲麻痺者是也丹溪曰麻是氣虛木是濕二也雖然亦有氣血俱虛但麻因虛而風寒濕三氣乘之故周身掣痛兼麻木併作者古方謂之周痹治法宜先汗而後補也醫者宜各以類推而治之不可執一見也

○論麻木遍

身手足俱麻者此屬氣血兩虛宜

○論八仙湯

當歸酒洗

川芎

熟地黃

各七分

白芍

八分炒人參六分白朮去皮

陳皮八分

半夏曲七分白茯苓去皮

桂枝三分

柴胡四分

川羌活五分

防風五分

秦艽六分牛膝六分

甘草三分

分三

○右剉

一劑生薑一片棗一枚水煎食遠服○氣虛加黃芪蜜炒八分

○一論麻是渾身氣虛也

○加減益氣一湯

黃芪一錢

人參

白朮去

戶陳皮

當歸一升

麻

柴胡

木香硝 五香附

青皮去

橘川苔硝 八桂枝

甘草硝三

右剉一劑生薑棗煎服

一論十指盡麻并面目皆麻此亦氣虛也

○補中益氣湯依前一方去青皮川芎桂枝加麥門冬羌活防風烏藥共十四味

○一論木是濕痰死血也

### 雙合湯

當歸

川芎

白芍

生地黃陳皮

半夏  
姜炒各

桃仁

去皮白茯苓

去皮紅花

三分

白芥子

一个

甘草二分

右剉

一劑薑十片水煎熟入竹瀝鹽汁同服

○一論手足麻痺因濕所致也

○香蘇散方見感暑依本方加蒼朮

麻黃桂枝白芷羌活木瓜

○一論感風濕于肺或痛或木或

五積散方見中寒

○一論婦人七情六鬱氣滯經絡

### 手足麻痺宜

開結舒經湯

紫蘇

陳皮

香附

合烏

川芎

蒼朮米泔浸

蔻活

南星

半夏

當歸

八桂枝四分甘草三分

○右判生薑三片入薑汁竹瀝服  
○一論口舌麻木涎及嘴角頭面亦麻或嘔吐痰涎或頭眩眼花惡心遍身麻木附入薑汁竹瀝服

正麻消痰飲

黃連

半夏

瓜蒂仁

黃芩

白茯苓

桔梗

枳殼

棗炒

陳皮

天麻

細辛

南星

甘草

右判生薑三片水煎服○血虛加當歸○氣虛加入參○亦右十指麻木冒中有濕痰死血加蒼朮白朮少佐熟附子行經中死血者四物湯加紅花桃仁韭葉忌生冷魚腥發風發熱之物

○一論十指疼痛麻木不仁

大附子木杏各等分每服三錢薑三片水一碗煎七分服

○一論婦人遍身麻痺謂之不仁皆因血分受風濕所致用祛風散送下五味丸

祛風散

生川烏

白术

去其

白芷各三钱

甘草二钱

右爲細末酒調吞下

五補丸

五補丸

黃芪

蜜炒

人參

五分

附子一个

當歸三錢

白芍

蜜炒五分

石爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服五七十九秋風散送下

○一論不仁者謂不凝和也痛痒不知針灸不知是也經曰諸乘虛寒而鬱冒  
不仁蓋其血氣虛弱不能周流於一身於是正氣爲邪氣所伏故肢體頑麻  
不知痛癢寒過厥如此而而鬱冒也用桂附各半湯不愈者補中益氣湯  
人薑汗設或身汗如油喘不休喘而直視水漿不入者此爲命絕也  
○一論風熱血燥皮膚癰瘡頭面手足麻木

清涼潤燥湯

當歸

酒洗

生地黃

各半

黃連

黃芩

白芍

煨

川芎

各一

天麻

防風

羌活

荆芥

各八分

細辛

六分

甘草

五分

右剉水煎食遠服麻甚加川烏炮三分

二論面上木處可將桂枝爲末用牛皮膠和少水化開調敷之厚一二分者  
脚底硬木處可將牛皮膠化人生姜汁調和仍入南星末五錢和勻用厚  
紙攤貼三分乘半熟裹貼脚底上用溫火烘之此外治也

○一治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜卧乃熱傷元氣也

黃芪八人參伍白芍三錢柴胡二錢升麻

五分升麻

五味子十個生甘草五錢

炙甘草仁

右剉水煎稍熱空心服

○一治兩腿麻木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重如山語聲不出右寸脉

洪大

黃芪三不當歸二不

蒼朮四不陳皮五錢

藁本二錢

黃柏酒炒一錢

柴胡三不升麻

知母酒炒五味子一不

生甘草二錢半

右每剉一錢水煎空心服少待以早飯壓之

○一治皮膚間有麻木乃肝氣不行故也

黃芪

二兩

白芍半

半

橘皮一兩半

去白

澤瀉一

不

炙甘草一兩

一

兩

一

一

一

一

右判定水煎溫服

# 癲狂

癲脉搏大滑者生沉小緊急不治○狂脉實大生沉小死○癲脉虛可治實內經曰巨陽之厥則腫首頭重足不能行發爲眴眴音撻其目而暴作也是益陽氣逆而暴作也故令人卒然暴仆而不知人氣復則甦此則癇之類也又曰陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得卧而赤面熱妄見妄言又曰甚則棄衣而走登高而歌踰垣上屋罵詈不避親疎是益得之於陽氣太盛胃與大腸實熱燥火鬱結于中而爲之耳此則癲狂之候也曰癲曰狂分而言之亦有異死難經謂重陰者癲重陽者狂素問註云多喜爲癲多怒爲狂然則喜傷於心而怒傷於肝乃二臟相火有餘之症難經陰陽之說恐非理也大抵狂爲痰火實盛癲爲心血不足多爲求望高遠不得志者有之痼病獨主乎熱因火動之所作也治法癲者宜吐狂宜下癲則宜安神養血兼降痰火雖然此三証者若解脫而曰證如愚癲者縱有下金我酬吾未如之何也已矣○癲者喜笑不當

顛倒錯亂之謂也。○狂者大開目與人語所未嘗見之事爲狂也。又云狂者  
狂亂而無止定也。○譏語者合目自言曰用常行之事爲讖也。又蓄血症則  
重復諸矣。○鄭聲者聲顛無力不相接續造字出於喉中爲鄭聲也。○瘈附  
陽則狂陽附陰則癲脫陰者目盲脫陽者見鬼

○一論癲者心血不足也此方主癲狂喜笑不常

### 養血清心湯

人參

白朮

去芦

白茯苓

去皮

遠志

去心

酸棗仁

炒

川芎各一錢

生地黃

一錢

菖蒲

一錢

當歸

一錢半

甘草

五分

麥門冬

去心一錢半

右判一劑水煎服

○一論狂者痰火實盛也宜後清心滾痰丸主之若風熱實盛者宜  
防風通聖散方見中風依本方加牡丹皮生地黃桃仁主之治一切大風之疾

○一論喜笑不休者心火之盛也

以海鹽二兩火燒令紅研細以河水一大碗煎三五沸待溫三次啜之以  
銕探吐熱痰次服

黃連解毒湯 方見感言 依本方加半夏竹葉竹瀝姜汁少許

○一論婦人癲疾歌唱無時踰垣上屋者乃營血迷於心包所致也

加味逍遙散

當歸

白芍炒

白朮去芦

白茯苓去皮

柴胡

生地黃

遠志去心

桃仁去皮尖

蘇木

紅花

甘草

右判

一劑煨薑一片水煎服有熱加小柴胡湯生地辰砂水煎服

○一論發狂無時披頭大叫欲殺人不避水火古人治狂謂之失心 苦參主心

腹結氣故足以治時熱狂言

苦參丸

苦參爲末煉蜜爲丸如梧子大每服二三十丸薄荷湯送下

○一論一切癲癇風狂或因驚恐畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并至女經脉通行驚邪蘊結頓服此經効

抱膽丸

水銀二兩一冰硃少一兩研鉛一兩半

乳香一兩研

右將鉛入銚內水銀結成砂子次下硃砂滴乳乘熱用柳木棍研勻丸如芡  
實大丸一九空心井花水吞下病者得睡切莫驚動覺來卽安再服一丸除  
根○一方薄荷湯化下亦可

○一論癲狂失心不寐此方用硃砂能鎮心安神酸可使收引故棗仁能軟神  
歸心香可使利竅故乳香能豁達心志許學士加人參亦謂人參能寧心耳

寧志膏

辰砂一兩

酸棗仁炒五分

乳香五分

加人參一兩

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下

○一論癲狂失心此病因憂鬱得之痰涎包絡心竅此藥能開鬱痰

白金丸

白礬三兩

礞金七兩

右爲末米糊丸每服五十丸溫水送下

○一論癲狂五驚驚悸一切怪症此皆痰火實盛也

清心滾痰丸

大黃

酒藤黃芩

雨

青蒙石

燶

五沉香

半

牙皂角

五厘

麝香

五分

硃砂爲衣石爲細末

水爲丸

每服四五十九

滾水送下

○一論心風者何哉君火在心因怒發之相火助盛痰動于中陽氣上攻迷其心竅則爲癲爲狂所怒之事膠固於心輒自談失其條序謂言之心風與風何干也若痰不盛者則有感亦輕

○一論久患心風癲狂健忘怔忡失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不定此藥大能安神養血寧心定志

紫河車一具長流水洗淨慢火焙乾爲末練蜜爲丸空心酒送下

○一人癲狂亂打走叫上房用瓜蒂散吐出其痰數升又以承氣湯下之卽愈

○一人氣心風卽痰迷心竅發狂作用真花藥石煅黃酒淬一次爲細末每服一錢黃酒調下

○一論癲狂五癇眩暈時作時止痰涎壅盛心神昏憊此屬氣血虛而挾風痰  
燮火也

驅風化痰湯