

醫宗說約卷之三

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏
虞山元虛子嚴 煜文若氏
天池自得子毛漢迎方來氏

弟 時行李芳氏

婿葉舒嵩明韓氏

訂

傷寒賦上篇

人生疾苦莫重傷寒。岐伯陳傳變之經。內經具載仲景詳方法
之治。金匱斯明。補論方。晉王叔和功大。加註釋宋陳無已功多。
自宋及元。于今爲盛。集大成。王肯堂之輩。摘精要。陶節菴之徒。



宗說約卷之三

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏

虞山元虛子嚴 煜文若氏

天池自得子毛漢迎方來氏

弟 時行季芳氏

婿葉舒嵩明韓氏 訂

傷寒賦上篇

人生疾苦莫重傷寒。岐伯陳傳變之經。內經具載仲景詳方法之治。金匱斯明。補論方。晉王叔和功大。加註釋宋陳無已功多。自宋及元。于今爲盛。集大成。王肯堂之輩。摘精要。陶節菴之徒。



考古而徵今。博學以說約。欲明其症先正其名。霜降後爲傷寒。若溫煖則有冬溫之異。春分後爲溫病。倘暴寒則有寒疫。乃問時疫因四時天令不正。既名熱病。由夏月暑熱方。暑暍宜分。類似傷寒。有辨將行三法。明察六經。太陽則發熱。寒頭疼脊強。拘急體痛。陽明則頭額目痛微寒。身熱鼻乾不眠。少陽脇痛耳聾寒熱嘔而口苦。太陽腹滿自利。尺寸沉而咽乾。少陰之經舌乾口燥。厥陰之症煩滿囊拳。日傳一經七日尋愈。若言兩感六日再傳。麻黃桂枝與五苓治太陽無汗白汗及煩渴。葛根白虎并承氣療陽明表症裏症與下攻。惟少陽有汗吐下之禁。三賴柴胡以和解。至少陰有下溫補之症。七看脈足。

便以收功

脉沉寒有力便結宜下脉沉細無力是冷宜溫補

太陰有或下或溫之方

陰有急下急溫之例兩感之症日傳二經

仲和靈寶白

浮緊宜汗須看頭疼發熱惡寒沉寔宜攻還須便結遶

足冷而脉沉細雖面赤煩躁可溫胸滿而寸滑沉或懊憹冷

必吐煩渴而小便不利或飲水即吐或發黃而利水是求大熱

而錯語呻吟或乾嘔不眠或汗渴而寒涼是用隨症而治乃為

良醫治之失時變症蜂起失汗則面赤身痒佛鬱而不知痛處

因而大煩失下則口燥咽乾熱結而津液內消黃之痛硬不利

小便如狂不除不吐懊憹鬱悶依舊吐衄之後小便利而大便

黑蓄血居多頭汗已形小便難而渴飲漿發黃可待血有桃仁

傷寒賦



犀角黃蘗茵陳五苓陰躁陽狂有異重斑輕疹亦殊卒口禁而
背反張剛柔二症作手足冷而便通秘寒熱亡厥生死或
陶氏之書陰陽毒從李氏之論虬厥手足冷雖有熱而禁
涼狐惑唇口瘡辨上下而急求湯劑汗下禁于動氣隨腫
下左右而施苓桂泄于奔豚審氣從小腹冲心而治濕汗患不
少下早變尤多表症顯惡寒悞下則結胸痞氣悞懷之症作發
汗恐不徹過多則肉瞤肉苛筋惕小病與結胸有大小寒熱水
之稱痞氣惟痞滿不疼痛之辨大小湯丸任用姜根熨法凡凡
筋肉跳動爲亡陽肉苛者非溫補不愈循衣摸床爲死症撮空
者用升陽以求痊便結如何下攻亦可雜症互見隨病施方

吐雖屬少陽。寒當溫。食當消。而火當解。呃忒雖爲胃病。寒宜熱。

痰宜化。而秘宜通。瀉利日行。協熱協寒之故。膿血白便。寒

血之由喘。有表裏水飲之不同。喘秘而不惡寒者。下之則利。利

有寒熱。燥屎之不一重。按而痛漸減者。補之則安。頭搖屬風。有

痛宜祭心。悸停水氣虛亦然。寒熱爲少陽之邪。便秘者可下。潮

熱主陽明之燥。未結者可和。擾亂爲煩。心熱之諦。憤怒爲躁。腎

熱之微汗。下溫涼不同。陰虛陽寔有別。脉遲厥利不能食。反能

食者。曰除中。下利臍痛。引陰筋。食如故者。名臟結。二症多眠神

復兆。向壁卧。有陰寒之真。衄血紅汗。名動陰血。爲厥竭之禁。不

得卧。有數種。陽明是其大端。越經症不止一方。導赤乃其最效。

傷寒賦



膀胱有冷熱之結。咽痛有寒熱之攻。嗽水者血症與陰寒。痙者風熱及痰飲。小腹脹兩畜血與兩瀉宜分。大便不通陽陰結宜審動搖身振筋骨不榮驚悸怔忡氣虛停飲三物療咳嗽而湯異功同白虎五苓治口渴而同功異法。舌胎表裏表則白滑裏生黑更體痛介乎陰陽陽則煩疼陰如被絞汗出不止曰漏。大汗後亡陽所生頭旋眼花曰眩。汗下後陽虛所致項強爲表症結胸如痞者宜陷胸丸頭痛屬三陽嘔吐涎沫者爲厥陰痛鬱冒直視非佳兆瘡痂不言豈易爲遺尿者有熱有寒寒則死而熱可治。譫語者有虛有寔寔則下而虛難醫。胃卷囊縮厥陰亦辨陰陽手足搐攣汗出又逢風露曠日持久



變症有三汗吐下後仍不痊壞病方投鼈甲飲行住坐卧皆
定百合須求百合湯前熱未除復感寒熱往來號溫
治療原用柴胡前症已明瘥後宜謹發願說豆何今日
餘錯語昏沉咎當初之汗不徹勞復食復尤可恕調中鼈甲
膏女勞易病悔誰知逍遙燒裯有驗浮腫因嫌脾氣弱水濕不
流喜唾方知胃有寒津液不納飲酒必然將病復虛影知前汗
下傷類傷寒症有五治食積于平胃化痰飲于二陳補中益氣
治虛煩如藏續命醫脚氣惟有桃仁承氣兼治痰血損傷再且
商風暑濕多眠身重風溫可用葳蕤多汗妄言濕溫原需木附
中暑中暍之症香薷飲宜投傷濕風濕之流羌活湯有效普濟

消毒飲專療太頭六神通解方能司晚發內外有別男女須分

發寒熱而天突適來知晝明而夜譫語服寒涼而經水適

蓄血而腹滿疼胎差之間毫釐于里胎前之治安胎是

冲和治太陽不如葱飲為穩當紫蘇大黃下秘結不如

法為萬全少陽陽明此葛雙解小腹外護青黛井泥後方見直中

直寒妊娠患之絕少附于姜桂炒製用之不妨溫毒發斑升翹

加于四物自汗口渴白虎倍用人參月滿既生治法又異胗脉

偏喜沉細若浮緊反為不佳製方切忌寒涼雖身熱還須禁用

欲發表之劑加羌蘇活紫于黑神攻大便之方添酒大黃干產寶

剛柔二症五積入麝成功口噤中風聖惠愈風乃效喘急參蘇



二味煎服。眩暈二四湯。二陳四生。熱宜利。宜消諸語血虛。

是未治雜症。丹溪有言。勿拘風寒。前略有論。大綱細目。之備。陳心要秘傳。答後章之再布。

傷寒賦下篇

運氣加臨。歲時各異。六經傳變。且喜不同。察色聞聲。爲先切脉。審症莫後。觀其形體。察其死生。青色爲寒。兼主風痛之候。赤色屬熱。須防戴陽之虞。脾土色黃。有晦濕明熱之辨。肺金色白。主氣虛血脫之災。黑色爲陰。主寒主痛。光明潤澤。青黑逢之。亦可生。沉晦天枯。紅黃見之。亦有死。相生者吉。相尅者凶。分部位而觀。成敗靈樞甚詳。別死生而論。外榮六經明悉。望色曰神。聞聲



曰聖口出無倫爲譫語無稽怒叫號狂言外感有餘。出言壯
且先輕而後重。內傷不足。語言懶似且先重而後輕。語不
曰鄭聲。無人始言曰獨語。鼻塞身重自鼻傷風。聲啞唇瘡
狐惑口噤。攣攣爲瘕症。鼻窒語塞是風溫。暗語呢喃。出言
胸中汨汨。因有水。喉中漉漉。定爲痰症。見前篇。不必再及。脉因
未悉次第。推求表則浮而裏則沉。中爲少陽之候。遲則寒而數
則熱。緩爲胃氣之和。動數火滑浮爲陽爲熱。沉濇弱微弦爲陰
爲寒。脉象先分。四時順逆。方驗陰陽。急辨有力無力。須知陰症
見陽脉者生。真陽來復之兆。陽症見陰脉者死。正氣衰微之機。
後脉安靜爲痊。躁亂者不吉。溫後脉漸出爲愈。歇止亦凶。大

疎數不常定爲死。崇病進病退有別。症察陰陽尺脉無力。虛汗下宜禁。寸口無力而弱。亡之則亡。六經之脉見於。之洪陳于後。凶者身重如山石。吉者身輕如轉丸。尋衣熱乘肺胃心。又手過汗陰虛手足牽引曰風。頭重視身曰倒手。擲足揭去衣被陽可知。倦卧神昏引衣自蓋陰爲的。鼻爲肺放忌青黑而紅黃者佳。舌乃心苗喜紅滑而黑刺者忌。中胃則板齒燥脾熱則唇口焦。唇口黑青陰寒之故。唇口腫赤熱極之徵。病愈目昏黃睛黃者發黃之漸。病重目直視稍動者痰飲之妨。喜陽症之目開惡陰症之目閉。心胸滿悶察痞氣而大小結胸小腹脹膨分畜血而大小便秘。疑似須別活法宜精。太陽有

風有寒。白汗。無汗之故。陰症有虛有實。傳經直中之分。傷風
寒則汗多。脉浮而緊。傷寒見風則汗閉。脉緩而浮。前經未
過經。表在者。併病之例。三經不傳而齊病。自利者。合病
頭疼而發熱。脉沉。太陽脉似少陰而反重。無頭疼而脉沉。
少陰症似太陽而反輕。重爲正氣衰微。乾姜生附不可緩。輕爲
表邪浮淺。麻黃附子正宜投。陰症似陽固多。陽症似陰間有脉
沉足冷。知身熱面赤之症。非真重按無根。識數大紅浮之脉。是
假稀冀。旁流而痛硬。必非陰寒。手足逆冷而乍溫。自知反化陽。
狂莫作陰躁。跡勿認疹斑。發狂。由于如狂。傳經輕于直中。發
黃有血濕之辨。傷寒有內外之名。夾氣夾痰。幸節菴獨究內傷。



然感按東垣始明勞力傷寒似虛煩夾食傷寒兼食積從脈
從症莫疑從症不從脈當曉識病于未來世人方美斷
現在神鬼來通鼻孔燥乾欲嗽水者動之兆頭上汗出
者黃之基腹痛為自利之先鋒自利而痛石恐白膿之下症
為嘔吐之鄉導不食而飢者防就厥之憂心標為正不勝邪倦
卧而漸成寒逆身戰為邪不勝正汗出而預報安痊心動為標
身大動為
振或若身微動為振足冷耳聾咳嘔悶煩汗下不解斑將至安語
悲嘆煩躁少卧神志不寧狂欲與痞積于腹中動氣之不氣動
于臍下奔豚之原小便利者濕將痊汗自出者便必硬微浮緩
而不嘔清便自安肌表熱而大煩作汗必解邪氣欲傳脈緊盛



來來之病循經可推邪氣不傳脈靜和病愈之期屈指可算
知死症焉將全生陰陽毒過七朝兩感傷寒六日黑斑不
竭須亡陰陽交及摸勢衣唇吻青兮面熏黑舌卷囊目
耳聾遺尿并夫尿更添昏亂欬逆不已汗喘不休結胸症
煩躁臍結亦死陰陽易病女勞復吐舌真凶二陽合病忌弦長
汗後脈疾名臟厥重囑除中口張目陷如此之流天命何咎若
欲奪命千萬一求全之毀常來必須審症于再三百中之發有

說約歌

示吉日傷寒主方陶節菴先生提綱舉領共集四十
可謂



之極矣。包與堂編成歌括，以便學者。豈非先得吾心者。
更採名家之秘，并獨得之法，增補于後。同志者庶無
也。

太陽經

足太陽膀胱經起于目內眦，從頭下後頂

行身之背

症不同方各異。四時傷寒各有例。惟有冬月正傷寒，不與春夏
秋同治。發表實表兩妙方，用在三冬無別制。正傷寒止傷風
表虛表實不相同。表虛自汗脈浮緩，疎邪實表有神功。表實無
汗脈浮緊，升麻發表自然效。背惡寒身發熱，頭疼脊強無休
歇。俱屬太陽膀胱經，有汗無汗須分別。有汗表虛脈浮緩，無汗
表實浮緊列。



正傷寒

即病者名正傷寒 病者名正傷寒 頭疼發熱惡寒 頭脊強無汗

緊

升麻發表

湯名即麻黃湯加味

桂枝麻黃升

花川芎甘草羌活防

白

妙鼓加一撮引荊姜

寒熱頭疼無汗喘去升加葛是商

熱惡寒身體痛除杏加芍又加薯身痒面赤小便數減去芷杏

加柴芍頭悶寒熱胸飽悶枳壳桔梗加投證服之無汗病難痊

汗多又恐生別病

示古按經曰陽之汗以天地之雨名之病人得汗熱除猶天

氣鬱熱一雨而涼也凡服此劑外用厚被蓋覆其身及手足

取汗汗出不可驟動待汗乾方可揭開凡口若舌乾或土吻

