

醫林繩墨大全卷之五

明

錢塘方

穀著

江寧

周京輯

松江

陳

熙

重刊

眩運

脉經曰頭眩旋運火積其痰或本氣虛治痰爲先丹溪

曰眩運者痰動於氣也經又曰諸風掉眩乃肝木又謂

眩運動搖痛而脉弦益見熱甚則生風氣勝則生痰木

勝則生火皆因金衰不能以平之也其症發於倉卒之

間首如物蒙心如物擾招搖不定眼目昏花如立舟船

之上起則欲倒惡心冲心嘔逆奔上得吐少甦此真眩

眩運俱屬痰火但分虛實多少而治劉宗厚曰眩運上實下虛所致所謂下虛者血與氣也所謂上實者痰火逆上也急則治



醫林繩墨大全卷之五

明

錢塘方

穀著

江寧

周京輯

松

陳

熙

重刊

眩運

脉經曰頭眩旋運火積其痰或本氣虛治痰爲先丹溪

曰眩運者痰動於氣也經又曰諸風掉眩乃肝木又謂

眩運動搖痛而脉弦益見熱甚則生風氣勝則生痰木

勝則生火皆因金衰不能以平之也其症發於倉卒之

間首如物蒙心如物擾招搖不定眼目昏花如立舟船

之上起則欲倒惡心冲心嘔逆奔上得吐少甦此真眩

眩運俱屬痰火但分虛實多少而治劉宗厚曰眩運上實下虛所致所謂下虛者血與氣也所謂上實者痰火逆上也急則治



痰火緩則
補元氣

正傳云人
肥白而作

眩暈者治

宜清痰降

火爲先而

兼補氣之

藥人黑瘦

而作眩暈

者治宜滋

陰降火爲

要而帶抑

肝之劑

丹溪曰眩

暈者中風

之漸也如

肥白人氣

運也。宜以二陳湯加厚朴香附白朮炒黑乾薑之類。又

有體虛之人。外爲四氣所感。內因七情所傷。鬱結

令人一時眩暈者有之。但目暗口噤頭痛項強手足厥

冷爲驗。亦宜前方加當歸有火者加薑汁炒山梔有熱

者加酒炒黃芩。又有因於風者則脉浮自汗惡風項強

不仁。因於寒者則脉緊無汗惡寒筋攣掣動。因於暑者

則脉虛煩熱有汗躁悶不寧。因於濕者則脉濡吐逆惡

心胸滿腹脹。此六氣外感而眩暈也。亦宜前方用治如

風加防風寒加紫蘇濕加蒼朮暑加黃連。至於七情內

虛挾痰四

君二陳倍

蜜炙黃芪

少加荊穗

川芎以清

利頭目或

加蔓荊子

治法彙曰

淫慾過度

腎虛不能

納氣歸元

使諸氣奔

上宜益氣

補腎湯

如體瘦陰

虛兼痰火

傷鬱結中焦而為痰飲。隨氣上攻。令人頭眩。此氣虛生

痰而眩運也。亦宜本方去乾薑加生薑。山查亦有

房勞損傷精血。腎家不能納氣歸元。使諸氣逆奔

此氣虛而眩運也。吐衄奔漏。肝家不能調攝榮血。使諸

血錯經妄行。此血虛而眩運也。亦宜本方去半夏厚朴

氣虛者加人參麥冬。血虛加當歸童便。又有早起而眩

運者。須臾自定。日以為常。乃為之晨運。此陽虛之不足

也。宜以補陽。其運自止。日晡而眩運者。亦為之昏運。得

臥少可。此陰虛之不足也。宜以益陰。則運自定。益陰本



盛二陳四
物加片芩
薄荷入竹
瀝薑汁童
便

方中加歸芎壯陽本方中加參芪又有眉骨痛者卽眠
眶眉稜骨痛也此症皆因血虛生風之謂在婦人多有
之婦人經行將盡不能安養反以針指勞目致令眉骨
痠痛者有焉治宜養血益陰用四物湯加酒炒黃芩
類若男子眉骨痛皆因多怒怒蓄不得發越致傷肝木
木能生風令人頭目昏眩眼合難開致生眉骨痠疼宜
以貝母二陳湯加歸芎生地連翹玄參天花粉酒炒黃
芩之類經又云治眩運法猶當審諦先理痰氣次隨症
治虛當補之實可瀉之外感者發散之痰飲者消導之

又有大病
初起元氣
未復起則
眩倒宜補
中益氣倍
參芪加天
麻有痰加
二陳有火
加炒黃柏

全在活法不可執一雖因風者不可用風藥過多恐助火邪反動其痰使眩運太甚致成不易治之症

愚按眩運有虛有實實則清之用二陳等治虛則如用

二陳恐傷正氣宜深加審諦有如陰虛不足而眩運者

勞力過傷而眩運者產後去血過多而眩運者精血竭

盡而眩運者是所運皆同而所得則各異必以四物為

主加減用治如陰虛者本方加參朮炒黑山梔勞傷者

補中益氣加酒炒黃芩玄參產後者四物湯去芍地加

童便益母精血虛者四物加枸杞牛膝酒炒黃柏又有



火運者。目睛生花。起則欲倒。冷汗自出。亦宜四物。加
芪童便五味。設有用二陳之症。宜在初病嘔逆惡
或無此不可。苟能二陳施之於先。四物調治於後。
舉萬全者也。

治法主意。頭眩旋運有痰者多。血虛與熱分經治可又
謂非火不能至其運。非痰不能至其吐。吐泄其氣易治
運不得吐者。氣不得泄涉耳。

眩運主方

二陳湯

見中風

加減藥詳本症

貝母二陳湯

見噎膈

四物湯

補中益氣湯

俱見中風

頭痛

附頭風

頭痛有風
有寒有火
有痰有濕
有氣虛
有血虛有
食鬱有脚
氣而此篇
濁未及血
虛食鬱脚
氣凡食鬱
頭痛有關
寸脉滑而
實症兼嘔
吐飽悶惡
心或寒熱
如瘧治須

經曰頭風頭痛有痰者多血虛有熱分經治可又
生於瘡氣行肝俞病在於頸項令人頭痛久而不愈亦
成頭風此大槩也若夫體認治之之法諸陽皆會於頭
面惟足太陽膀胱之脉起於目銳眥上額交顙令人頭
痛則曰顙頂痛非藁本不能治入絡於腦還出下項則
曰腦盡扯痛非黃芩山梔不能止足少陽膽經之脉亦
起於目銳眥即童子髻穴也上抵頭角額尖令人頭跳
動或若針刺名曰頭角痛兩額痛非酒洗龍膽草不能



清導從傷
食治婁金
善曰病在
胃而頭痛
者必下之
方愈也血
虛頭痛者
左脈大而
無力或濡
細而數自
魚尾上咬
于頭宜四
物倍川芎
加酒苓治
之脚氣亦
頭痛其脉
細而緩或
濡肢節痛

除又有外感風邪風從上受之名曰頭風非防風白芷
不能出半邊痛者亦曰偏頭風必眼鼻半邊氣有不
非細辛羌活不能療又有風寒客於頭令人鼻塞
自汗惡風此為傷風之頭痛也治宜解表驅風與之
芷香蘇散疎邪自愈又有邪從外入客於經絡令人振
寒頭痛寒熱往來治宜十神湯汗之則愈此為傷寒之
頭痛也又或頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生此則內
虛之故治宜補中益氣湯補之則愈此為氣虛之頭痛
也又有心煩頭痛病出於耳其絡在於手足少陽二經

天便秘兼
吐逆脚膝
軟弱此則
當從脚氣

治

濕熱頭痛
多見于酒
客二陳二
術酒芩獨
活防風之
類又或以
瓜蒂散納
鼻中吐之

其症自耳前後痛連耳內痛甚則心煩治宜黃連山梔
之屬瀉之則愈此為火熱之頭痛也亦有浮游之
攻頭目或連齒鼻不定而作痛者此為風熱之頭
治宜玄參天花粉連翹之屬又有濕熱頭痛者頭重不
能移自汗不能止頭如火痰如湧治宜稀涎散吐之則
愈此為痰厥之頭痛也又有寒濕頭痛首如裹面如蒙
惡風惡寒拘急不仁斯因霧露之所中山嵐之所胃治
宜蒼朴二陳加紫蘇汗之亦愈此為寒濕之頭痛也又
有頭皮痛者枕不能安手不能按亦由浮游之火上行



當以輕揚散火之藥散之。如芩連山梔天花粉玄
翹之屬。又有腦後痛者。有似扯痛跳動。舉發無時
與火也。宜與清痰降火自可。如芩連花粉貝母酒洗
黃之屬。元虛者去大黃加菊花葉七片。再如前所云偏
頭痛者。發則半邊痛。然痛於左者屬氣。此氣勝生風也。
宜以驅風順氣爲先。如防風通聖散之類。痛於右者屬
痰。此風勝生痰也。治宜清痰降火爲要。如貝母二陳加
芩梔甘菊之屬。有真頭痛者。其痛引腦。顛至泥丸。面
青。手指青。至節者死。又曰。旦發夕死。夕發旦死。甚不可



頭痛連齒
亦痛治法
彙以清胃
散對小柴
胡去半夏
人參加薄
荷石膏

治有厥逆頭痛者其症四肢厥冷面青嘔吐皆因大寒
犯腦伏留不去故令頭痛也宜以大溫中之藥與之或
灸巔頂泥丸宮亦有頭痛連齒亦痛者必治陽明經火
如升麻石膏之屬大抵高巔之上唯火可到故用味之
薄者爲陰中之陽取輕揚而親上也如玄參花粉連翹
芩梔之類不可偏於風治而專用風藥偏於火治而一
於寒藥寒勝之劑非惟不可上行亦且傷於腸胃氣滯
不行其痛尤甚偏於風治如用風藥則香燥動火而反
生痰症亦變重也必須輕揚降火之劑治之少兼風藥

乃無害也。此法最當設。或雖有三陰三陽之異。俱以

陳爲主。隨其脈症而用治。如太陽頭痛。則惡風。脈浮

加以川芎羌活。麻黃之類。少陽頭痛。則脈弦。其症

寒熱。加以柴胡黃芩之類。陽明頭痛。自汗發熱。惡寒。脈

浮緩。加以葛根白芷。脈實大者。加升麻石膏。酒洗大黃

之類。太陰頭痛。有痰體重。或腹痛痰癖。其脈沉緩。加厚

朴蒼朮半夏黃芩之類。少陰頭痛。則經不流行而足寒

逆冷。其脈沉細。加以麻黃四逆之類。惟厥陰經不至。頭

腦後項扯痛。或痰涎沫。其脈浮緊。加以山梔芩連青



氣血俱虛
非大補詎
能挽回如
補中益氣
十全大補
俱可用也

皮之屬。又有血虛頭痛。加川芎當歸。氣虛頭痛。加人參黃芪。氣血俱虛。調血養氣之劑。如八物湯可也。少壯者。菊黃芩之類。又有白朮半夏湯。治痰厥頭痛之藥也。活附子湯。治厥陰頭痛之藥也。天麻防風丸。治傷風頭痛之藥也。又頭風之症。亦與頭痛無異。但有新舊去留之分。淺而近者。名曰頭痛。深而遠者。名曰頭風。頭痛卒然而至。易於解散。頭風作止不常。愈後觸感復發也。治療之法。大槩以清痰為主。而佐以補瀉之藥可也。

愚按頭痛之藥甚多。分治之例不一。且如諸風頭痛。非

防風白芷不能除諸寒頭痛非麻黃細辛不能療

頭痛非黃芩山梔不能驅諸濕頭痛非羌活蒼朮

去諸痰頭痛非半夏南星不能散諸氣頭痛非葱

蘇不能清此治痛之要藥也又曰頭爲諸陽之首位高

氣清必用輕清之劑隨其性而達之殆見川芎治頭痛

因其性而升上連翹治頭痛因其辛散而微浮玄參治

頭痛因其肅清而不濁藁本治頭痛因其氣勝而上升

蔓荊子治頭痛非風熱莫能療石膏治頭痛非胃火不

可加薄荷治頭痛非驚癇不可攻荊芥治頭痛非血風



不可用。升麻治頭痛。非陽邪下陷不可行。天麻治頭痛。非風熱上行不可治。當歸治頭痛。非陰虛之症不可。又有頭風之論。宜乎涼治可也。不可專泥風藥。使風於腦。再不可拔。亦不可大與墜火之劑。使風從眼出。有害於目。俗云醫得頭風。瞎了眼。此之謂也。

治法主意。初宜發散。久從火治。不可專攻風藥。而變爲

頭風

頭痛主方

芎芷香蘇散

見風寒

補中益氣湯

稀涎散

俱見中風



蒼朴二陳湯 見風寒

防風通聖散 見傷風

貝母二陳湯 見墮膈

二陳湯 見中風 加減藥詳本症

八物湯 即四君四物合

羌活附子湯 治冬月大寒犯腦令人腦齒連

白腦風為害甚速非此莫救 麻黃 黑附

羌活 蒼朮 防風 黃芪 甘草 三

麻 白殭蚕 五 各 黃蘗 白芷 各 五 咳嗽加佛耳

草 水煎服

天麻防風丸 治風濕麻痺肢節走痛注痛中風偏

枯或內外風熱壅滯昏眩 防風 天麻 川芎

羌活 白芷 草烏頭附 白附子 荆芥 當歸

甘草 五 各 白滑石 二 兩 右為末蜜丸酒下

四物湯 見中風

白朮半夏湯

清胃散 治因服補胃熱藥致上下牙疼痛不可忍

牽引頭腦滿面發熱大痛 生地 酒 三 分 升麻 一 錢

