

亥23
18-5-6

六科準繩



幼科準繩卷八

金壇王肯堂李泰甫輯 瘦樵程永培校

疳

內經曰數食肥令人內熱數食甘令人中滿蓋其病因肥甘所致故命名曰疳若夫襁褓中之乳子與四五歲之孩提乳哺未息胃氣未全而穀氣尚未充也父母不能調將惟務姑息舐齧之愛遂令恣食肥甘與夫瓜果生冷及一切烹飪調和之味朝餐暮噉漸成積滯膠固以致身熱體瘦面色痿黃或肚大青筋蟲痛鴟痢而諸疳之證作矣中錢諸疳皆脾胃之病內亡津液之所作也因大病或吐瀉後醫又以藥吐下致脾胃虛弱亡失津液且小兒病疳皆愚醫之所壞病假如潮熱是一臟虛一臟實而內發虛熱也法當補母而瀉本臟則愈假令日中發潮熱是心虛熱也肝為心母法宜先補肝母肝實而後瀉心得母氣則內平而潮熱自愈醫見潮熱妄謂其實乃以大黃蓼硝輩諸冷藥利之利既多而不能禁則津液內亡漸成疳也又如癖病發作寒熱飲水脇下有形硬痛法當用藥漸消磨之醫反以巴豆硝砂輩駁藥下之小兒易虛易實下之既過胃中津液耗損漸成疳瘦又有病傷寒五六日間有下證以冷藥下之太過致脾胃虛而津液少即便引飲不止而生熱也熱氣內耗肌肉外消他邪相干證雙諸端亦成疳病又有吐瀉久病或醫妄下之其虛益甚津液煩躁亦能成疳也 小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不止或喘而嗽與潮熱相類若不早治必成勞疳以其有癖癥則令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多即湯滌脾胃亡失津液不能傳化水穀其脈沉細益不能飲食致脾胃虛衰四肢不舉諸邪遂生羸瘦而成疳矣 楊兒童二十歲以下其病為疳二十歲以上其病為疳與瘍皆血氣虛憊腸胃受傷致之同出而異名也何者小兒臟腑嬌嫩餽則易傷乳哺飲食一或失常不鮮矣疳皆乳食不調甘肥無節而作也或嬰幼闢乳粥飯太早耗傷形氣則疳之發生或三兩晬後乳食稍多過飽無度則疳以傷得或恣食甘肥粘膩生冷鹹醋以滯中脘則疳因積成或乳母寒暄

失理飲食乖常喜怒房勞即與兒乳則疳因母患傳氣而入此非病家不能調適之過乎疳皆脾胃受病內無津液而作也有因吐瀉之後妄施吐下津液虛竭得之者有因潮熱大下利無禁約胃中焦燥得之者有因傷寒裏證冷熱大過渴引水漿變而生熱熱氣未散復於他邪得之者又有病癥寒熱肠下痛硬或者不能漸與消磨遂以鋼巴峻決津液暴傷得之者此非醫家輕藥壞病之過乎疳之為候頭皮光急毛髮焦稀顎縮鼻乾口囁唇白兩眼昏爛揉鼻擣眉脊聳體黃鬚牙咬甲焦渴自汗尿白濁酸肚脹腸鳴癖結潮熱酷嗜瓜果酸酸炭米泥土而欲飲水者皆其候也

肝疳亦名風疳亦名筋疳 **錢氏**肝疳白膜遮睛筋疳瀉血而瘦

湯氏肝疳眼白青眼睛澀癢

聖惠搖頭

揉目流汗偏身合面而卧面色青黃髮竦頭焦筋青腦熱渾身瘡癬腹中積聚下刺頻多久而不痊轉甚羸瘦

曾氏目生眵糞髮際左臉多青或白睛微黃瀉利夾水或如苔色

心疳亦名驚疳 **錢氏**面黃頰赤身壯熱 湯氏口內生瘡 聖惠渾身壯熱吐利無常煩赤面黃胸隔煩滿鼻乾心躁口舌生瘡痢久不痊多下膿血有時盜汗或乃虛驚 **楊氏**小便赤澀五心皆熱 **曾氏**敵牙舒舌愛飲冷水喜伏眠於地

脾疳亦名食疳 **錢氏**面黃腹大食泥土 湯氏脾疳食不消胃疳多吐 聖惠腹多筋脈喘促氣壅乳食不多心腹脹滿多啼欬逆面色痿黃骨立毛焦形枯力劣胸膈壅悶水穀不消口鼻常乾情意不悅愛暗憎明腸胃不利多酸臭 **曾氏**愛食冷物引飲無度身面俱黃髮稀作穗頭大項小腹脹腳弱間或釀鴻肌瘦目慢晝涼夜熱不思乳食 **錢氏**又云肥疳即脾疳也身瘦虛黃乾而有瘡其候不一種種異端今略舉之目澀或生白膜唇亦身乾黃或黑喜卧冷地或食泥土身有瘡疥鴻青白黃沫水痢色變易腹滿身耳鼻皆有瘡髮髮作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也 按此言脾疳證候多與餘疳相溫蓋疳為脾經本病固應兼之

肺疳亦名氣疳 **錢氏**氣喘口鼻生瘡 聖惠咳嗽氣逆皮毛乾焦饒涕多啼咽喉不利揉鼻敵甲壯熱憎寒唇

邊赤癢腹內氣脹乳食漸稀大腸不調頻頻泄利糞中米出皮上粟生 曾氏鼻下赤爛手足枯細口有腥氣右腮

既白

腎疳亦名急疳亦名骨疳 錢氏腎疳極瘦身有瘡疥骨疳喜卧冷地 湯氏齒爪黑 聖惠肌骨消瘦齒齦生瘡寒熱作時口鼻乾燥腦熱如火脚冷如冰吐逆既增乳食減少澀利頻併下部開張肛門不收疳瘡癩痛 曾氏兩耳內外生瘡脚如鶴膝頭縫不合或未能行牙齒生遲其縫真爛傳作走馬疳之類

楊五臟疳傷大抵然爾析而論之曰五疳出蟲曰蛔疳曰脊疳曰腦疳曰乾疳曰疳渴曰疳濁曰疳腫張曰疳勞曰無辜疳曰丁吳曰哺露證狀非一可不舉宏撮要而條析之乎五疳出蟲者疳傷之源雖起於乳哺不調然臟腑停積已久莫不化而為蟲其蟲或如絲髮或如馬尾多出於頭項腹背之間黃白或赤者可醫青黑則難療也蛔疳者失乳飯早食肉太早或腸胃停蓄甜膩化為蛔蟲皺眉多啼嘔吐清沫腹中作痛肚脹青筋唇口紫黑搖頭齒癢是也蛔雖食蟲蟲不可動從口鼻出者難治脊疳者蟲蝕脊膂身熱羸黃積中生熱煩渴下痢拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆瘡潰爪甲是也腦疳者胎中素挾風熱生下乳哺越常頭皮光急滿頭餅瘡脂熱如火髮結如穗遍身多汗頭腫額高是也臨產多慾亦易損兒眼乾疳者瘦悴少血舌乾多啼其病在心目不一睛乾啼少淚其病在肝身熱尿乾手足清冷其病在腎聲焦皮燥大便乾結其病在肺搭口痴眠胸脘乾渴其病在脾總為五疳是也疳渴者臟中夙有宿氣加之乳母恣食五辛酒麪炙博使小兒心肺壅熱日則煩渴引水乳食不進夜則渴止是爾疳渴者毛乾唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下糟粕是爾勿用熱藥止之疳渴者脾復受濕故令頭面脚手虛浮是爾法當磨膏調氣疳勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胸前熱而發瘡盜汗骨蒸噦喘枯悴是爾或渴而復濕飲水惡食肚硬如石面色如銀斷不可活無辜疳者腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不疼其間有蟲如米粉不速破之則蟲隨熱氣流散淫

蝕臟腑以致肢體癱瘓便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是爾針刺膏藥貼或濱灌兜衣露於簷下為雌鳥落羽所活免者此衣蟲入皮毛亦致無辜之疾兜衣已晒須微火烘之其若手足極細項小骨高尻削體瘡腹大脣突疏哭胸陷或生穀癥是為丁吳虛熱來往頭骨分開翻食吐蟲煩渴嘔噦是為哺露丁吳哺露皆因脾胃久虛不能化水穀以榮血氣故肌肉消鑠腎氣不足復為風冷所傷使柴骨枯露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無辜種類而疾病之至此不幾殆哉又有小兒久患脾疳內虛不食甚者天柱骨倒治法當用錢氏地黃丸加驅疳等劑仍與貼項強筋若不識證謂之五軟非也天柱骨倒凡有三種有吐瀉日久羸弱成者有肝膽伏熱面赤唇紅忽變此者有傷寒不及發表成者是皆風邪入肝以致筋絡舒弛吐瀉者當調胃氣肝熱者隨輕重以涼肝並與強筋貼項惟傷寒天柱骨倒者難療故併及之

莊氏家傳小兒二十四候 第一候瀉膿血日漸瘦是冷熱疳 第二候腳細肚高胸前骨生愛喫泥土酸鹹日久通身黃時時吐逆下痢腹內疼痛是脾胃 第二候鼻下赤爛愛探眼兼血痢是肺疳乃因喫著乘熱物或病婦所損心肺而加欬嗽更以服涼冷藥過多便上熱下冷漸漸昏沉日夜煩哭 第四候皮虛皺面無顏色身上燥癢心煩 第五候毛髮稀疎鼻生瘡是肺疳 第六候頭生瘡毛髮稀焦是肝疳 第七候牙變黃赤不定是腎疳 第八候頭髮焦乾鼻下瘡生是肺疳 第九候咬指甲毛髮作穗四肢沉重是心疳 第十候肚上筋生齒蟲蝕是骨骼疳 第十一候吐逆腹脹是胃疳又名嫡疳 第十二候齒斷臭爛面無顏色心不思食是脾疳又名口疳 第十三候愛合面卧多睡如醉腹脹急蓋是因喫生肉如此腹內有蟲是心脾疳 第十四候鼻內乾痛口中臭氣齒根有鮮血是肝肺疳 第十五候脚細肚高并肚上有青脈是脾疳 第十六候非時生瘡愛喫冷水是熱疳 第十七候皮膚上生粟子冀中米出是脾冷疳 第十八候氣滿腹脹及口乾是心胃疳 第十九候愛餐生米糙炭磚瓦是脾胃疳 第二十候揉鼻揩眼及咬指甲愛飲水是肝渴疳 第二十一候多寒热爱卧不起是骨熱

疳 第二十二候愛飲水眼目不開是肝疳 第二十二候肌體或熱或涼發渴無時是急疳 第二十四候齒斷黑唇爛開開則赤是心疳積熱

聖惠 凡小兒疳在內眼澀腹脹痢色無常或如泔結日漸羸瘦此候可療若鼻下赤爛自搔鼻頭上有瘡生而痛癢漸漸流引透於兩耳時時目赤頭髮稀疎腦皮光緊頭大項細肌體羸瘦亦可治也若唇口被蝕齒斷作五色或盡峭黑舌下有白瘡上齶有竅子口中時有臭氣齒斷漸染欲爛亦可治也若下部開張有時赤爛癢不忍下痢無常亦可治也若疳蝕脊膂十指皆癢自咬指甲頭髮作穗脊骨如鋸有時腹脹有時下痢若急治之無不瘥也

聖惠 凡小兒肝藏若目睛帶青脈左脇下硬多吐涎沫眼角左右有黑氣所衝不可治也心藏疳若受驚啼常好飲水便食辛味耳邊有脈舌上有黑盤者不可治也脾藏疳若肚大唇無血色人中平滿下痢無度水穀不消好喫泥土皮枯骨露不可治也肺藏疳若欬逆氣促多濁白沫身上有斑生如粟米大色若黑者不可治也腎藏疳若愛食酸鹹飲水無度小便如乳牙齒青黑耳腦乾燥肩膝骨枯不可治也又五疳有五絕候一觀著腳中指底不覺疼二抱著手足垂蹠無力三病未退遍身不暖四藏府濁青涎及沫不止五項筋舒展無力如此之候皆不可治也凡醫用藥切在審詳也

潔 痘者小兒病癰或久吐濁醫者妄投轉過之藥小兒易為虛實致令胃虛而亡津液內發虛熱外消肌肉一臟虛則諸臟皆弱其病目胞腫腹脹痢色無常漸如瘦瘠久不痊愈可是腸胃有風積法當宣風散症發導之後各依本臟補其母

錢 諸疳皆依本臟補其母及與治疳藥冷則木香丸熱則胡黃連丸主之疳在內目腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦弱此冷證也史君子丸主之疳在外鼻下真爛自採鼻頭上有瘡不著痂漸進耳生瘡治真瘡爛闌香散諸瘡白粉散主之 肝疳當補肝地黃丸主之 心疳當補心安神丸主之 脾疳當補脾益黃散主之 腎疳當補腎

地黃丸主之 筋痙當補肝地黃丸主之 肺痙當補脾肺益黃散主之 骨痙當補腎地黃丸主之 大抵痙病當辨冷熱肥瘦其初病者為肥熱痙久病者為瘦冷痙冷者木香丸熱者胡黃連丸冷熱之痙尤宜如聖丸縮故小兒之藏府柔弱不可痛擊大下必亡津液而成痙凡有可下量大小虛實而下之則不至為痙也初時病津液少者當生胃中津液白朮散玉之惟多則妙

楊熱者涼之冷者溫之冷熱者溫涼之此其要也熱痙病多在外鼻下赤爛頭瘡濕瘻五心煩熱坎氣蘿渴引冷水煩躁卧地壯熱脚冷潮熱往來皆熱痙也冷痙病多在內利色無常其沫青白肢體軟弱目腫面黧又一證躁渴卧地似有熱狀惟飲食不進滑泄已亦冷痙也其有濕多膿血日加瘦弱此則謂之冷熱痙大抵痙之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者虛中之冷治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫驟補故錢氏又曰小兒易為虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此而勿誤是果非幼幼之綱領乎上醫處此消積和胃滋血調氣隨順藥餌以扶之淡薄飲食以養之榮衛調和臟腑自然充實一或過焉君子未保其往也取積之法又當權衡積者病之母由積而虛謂之疳極諸有積者無不壯熱脚冷須酌量虛實而取之若積而虛甚則先與扶胃使胃氣內充然後為之微利若積勝乎虛則先與利導纔得一世急以和胃之劑為之扶虛然取積雖當疏利如白朮蔻蘿蔔子縮砂蓬朮消積等輩亦不可無脇間癖痛亦虛中之積也先寒後熱飲水不食或因飲水以致喘噦錢氏有癖為潮熱之說治法解散寒熱即與下癖合是而觀發作不同療治不一又可無權度於此哉

〔曾〕

大抵痙之為病皆因過餐

飲食於脾家一臍有積不治傳之餘臍而成五疳之疾若脾家病去則餘臍皆安苟失其治日久必有變異然脾家病宜蘆薈丸沉香檳榔丸積或水晶丹積烏犀丸積更審虛實療之有蟲者投史君子丸腹化蟲飲腹如心腹痛吐清水蟲自下多投二聖丸腹諸疳證皆宜用局方五疳保童丸或萬應丸常服化積治疳仍各投本臍調理之劑甯心用茯神湯驚調肝用耆歸湯調脾用參苓白朮散不乳補肺用補肺散咳補腎用調元散麻各得其宜則前證不

致再作 演山 積是疳之母所以有積不治乃成疳候又有治積不下其積存而臟虛成疳尤重大抵小兒所患疳證泄瀉無時不作風候者何惟疳瀉名熱瀉其臟腑轉動有限所以不成風候雖瀉不風亦轉他證作渴虛熱煩躁下利腫滿喘急皆疳候虛證古云疳虛用補虛是知疳之為疾不可更利動臟腑發作之初名曰疳氣腹大脹急名曰疳虛瀉痢頻併名曰疳積五心虛煩名曰疳熱毛焦髮穗肚大青筋好喫異物名曰疳極已極受病傳就發往來形體枯槁面無神采無血色名曰疳勞手足細小項長骨露尻鷄無肉肚脹臍突名曰丁奚食加嘔噦頭骨分開作鴻引飲蟲從口出名曰哺露此皆疳候又因多食生冷甘粘肥膩積滯中脘不化久亦成疳治疳之法量候輕重理其臟腑和其中腕順其三焦使胃氣溫而納食益脾元壯以消化則臟腑自然調貼令氣脈與血脉相參則筋力製導力俱健神清氣爽疳消蟲化漸次安愈若以藥攻之五臟疏却腸胃下去積毒取出蟲子雖曰醫療即非治法益小兒臟腑虛則生蟲虛則積滯虛則脹滿何可利下若更轉動腸胃致虛由虛成疳疳虛證候乃作典羣無辜之孩難救矣 薛 痘者乾也因脾胃津液乾涸而患在小兒為五疳在大人為五勞總以調補胃氣為主後列諸方其證候龐雜不能名為何等疳者即於通治諸疳方內檢之若證候的與五疳等條下證候對者即檢本疳方分寒熱虛實擇而用之當須識此勿令誤也

肝疳 楊氏云肝疳者由乳食不調肝臟受熱所致也若乳母寒溫不調滋味不節或外感風寒內傷喜怒邪氣未散遽以乳兜多成風疳肝者眼之候上隔伏熱痰涎壅滯以致肝風入眼赤腫翳生眵淚爛眶痛癢揉擦昏暗雙目甚至經月合眼亦名疳眼外證搖頭揉目白膜遮睛眼青淚多頭焦髮豎筋青腦熱甲癢筋掣燥渴汙汗多下痢瘡僻是也 錢氏以地黃丸主之 楊氏以天麻丸生熟地黃湯主之 曾氏調肝用耆歸湯

天麻丸 治肝疳風疳疳眼

青黛

川黃連

天麻

五靈脂

夜明砂

微炒

川芎

蘆薈各二錢

龍膽草

防風

蟬退去足一錢半

全蝎二枚

麝香少許

乾蟾頭災焦三錢

右為末，豬膽汁浸糕丸，麻子大，每服十九薄荷湯下。

生熟地黃湯

治痘眼閉合不開，內有矇霧。

生地黃

熟地黃各半兩

川芎

赤芍藥

枳殼炒

杏仁水浸去皮

川黃連

半夏麵

天麻

地骨皮

甘草災

當歸錢半

右剉散，每服一錢，生薑

三片黑豆十五粒水煎溫服

耆歸湯 治小兒稟賦素弱，豆瘡出不快者及肝虛目視不明。

黃耆壹兩，蜜水塗災

當歸酒洗燒乾

白芍藥

川芎各半兩

甘草三錢，災

右件咬咀，每服二錢水一盞，煎七分，無

時溫服

張渙熊膽天麻丹 治風瘡羸瘦，搖頭揉目，百服拘急。

天麻

羌活 真熊膽

蟬殼

使君子去殼

胡黃連各一

蘆薈

乾蟾酥災黃各半兩

右件搗羅為細末，粳米飯和如黍米大，每服十粒，煎荆芥湯下，量兒大小加減。

烏蟾丹

烏蛇酒浸去皮骨，災令黃乾蟾黃

蛇蛻皮燒灰一兩

各半兩

胡黃連

半兩已上搗羅為細末，次用

真蘆薈

麝香

熊膽並細研，各二錢半

右件同拌勻，以粟米飯和如黍米大，每服十粒，煎薄荷湯下，乳前。

莊氏家傳治小兒風瘡順肝氣，進飲食蘆薈丸。

蘆薈一錢，別研，秤或只以皂角水磨

草龍膽一兩淨洗，剝焙乾秤

右件藥一處搗羅為末，用不蛀皂角三挺，以水一升，慢火熬成膏，入前一味藥調和得所，丸如菉豆大，每服三丸至五丸，薄荷湯下。

汁用生絹滌去滓，入銀器內慢火熬成膏，入前一味藥調和得所，丸如菉豆大，每服三丸至五丸，薄荷湯下。

漢東王先生家寶治小兒風疳氣攻項下生核子皂角膏方

皂角大者一莖燒存性

糯米一合炒

草頭烏生

黃皮一錢炒黑色

右為末每用不拘多少以井華水調貼如未安

須用水精丹取後用調氣觀音人參散等藥補仍再貼兼與疳藥相間服

神妙觀音散 補虛調胃氣進乳食止吐瀉久不進食

白扁豆微炒

石蓮肉秋去心

人參焙各一分

茯苓一錢半培

甘草炙

香白芷

綿黃耆水拌足炒碎用蜜

木香炒各一錢

神龜二錢

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢

用水一藥注或半銀盞棗子半斤煎十數沸服

人參散 捩虛調胃氣進乳食止吐瀉

人參

茯苓

去心炒

黃耆半兩水拌足炒蜜

甘草二錢

右為末每服嬰孩一字二三歲半錢四

五歲一錢以水一藥注或半銀盞入棗子半斤煎十數沸服

莊氏第六候頭生瘡毛髮稀焦是肝疳方

肉豆蔻

蟾灰全者各一個

桔梗炮

茯苓煨

大黃根各一兩

龍腦

麝香各一錢

右為末軟飯丸如麻子大粟米飲下三丸只可兩服

治小兒手足動眼目不開有時語笑或即嗔怒兼多驚手指甲青狀形似死妾稱天鈞通神丸

茯苓

龍齒各兩

鉛丹

胡黃連各一分

銀箔五片

麝香一錢

鈎藤一兩

右為末煉蜜丸麻子大每十九米飲下莊此第二十二條用此方

第三風疳小兒手足拘掣眼目不開有時自笑或嗔怒驚叫手爪甲青狀似鬼形已似天鈞須服金箔茯苓散

金箔五片

茯苓

牛膝

胡黃連各一兩

龍骨一分

木香

麝香各一 右件為末每服一字米飲下日二服忌油膩

心疳 楊氏云由乳食不調心臟受熱所致也蓋其血氣未定乳哺有傷易生壅滯內有滯熱未得疏通故心滿而作壅滯之候外證身體壯熱臉赤脣紅口舌生瘡胸膈煩悶小便赤澀五心皆熱盜汗發渴齒虛驚是也
錢氏安神丸主之 薛氏用安神丸以治心異功散以補脾 楊氏以茯苓丸 錢氏安神丸主之 曾氏甯心丸
茯神湯

朱砂安神丸 治心疳怔忡心中痞悶

朱砂四錢 黃連 生地黃各半 生甘草二錢 蘭香葉二錢
輕粉各五 右為末乾敷上

茯苓丸 治心疳驚疳

茯神 蘆薈 琥珀 黃連淨 赤茯苓各三 鈎藤皮

遠志肉焙乾 蝦蟆灰各二石白蒲一錢麝香少許 右為末粟米糊丸麻子大每服十九薄荷湯下

茯神湯 治心氣不足虛而驚悸日常煩哭及嬰孩生下羸瘦多驚宜子母同服自然有效
茯神去皮木根一兩 人參去蘆當歸去蘆尾酒洗足半兩 甘草洗足半兩 右件㕮咀每服一錢水一盞煎七分無時溫服有微熱煩躁入夢門冬去心同煎

張漁參黃丹 治驚疳挾熱夜卧驚悸

乾蝎二十一個燬炒

天漿子一十四個乾者微炒

人參

朱砂各一

胡黃連各一

天竺黃半兩研已上

末次入

青黛

龍腦

細研並

右件一處拌勻燥密和如黍米大每服十粒人參湯下量兒

大小加減

天竺黃丹

天竺黃一兩
細研

晚蠶蛾微炒
並細研

白僵蠶微炒
羅為細末上搗

川黃連各半兩已上
羅為細末次用

朱砂

青黛

麝香各一分
並細研

右件拌勻粳米飯和如黍米大每服七粒至十粒煎人參湯下量兒大小加減

仙人水鑑治小兒驚疳朱砂丸

五歲至十五歲並宜服之

朱砂三歲
研

青黛研
一兩

黃連

鬱金為末

夜明砂用炒焦黑
各半兩

麝香

熊膽浸冷水一雞子多
一宿各一錢子多

右同研如粉次入浸熊膽水和為丸如菉豆天空心臨卧金銀薄荷湯

下三丸至五丸切忌生冷油膩神效

萬全方真珠散 治小兒心疳體熱黃瘦

真珠末
半兩

麥門冬去心
各半兩

天竺黃

金銀箔各研五十片
加入諸藥未內
和

牛黃

麝香各細研

胡黃連

甘草炙

羚羊角屑各
一分

川大黃炒

當歸微炒

朱砂

雄黃

茯神

犀角屑各
一分

右搗羅為散每服以茵陳湯調半錢量兒大小服之

朱氏用小兒肚大項小即是驚疳方

鈎藤

甘草各二分

人參

桔梗各一分

右件為末以水一茶碗入藥二錢煎取六合去滓重煎

溫服

治五疳八痢心藏熱方

蘆薈半兩
研

輕粉

青黛

香墨

飛羅麪各一錢

史君子一個

蝸牛五個
炒焦細研

麝香半錢

右為末細研滴水為丸芥子大生地黃汁化下一丸至二丸薄荷湯亦得

莊氏第
九候用

麝香丸 治小兒一切驚瘡等病

龍膽草 胡黃連各半 木香

蟬蛻去頭足洗各一錢爪蒂

龍腦

麝香 牛黃各一錢並各細研

右猪膽為丸如桐子及菉豆大驚瘡或秘或鴻清米飲送下小兒五七粒至二十粒眼瘡猪肝湯下疳渴獐猪湯下豬肉湯下亦得驚風發搐眼上竄薄荷湯下一丸更水研一丸滴鼻中牙

疳瘡口瘡研貼蟲痛苦棟根湯或白薑羨湯送下百日內小兒大小便不通水研封臍中有蟲候乾漆麝香各少許并入生油一兩點溫水化下一大丸慢驚勿服

睡驚丸 治小兒一切驚瘡食積風癧之證

史君子五十個燒去皮 香墨一塊 金銀箔各七

膩粉二錢

右先將史君子存性同墨研細次入金銀箔乳鉢內

研次入膩粉并麝香少許研令極細稀糊丸如桐子大陰乾每服一丸薄荷湯磨下一歲已下半丸一名青金丹極效

治小兒因喫著患病癪次腹痛并及驚風毒癪便乃下痢吐逆又名癪瘡

桃仁去皮尖炒

胡黃連各半

沉香

末砂別研一分

金箔五片

右為末軟飯丸麻子大米飲下五丸癪汁

下亦得莊氏第十一候用此方

治小兒胃瘡及進食方

胡黃連

蘆薈各一
分

肉豆蔻一個

檳榔

乾蟾兒各半個

夜明砂半分

朱砂

麝香錢半

右為末煉蜜丸菉豆大一歲一丸米飲及乳汁下亦得如是瘡盛次加二丸至三丸

取下蟲屎為驗五日一服

治小兒心臟積熱生瘡桃花丸

寒水石一兩用炭火燒熟研如麯細朱砂半錢細研合如桃花色右為末水浸蒸餅丸如粟米大冷水下三五丸服旬日自然安

妙莊氏第二十
四候用此方

脾疳楊氏云由乳食不節脾胃受傷所致也或乳母恣食生冷肥膩或乳兒過傷或飯後與乳致吐或乳多眠久則變為乳癖腹脇結塊亦為癪疳外證而黃身熱壯大腳弱吐逆中滿乏力叫啼水穀不消泄下酸臭合面困倦減食喫泥是也錢氏益黃散主之楊氏以靈脂丸同益黃散主之薛氏用四味肥兒丸以治疳五味異功散以生土曾氏調脾用參苓白朮散不乳食

益黃散

見脾

四味肥兒丸治嘔吐不食腹脹成疳或作瀉不止或食積脾疳目生雲翳口舌生瘡牙齦腐爛發熱瘦怯遍身生瘡又治小便澄白腹太青筋一切疳證

黃連炒

蕪荑

神曲

麥芽

炒各等分

右為末水糊丸桐子大每服一二十丸空心白滾湯送下

靈脂丸治脾疳食疳

白豆蔻仁

麥蘖炒

五靈脂

縮砂仁

蓬朮煨

青皮去瓤

橘紅

史君子

蝦蟆

炙各二錢

右為末米糊丸麻子大每服十九米湯下

神效換肌丸治脾疳肌瘦潮熱盜汗泄瀉糟粕頭大腹急

川黃連炒

鼈甲酒炙

肉豆蔻煨

各二錢

使君子麯裹

神曲炒

麥芽

炒各半兩

荳子肉

二錢半

麝香五分

右為末糊丸芥子大米湯下

張渙木香散治食疳不知饑飽積滯內停腹大腳細下痢無度

南木香剉

肉豆蔻

去殼各一兩

乾蟾酥

火炙二個

胡黃連

使君子

去殼各一兩

五靈脂

各一兩已上搗為細末次用

巴豆七個去皮心膜紙裏出油細研

麝香壹分細研

右件同拌勻滴水於石臼中搗一二百下和如黍米大每服二

粒至三粒溫生薑湯下乳食後看兒大小加減

積柳丹能食不生肌肉宜常服

積柳麯裹炮艇乾為度

木香

胡黃連各一兩

代赭石一分研已上各搗羅為細末次用

香墨燒存性細研

麝香研細各一分

右件通拌勻糯米飯和如黍米大每服十粒煎橘皮湯下食後量兒大小加減

肉豆蔻丹肌瘦挾積常服尤佳

肉豆蔻去殼

使君子去殼

青橘皮嫩黃各一兩

牽牛子炒黃一分研已上搗羅為細末次入搗

蘆薈一分研

麝香一錢研

右件一處拌勻用糯米飯和如黍米大每服十粒生薑湯下食後量兒大小加減

聖惠木香丸治小兒食疳腹中多痛大腸或痢鼻癢乾瘦時有體熱

木香

胡黃連

蟾頭集火令黃

麝香

蘆薈

青黛

雄黃各細研

香墨

熊膽分一

使君子

半兩

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如黍豆大每服以粥飲

下五丸量兒大小以意加減

訶黎勒丸治小兒食疳水穀不消腹脹滿好吃泥土肌體瘦弱

訶黎勒皮三分去殼

青黛

麝香

蘆薈

朱砂各研

熊膽研入各一分

右件藥搗羅為末都研令勻用酒煮粳米飯和丸如黍粒大每服以粥飲下三丸日二服量兒

大小增減服之

桃花散治小兒食疳腹脹

為散每服以溫粥飲調下半錢看兒大小臨時加減

孔氏家傳治小兒脾疳方

胡黃連 史君子 五味子 檳榔各一 南木香半錢 右為末粟飯丸如棗豆大飯內與五
七丸日三服

大胡黃連丸錢 治一切驚疳腹脹蟲動好喫泥土生米不思飲食多睡吼嘔藏府或濁或祕肌膚黃瘦毛焦髮黃
飲水五心煩熱能殺蟲進飲食兼治瘡癬常服不濁爛喉泥加切

胡黃連

黃連

苦棟子

白蕷羹

乾蟾頭

研一錢

燒存性

麝香另研一錢

青黛

另研半錢半

蘆薈

另研一分

右先將前四味為細末

猪膽汁和為劑

每一丸如胡桃大入巴豆仁

一枚置其中用油單紙一重裹之同米一升許蒸米熟為度入後四味為丸少入麪糊丸如麻子大與十丸或十五丸清米飲下食後臨卧日三服

大蕷羨湯又名梔子茯苓湯

治黃疸土色

為熱

當小便不利

今反利者

知黃色

為溫

利小便

為躁

利胃經

中大熱

為黃

脫落

知膀胱腎

俱受

土鼻下

斷作瘡者

土逆行營氣伏火也能乳者

胃中有熱故也

喜食土者

胃氣不足

面色黑者

為寒大便青

屬寒

褐色血黑色

熱蓄

血中間黃色

腸胃有熱治

法當滋營潤燥內除寒熱外致津液

山梔

黃連

麻黃

羌活

柴胡

茯苓各三

黃柏

甘草

災各二分

大蕷羨

白朮各五

防風一分

當歸四分

右件剉如麻豆大作一服水一盞

半煎至一盞去渣稍熱服食前

治小兒脾胃面黃多睡手足浮腫方

桑白皮

焙

漢防己

焙

人參

茯苓

胡黃連

炮

麝香

分一

右為末煉蜜丸如麻子

大用米飲下五丸一日二服

莊氏第十五方

莊氏第二候細肚高胸前骨生瘻喫泥土酸鹹日久通身黃時時吐逆下痢腹內疼痛是脾疳宜服

虎睛

一對燒

牛黃

朱砂

麝香

各分

桔梗

半兩燒

右為末煉蜜丸生薑湯下三丸至五丸

治小兒脾疳濕血肚大氣喘方

丁香

白朮

龍腦

乾蝎

胡黃連

夜明砂

秋各一分

右為末軟飯丸米粒大

蕪荑湯下

治小兒通身黃瘦大小便結澀脾所召也

漢防已

炒妙

甘草

炙各一兩

桑白皮

木通

木香

各半錢

檳榔

一個

胡黃連

一分

右為末母

服一錢水七分蓋生薑少許煎至五六分分溫二服

莊氏第十五方候用此方

治小兒疳氣進飲食黃耆散

黃耆

五味子

厚朴

薑汁

白朮

蒼朮

芍藥

甘草

炙

陳橘皮

乾薑

乾蝎

當歸

各一兩

木瓜

二兩

右為末每服半錢米飲調下

丹經
小兒吃泥

石膏

黃芩

陳皮

茯苓

甘草

白朮

右為散煎服

治小兒吃泥及癩肚

膩粉一分用沙糖搜丸如麻子大空心米飲下一丸瀉出土瘻

如掌

切服也

莊氏第十九候愛養生米麪炭磚瓦是脾胃疳瘻會及治小兒驚

風五宿

驚鴻

蘆薈

胡黃連

牛黃

天竺黃

草龍膽

茯苓

半

兩

半

半

半

半

半

半