

亥23

18-547.

六科準繩



肺

〔錢〕肺主喘 實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者 虛則哽氣長出氣 肺病悶亂哽氣長出氣氣短喘急

肺熱手搯眉目鼻面甘桔湯主之 肺盛復有風冷胸滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後發散風冷散肺瀉白散

大青膏主之肺只傷寒則不胸滿 肺虛熱唇深紅色治之散肺虛熱少服瀉白散 肺臟怯唇白色當補肺阿膠

散主之若悶亂氣羸喘促哽氣者難治肺虛損故也 脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母也母子皆虛不能相營

故名曰怯肺主唇白而澤者吉白如枯骨者死 此以唇診肺之法也唇白色者肺臟怯也阿膠散主之若子尋衣頭反亂捨物者肝熱也宜瀉青丸手搯眉目鼻面者肺熱也宜甘桔湯

是也 肺病見春金旺肺勝肝也當瀉肺輕者肺病退重者目淡青必發驚更有赤者當摘 海藏云為肝怯故目淡青也 潔

肺主燥自病則喘嗽燥則潤之 實則喘而氣盛瀉白散主之 虛則喘而少氣先益黃散後阿膠散主之 心乘

肺賊邪熱而喘嗽先地黃丸中導赤散後阿膠散主之 肝乘肺微邪惡風眩冒昏憤嗽羌活膏主之 腎乘肺實

邪增寒嗽清利百部丸主之 脾乘肺虛和體重吐痰泄瀉嗽人參白朮散主之 〔劉〕凡肺之得病先觀心脾二

臟之虛實若心火燦金即當先抑心氣後吃肺藥若心氣和即使着脾脈若脾氣虛冷即不能相生而肺家生氣不

足則風邪易感故患肺寒者皆脾虛得之若脾氣盛實則亦痞隔中焦而大腸與肺表裏不能相通夫中焦熱隔則

肺與大腸不通其熱毒之氣必上蒸於肺而生痰故患肺熱者多脾實得之心氣盛者瀉之脾氣虛者益之脾氣實

者通之然後隨其肺之寒熱以治之故有抑心氣益脾氣通肺氣三藥若診其脈氣心脾兩臟俱和而肺自生疾則

但察肺家虛實而治之 〔薛〕肺經鬱熱用瀉白散肺氣自虛用四君子湯外和所乘用參蘇飲心火炎燥用人參

平肺散中焦實痞用大承氣湯脾不能生肺用異功散夫肺氣盛者肺中之邪氣盛也其脈右寸必浮而有力宜用

瀉白散以瀉之若肺虛而有熱者執肺熱還傷肺之說而不用人參則誤矣仍參其證治之

〔海〕肺苦氣上逆急食苦以瀉之訶子皮一作黃芩 肺欲收急食酸以收之白芍藥 以酸補之五味子

瀉之桑白皮 肺虛以五味子補之如無他證錢氏補肺阿膠散主之虛則補其母脾乃肺之母以甘草補脾

阿膠散錢氏 又名補肺散

阿膠一兩半 趁炒 黍粘子香炒 甘草炙各二 錢半 馬兜鈴半兩 杏仁上個去 皮尖炒 糯米一兩 炒 右為末每服一二

錢水一盞煎至六分食後溫服 海杏仁本瀉肺非若人參天門冬麥門冬之補也當以意消息之 薛前

方乃通治肺金之劑經云虛則補其母若前藥未應當用五味異功散以補脾

〔海〕肺實以桑白皮瀉之如無他證以瀉白散主之實則瀉其子腎乃肺之子以澤瀉瀉腎

瀉白散錢氏 又名瀉肺散

桑白皮細剉 炒黃 各一兩 地骨皮洗去土焙 各一兩 甘草炒半 兩 右件為末每服一二錢水一中盞入粳米百粒同

煎至六分食後溫服 〔海〕治肺熱骨蒸自汗宜用此直瀉之用山梔黃芩方能瀉肺但當以氣血分之

甘桔湯方見 喉 大青膏 羌活膏俱見 驚搖 百部丸方見 咳嗽 人參白朮散方見 痘渴 四君子湯方見 雜 病虛弱

參蘇飲雜病 發熱 人參平肺散雜病 咳嗽

效嗽

內經曰五臟六腑皆令人欬非獨肺也皮毛者肺之舍也皮毛先受邪氣邪氣聽從其令也五臟之欬久乃移於六腑又病機式要云欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也欬嗽謂有聲有痰也因傷肺氣動於脾濕故欬而嗽也又生氣通天論云秋傷於濕冬必欬嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣上衝而為咳嗽是則動於脾濕而為痰也蓋風乘肺者日夜無度汗出頭痛痰涎不利熱乘肺者急喘而嗽面赤潮熱手

足寒冷小兒多有之大乘肺者嗽上壅涕唾出血甚者七氣血溢燥乘肺者急喘而嗽百節內痛頭面汗出寒熱往來皮膚乾燥細瘡爆癰大便秘澀涕唾稠粘寒乘肺者或因形寒飲冷冬月坐卧濕地或受冷風春秋之氣或因外感夏是火氣炎上最重秋是濕熱傷肺冬是風寒外來也宜各隨其證而治之

錢氏法

夫嗽者肺感微寒八九月間肺氣大旺病嗽者必實非久病也其證面赤痰盛身熱法當以葶藶丸下

之若久者不可下也十一月十二月嗽者乃傷風嗽也風從背脊第三椎肺俞穴入也當以麻黃湯汗之有熱證

面赤飲水涎熱咽喉不利者宜煎甘桔湯治之若五七日間其證身熱痰盛唾粘者以編銀圓下之有肺盛者嗽

而後喘面腫欲飲水有不飲水者其身即熱以瀉白散主之若傷風咳嗽五七日無熱證而但嗽者亦當虛丸下

之後用下痰藥有肺虛者嗽而哽氣時時長出氣喉中有聲此久病也以阿膠散主之痰盛者先實脾後以編銀

圓微下之涎退即補肺補肺如上法有嗽而吐水或青綠水者以百祥圓下之有嗽而吐痰涎乳食者白餅子

下之有嗽而咯膿血者乃肺熱食後服甘桔湯久嗽者肺亡津液阿膠散補之嗽而痰實不甚喘而面赤時

飲水者可編銀圓下之治嗽大法盛即下之久即補之更量虛實以意增損杜氏子五歲自十一月病嗽至三

月未止始得嗽而吐痰乃外風寒蓄入肺經令肺病嗽而吐痰風在肺中故也宜以麻黃散輩發散後用涼藥壓之

即愈時醫與珠粉丸半夏丸編銀丸諸法下之其肺即虛而嗽甚至春三月間尚未愈召錢視之其候面青而光嗽

而喘促哽氣又時時長出氣錢曰病困十已八九然所以面青而光者肝氣旺也春三月者肝之位肺衰之時也嗽

者肺之病肺自十一月至三月肺即虛痿又妄下之脾肺子母俱虛復為肝所勝此為逆也故嗽而喘促哽氣長出

氣也錢急與瀉青丸瀉之後與阿膠散實肺次日面青而不光錢又用補肺而嗽如前又與瀉肝未已而又加肺虛

唇白如練錢曰此病必見不可治之何者肝太旺而肺虛絕肺病不得時而肝勝之今三瀉肝而肝病證不退三補

肺而肝病尤虛此不久生故言死也此證病於秋者十救三四春夏者十難救一果大喘而死京東轉運使李公

有孫八歲病嗽而胸滿短氣醫者言肺經有熱用竹葉湯生黃膏各二服治之三日加喘錢氏曰此肺氣不足復有寒邪即使喘滿當補肺脾勿服涼藥李曰醫已用竹葉湯生黃膏錢曰何治也醫曰退熱退涎錢曰何熱所作白肺經熱而生嗽嗽久不除生涎錢曰本虛而風寒所作何熱也若作肺熱何不治其肺而反調心蓋竹葉湯生黃膏治心藥也醫有斬色錢治愈 東都張氏孫九歲病肺熱他醫以犀珠龍麝生黃治之一月不愈其證喘悶亂飲水不止全不能食錢氏用史君子丸益黃散張曰本有熱何以又行溫藥他醫用涼藥攻之一月尚無效錢曰涼藥久則寒不能食小兒虛不能食當補脾候飲食如故即瀉肺經病必愈矣服補脾藥二日其子欲飲食盡以瀉白散瀉肺遂愈十分張曰何以不虛錢曰先實其脾然後瀉肺故不虛也

潔古法 肺之生病而成嗽大抵秋冬則實春夏則虛更詳五臟兼見之證以辨虛實若實則面赤飲水身熱痰涎盛涕唾稠粘咽乾不利喘嗽面腫吐食皆當先補脾益黃散後瀉肝瀉青丸若咯膿血是肺痿也用清肺散治之若虛則面白脫色氣少不語喉中有聲唾痰清利法當阿膠散補之若亡津液用白朮散主之 嗽而兩脇痛者屬肝經用小柴胡湯^{發熱}咳而嘔苦水者屬胆經用黃芩半夏生薑湯欬而喉中如梗者屬心經用甘桔湯咳而失氣者屬小腸用芍藥甘草湯咳而右脇痛者屬脾經用升麻湯咳而嘔長蟲者屬胃經用烏梅丸咳而喘息吐血者屬肺經用麻黃湯咳而遺尿者屬大腸用赤石脂湯咳而腰背痛甚則咳涎者屬腎經用麻黃附子細辛湯咳而遺尿者屬膀胱用茯苓甘草湯咳而腹滿不欲食面腫氣逆者屬三焦用異功散^{吐瀉}

曾氏法 咳嗽者固有數類但分冷熱虛實隨證疏解初中時未有不因感冒而傷於肺內經曰肺之令人咳何也岐伯曰皮毛者肺之合也皮毛先受和氣邪氣得從其合故難經云形寒飲冷則傷肺使氣上而不下逆而不收衝壅咽膈淫淫如痒習習如梗是令嗽也乍暖脫者暑熱通風邪氣侵於皮膚肺先受之而為咳嗽若初得時面赤唇紅氣麤發熱嗽來疾鳴此是傷風鼻塞疾作嗽用清肺飲五拗湯及小柴胡湯羌活散^{傷風}皆可解表次青木香湯^{陰腫}

有小兒汗出未乾遽爾戲水亦致傷風咳嗽外證眼泡微浮額汗痰鳴亦宜清肺飲瀉肺湯與之疎風化痰解利邪熱小柴胡湯亦可 若嗽日久津液枯耗肺經虛矣肺為諸臟華蓋臥開而坐合所以卧則氣促坐則稍寬乃因致肺下痰之過名為虛嗽聲連不斷喉中痰鳴氣息欲絕嗽罷則吐白沫或乾嘔此肺虛而氣而不順也面唇皆白而慘嗽過額上多汗噎氣長出乳食減少致脾虛而胃亦虛宜其有吐投使參厚朴湯吐及藿香丸及霍香丸食不乳次溫脾潤肺理中湯湯吐加杏仁北五味子水煎服蓋此藥補脾而益肺藉土氣以生金則自愈矣或嗽而頰紅有紫黯色於理中湯內再加乾薑為用亦良法也 有脾虛亦能作嗽當投補劑用醃脾散醃脾散後投參厚朴湯吐令脾氣實發後間以清肺飲煎服疎解肺經風寒及霍香飲助脾胃養胃亦救子益母之法也 有一證咳嗽至極時頻嘔吐乳食與痰俱出盡方少定此名風痰壅盛肝木起脾土宜以白附飲吐投之即效

薛氏法 若咳嗽流涕外邪傷肺也先用參蘇飲喘嗽面赤心大形肺也用人參平肺散及六味地黃丸腎嗽而吐青綠水肝木乘脾也用異功散加柴胡桔梗嗽而吐痰乳脾肺傷氣也用六君子加桔梗若嗽唾膿痰者熱蘊於肺而成肺癰也用桔梗湯見肺凡風邪外傷法當表散而實腠理其用下藥非邪傳於內及胃有實熱者不宜用面色白脈短澹者肺之本證也易治面色赤脈洪數者火刑金也難治

〔發表〕麻黃湯 治太陽證頭疼發熱身痛惡風無汗喘滿脈浮緊八九日不解當發汗汗已煩悶瞑目者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也

甘草 半兩

麻黃 去節一兩半

桂枝 一兩

杏仁 去皮三十五個

右每服三錢水煎

三拗湯 治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風頭疼目眩四肢拘攣咳嗽多痰胸滿氣短

麻黃 節不去

杏仁 不去皮六

甘草 生用

右等分剉散每服三錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服取

汗為度一方加荊芥桔梗嗽甚加五味子細辛各減半又方麻黃去節杏仁去皮甘草炙各三和湯治喘嗽尤

妙加減在乎活法有熱加前胡傷風加荊芥有痰加半夏

加減三拗湯

麻黃去根節三錢水
煮去沫焙乾

桂枝 二錢

杏仁七個去皮尖炒
黃另研如膏

甘草錢一 右為龜末入香膏

拌勻每服一錢水六分煎至四分去渣溫服無時以汗出為度量大小加減若有汗者不宜服之

五拗湯 治感風濕及形寒飲冷痰嗽逆連聲不已

麻黃根節
不去

杏仁皮尖
不去

荊芥梗
不去

桔梗蜜水拌炒
各五錢 甘草二錢
半

右每服二錢水一盞煎七分無時

溫服

百部丸 治小兒肺寒壅嗽微喘有痰

百部炒

麻黃去節各
三兩

杏仁四十枚去皮
尖微炒研入

右為末煮熟裹子丸如皂子大溫水下二三丸無時日三

四服此本方也仲景加松子仁五十個蜜丸更加胡桃肉含化大妙一方加甘草二錢

九寶散 治小兒嗽是肺臟感寒須表散却服嗽藥

麻黃去節

薄荷

大腹皮

紫蘇各半
兩

陳皮

杏仁去皮
尖

桑白皮錢

肉桂

枳殼錢各二
半

甘草一錢
半

右劉散每服二錢生薑烏梅煎服冷證去薄荷熱證去陳皮桂

華蓋散 治肺感寒邪致嗽上氣胸膈煩悶項背拘急聲重鼻塞頭目昏眩痰氣不利

麻黃去節

紫蘇綿紙
炒

桑白皮蜜炙

杏仁去皮
尖炒

赤茯苓去皮

陳橘皮去白各
半兩 甘草錢二 右

劉散每服二錢水半盞煎至三分去滓量大小加減食後溫服

金沸草散 治傷風化痰頭目昏痛頸項強急往來寒熱肢體煩疼胸膈滿痰涎不利欬嗽喘滿涕唾稠粘及治時

行寒疫壯熱惡風

荆芥 四兩

前胡 去蘆

麻黃 去節

旋覆花 各三兩

甘草 炙

半夏 湯洗七次

赤芍藥 各一兩

右劉散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎六分去滓溫服不拘時有寒邪則汗出嗽甚加杏仁五味子

麥煎散 治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣羈喘急面赤自汗或狂語驚叫或不語無汗及癰疹遍身赤瘰

往來潮熱時行麻痘疹子餘毒未盡渾身浮腫痰涎致嗽或變急慢驚風手足搐搦眼目上視及傷風頭疼並治

之

滑石

地骨皮

赤芍藥

石膏

白茯苓

杏仁

知母

甘草

葶藶子 炒

人參 各半兩

麻黃 去節一兩半

右為末每服一錢麥子煎調湯下如初生牙兒

感冒風冷鼻塞身熱噴嚏多喘每一字用麥子煎湯調下一方去地骨皮滑石加羌活川芎薄荷煎湯調下

小青龍湯 治傷寒表不解惡寒體熱水停心下乾嘔發熱而嗽或渴或利小便不利或噎小腹滿喘

麻黃

去節微和者去麻黃加羌花如彈子大炒令赤色若噎者去麻黃加附子五分炮若小便不利者加茯苓一兩若喘者去麻黃加杏仁去皮尖

赤芍藥

半夏 泡若渴者去半夏加

細辛

乾薑 炮

肉桂 去蘆皮

甘草 各半兩

五味子 半兩

右劉散每服三

錢水一盞煎七分去滓加減服

清肺飲 治肺受風邪客熱嗽聲不斷氣促喘悶痰壅鼻塞涕涕失音及解時行疹毒痘瘡涎多致嗽咽痛煩渴

柴胡 洗淨二兩

人參 去蘆二兩

杏仁 湯炮去皮

桔梗 剉炒

赤芍藥

荆芥

枳殼 去穢炒微黃

桑白皮 剉炒

北五味子

麻黃 去節湯炮過剉焙半夏湯煮透濾仍剉

旋覆花 五錢

甘草 半兩

劉每服二錢水一盞薑二片葱二根煎七分無時溫服或入薄荷同煎

解表散 主傷風感冷欬嗽痰喘嘔吐瀉利驚悸有熱證在表裏並宜可投

麻黃 製法同上

杏仁 湯炮去皮

赤茯苓 去皮各一兩

川芎

防風 去蘆

枳殼 製法同上 甘草 半生半炙

六斗進

兒幼科

四

右剉每二錢水一盞薑二片葱白一莖煎七分溫服無時有熱入薄荷同煎

和解湯 治小兒四時感冒寒邪壯熱煩躁鼻塞多涕驚悸自汗肢體痠痛及瘡疹已發未發皆可服

羌活

防風

人參

川芎各一兩

乾葛

升麻

甘草

芍藥各半兩

右剉散每服三錢薑棗煎服加荊芥無汗加麻黃欬嗽者加杏仁五味子桔梗

〔攻裏〕錢氏葶藶丸 治乳食衝脾傷風欬嗽面赤痰盛身熱喘促

甜葶藶

去土隔紙微炒

黑牽牛

微炒

杏仁

去皮尖炒另研如膏

漢防已

各一兩

右為末研入石膏拌勻蒸陳棗肉和再搗為劑

九如麻子大每服五九至七九淡生薑湯下乳食後或臨夜服量兒大小加減

〔潔〕人參荊芥散 治身熱痰嗽胸膈不利宜下痰去熱

人參

半兩

荊芥穗

一兩

大黃

二錢

右為細末水煎調檳榔木香細末五分輕粉一字乳後服如身熱

潮熱宜服清涼飲子去大黃三服之後一二日却入大黃服之令疎利則愈不可使動臟腑

褊銀丸 治風涎隔實上熱及乳食不消腹脹喘驚

巴豆

去油膜皮心細研半兩

水銀

五錢

黑鉛

二錢半同水銀炒結沙

麝香

另研五分

好墨

大燒醋碎研入錢

右將巴豆末并墨再研勻和入砂子麝香陳米粥和丸如菜豆大捻褊一歲兒一九二三歲二三九五歲以上五

六九煎薄荷湯冷送下不得化破更量虛實加減並食後服虛人先以益黃散實脾後以此方下之下後補肺

〔涼劑〕瀉肺湯 主傷風後五心煩熱欬嗽喘促唇紅頰赤發渴引飲

桑白皮

剉炒

地骨皮

淨洗焙乾各一兩

甘草

錢三

右吹咀每服二錢水一盞粳米百粒煎七分食後

臨臥溫服或不拘時

〔聖惠〕天門冬散 治小兒心胸煩悶體熱欬嗽



天門冬去心焙

桑根白皮剉

赤茯苓

柴胡去苗

百合

紫苑洗去苗土

藍葉

甘草炙微赤剉已上各半兩

右件搗羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓量兒大小以意分減

溫服

〔聖惠〕百部散 治小兒咳嗽煩熱令乳母服

百部

貝母煨微黃

紫苑洗去苗土

葛根剉各一兩

石膏二兩

右件搗羅為散每服三錢以水一

小鐘入竹葉二七片煎至六分去滓每於食後服令兒飲乳甚佳

黃芩散 治小兒嗽

黃芩

不拘多少用童子小便浸三日取出剉碎焙乾

右為細末每服一字或半錢白湯少許調下乳食後服

柴胡石膏湯 治時行瘟疫壯熱惡風頭疼體疼鼻塞心胸煩滿寒熱往來咳嗽涕唾稠粘

桑白皮

黃芩各三錢半

升麻二錢半

石膏

前胡

赤芍藥

乾葛

柴胡各五錢

荆芥穗三錢

右為末每服一二錢薑二片淡豉十粒水煎

〔溫劑〕張漢養肺湯 溫養脾胃

紫苑洗去土焙乾

半夏湯洗七遍

款冬花

真阿膠炙各一兩

人參去蘆

桂心各半兩

右件搗羅為細末

每服一錢水一小盞入生薑二片糯米五粒煎至五分去滓放溫時時服

葛蒲煎 治肺中風邪喘鳴肩息

石菖蒲一吋九節者

款冬花

紫苑洗去土焙乾

人參去蘆

桂心各一兩

右件搗羅為細末煉蜜同石白中

搗一二百下和如皂子大每服一粒煎糯米飲化下

木香半夏丹 治胃寒咳嗽



木香

半夏湯洗七次焙乾

肉豆蔻各一兩

藿香葉

丁香

白朮各五錢

右件搗羅為細末

取生薑自然汁和如黍米大每服十粒煎人參湯下量兒大小加減

順肺湯 治心肺不利咳嗽

紫蘇葉

半夏湯洗七通焙各一兩

五味子

款冬花

陳橘皮湯浸去白

桂心

木香各半兩

右

件搗羅為細末每服一錢水八分入生薑人參各少許煎四分去滓溫服

〔平劑〕聖惠陳橘皮散 治小兒咳嗽胸中滿悶不欲乳食

陳橘皮湯浸去白焙

桔梗去蘆

雞蘇

杏仁湯浸去皮尖

人參去蘆各一分

貝母煨微黃

右件搗羅為麤散每服一錢以水一小盞入燈心十莖煎至五分去滓溫服日三四服量兒大小以意加減

麥門冬煎 治小兒咳嗽壯熱胸膈壅滯

麥門冬去心一兩

生薑半兩去汁

酥

蜜各二兩

杏仁湯浸去皮尖

右件藥先以水一大盞煎

麥門冬及杏仁至四分入沙盆內研絞取汁却入銀器中次内生薑汁以慢火熬成膏收於瓷器中每服以清粥

飲調下半茶匙日二服夜一服量兒大小以意加減

芽先生孺豆膏

括婁穰

蜜各半盞

人參

鉛白霜略半兩

陳槐花一分

括婁子百二十枚

右將括婁穰及

蜜鍊成膏入諸藥末同為膏每服一大黃豆大用杏仁煎湯調服

注唇膏 治小兒諸般咳嗽

鬱金

三個大者剉細用生薑汁浸一宿

白殭蠶直者上條

鉛白霜半錢研

腦子一字

右件為細末煉蜜為膏用菜豆大

注孩兒唇上二三歲桐子大十歲已上皂子大薄荷生薑湯化下

蜜瓜膏 治小兒嗽

栝實皮不拘多少用蜜塗慢火上火焦赤色 右為末每服一錢蜜調成膏時時抹兒口內

生犀散 治嗽嗽解時氣痰逆喘滿心忪忡驚悸風熱

杏仁去皮共炒 桔梗各二錢 茯苓 甘草 人參 半夏各一錢 五味子

前胡各一錢半 右剉散生薑薄荷煎服有熱加羌活或加麻黃細辛

保肺湯 治肺胃受風熱痰厥嗽喘不止及治久嗽不愈

山藥 白茯苓 紫蘇葉 黃芩 防風 杏仁去皮共炒 五味子

桔梗 百部六分 藿香 百合各五錢 白礬二錢去絲燉炒 右水煎食後服

天麻防風丸 治驚風嗽嗽身體壯熱多睡驚悸手足抽掣精神昏憤痰涎不利及風邪溫熱

天麻 防風 人參 辰砂 雄黃 麝香 甘草各二錢半

全蝎炒 礬蠶各半兩炒 牛黃 一方有牛膽南星無麝香 右為末煉蜜丸桐子大每服一二丸薄荷

湯下

〔下氣〕紫蘇子散 治小兒欬逆上氣因乳哺無度內挾風冷傷寒肺氣敗小兒啼氣未定與乳飲之與氣相逆氣

不得下

紫蘇子 訶子去核 杏仁去皮共炒 蘿蔔子炒 木香 人參去蘆各三兩 青皮

甘草炒各一兩半 右為細末每服二錢水一盞生薑三片煎至五分去滓不拘時服量兒加減

肘後療小兒咳嗽方

紫苑六分 貝母二分 款冬花一分 右搗為散每服如豆大著乳頭上令兒和乳嚥之日三四乳母

六科全覽 幼科

忌食大鹹醋物聖惠用清粥飲調一字

張漢馬兜鈴丹 治小兒肺壅咳嗽大便不利

馬兜鈴

紫蘇子

人參去蘆頭各一兩

款冬花

木香

各五錢並為細末

杏仁七錢半湯浸去皮尖另研細

右件

同拌勻鍊蜜和如黍米大每服十粒煎生薑湯下量兒大小加減

〔化痰〕人參半夏丹 消痰飲止嗽

人參去蘆

半夏湯浸上通焙乾

白朮

川麴薑

天南星微炮各一兩

右件搗羅為細末取生薑汁

打麴糊和如黍米大每服十粒煎生薑湯下月內百晬嬰兒如鐵頭大沾在乳頭上令兒吮之

貝母湯 治肺中風咳嗽喘滿

貝母炒黃

半夏白礬湯洗上通焙乾各一兩

乾薑

麻黃去根

款冬花

甘草炙各半兩

右

件搗羅為細末每服一錢水一小盞入生薑三片杏仁二粒去皮尖同煎至五分去滓溫服

〔補虛〕潔古黃耆湯 治小兒咳嗽喘逆身熱鼻乾燥者是熱入肺經為客熱呬呀有聲

黃耆二兩

人參二錢半

地骨皮五錢

桑白皮三錢

甘草二錢半

右咬咀水煎放溫頻頻服之

海藏加味四君子湯 治涎嗽

人參

白朮

白茯苓

甘草

杏仁

桑白皮各等分

半夏湯洗上通焙乾各一兩

水煎服 又治咳嗽用四君子末煎紫蘇湯調下

張漢蟬殼湯 治肺氣不利病

蟬殼微炒

五味子

湯洗上

人參去蘆各次焙乾

陳橘皮湯浸去白焙乾

甘草炙各半兩

右件搗羅為細末每服半錢煎生

薑湯調下

白朮五味湯 治欬逆氣逆上喘

五味子

白朮

丁香

人參去蘆頭

款冬花各半兩

細辛去土一分

右件搗羅為細末

每服一錢水八分入生薑二片煎至四分去滓放溫令時時呷之

人參平肺散 治心火起肺咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿

人參

橘紅

甘草炙

地骨皮各五錢

茯苓

知母炒各七分

五味子炒

天門冬去心

青皮各四錢

桑白皮炒一錢

右每服一二錢水煎

〔收選〕細辛五味子湯

治肺經不足胃氣怯弱或冒風邪或停寒有飲咳嗽倚息不得安卧胸滿短氣乾嘔作熱

嗽唾結痰或吐涎沫頭目昏眩身體疼痛重語聲不出痛引胸脇不問新久並宜服之

細辛去苗土

半夏湯炮各一兩

鶯粟殼去蒂炒

五味子各三兩

烏梅去核

甘草炙各一兩半

桑白皮炒錢

右剉散每服二錢水一盞生薑五片煎至六分去滓溫服

〔分經〕黃芩半夏生薑湯 治膽腑欬嘔苦水若膽汁

黃芩

生薑各一錢

甘草炙

芍藥各六錢

大棗二個

半夏錢五分

右水煎服

甘桔湯 治心臟咳嗽而喉中如梗甚則咽腫喉痹

粉草

苦梗錢一

右水煎食後服

芍藥甘草湯 治小腸腑咳嗽而失氣

芍藥

甘草炙各一錢

右水煎服

升麻湯 治脾腸咳嗽而右脇下痛痛引肩背甚則不可以動動則欬涎傷寒方見

烏梅丸 治胃腑欬嗽而嘔嘔甚則長蟲出

烏梅二十個

細辛

附子製

桂枝

人參

黃柏各六錢

乾姜

黃連各一兩

當歸

蜀椒各四兩

右為末用酒浸烏梅一宿去核蒸之與米飯搗和丸如桐子大每

服十九白湯下

赤石脂禹餘糧方 治大腸欬而遺尿

赤石脂

禹餘糧各二兩

右每服二錢水煎

麻黃附子細辛湯

治腎臟欬則腰背相引而痛甚則欬涎又治寒邪犯齒致腦齒痛宜急用之緩則不救

麻黃

細辛各二錢

附子一錢

右每服一錢水煎

茯苓甘草湯

治膀胱欬而遺溺

茯苓二錢

桂枝二錢

生姜五大片

右每服二錢水煎

(百晬內嗽)此名乳嗽實難調理亦惡證也當審虛實而施治焉實者散之虛者補之其證氣麤痰盛口瘡眼熱發散後可利之此金圓藏等藥主之散其實也其証嘔吐嗽後驚悸困倦自汗者當用補肺散益黃散天麻散補其虛也大抵治驚嗽琥珀散主之天麻圓乃要藥也用天麻蟬退殭蠶人參川芎甘草珊瑚砂天竺黃膽製南星白附子还雄黃金箔末之煉蜜圓如雞頭大金箔為衣每服一圓薄荷湯化下治未滿百晬咳嗽不止遠勝諸藥 (曾)百日內嬰孩偶欬嗽痰壅睡中不甯亦因產後感風而得但不可過用發散之劑先以解表散觀一二服次投貝母湯及惺惺散治 (薛)若脾胃內熱者用抱龍丸驚風邪外感者用惺惺散初起痰熱既去而氣粗痰盛或流涎者脾肺氣虛也用異功散吐加桔梗口瘡眼熱大便堅實者用三黃丸熱大便不實者用白朮散渴若嘔吐不乳因倦自汗或自利腹脹者脾胃氣虛也用六君子吐加柴胡若驚悸困倦痰盛不乳者心脾血虛也四君渴加芎歸酸棗仁或因乳母食五辛厚味致兒為患者仍參喘嗽諸證

補肺散又名阿膠散 治小兒久患咳嗽氣急有痰惡心喘虛見前

天麻散 治嬰兒咳嗽有痰氣壅面紅

南星水浸春秋五日冬七日夏三日半兩

天麻三錢

辰砂一錢

麝香一字

右為末每服一字用杏仁湯調下

人參湯亦可

天麻圓 治小兒未滿百晬咳嗽不止名曰乳嗽

天麻

蟬蛻

礬蠶

人參錢各一

川芎一錢半

甘草二錢

礬砂五分

辰砂

天竺黃

牛膽南星錢各二 白附子

硃

雄黃各一錢

金箔五片 石

為末煉蜜圓如芡實大金箔為衣每服一圓薄荷湯化下

琥珀散 治急慢驚風涎潮昏冒目睛驚搐內釣腹痛或驚癇特發

辰砂一錢半

琥珀

牛黃

礬蠶炒去絲嘴

牛膽南星

全蝎

白附子

代赭石

天麻

乳香

蟬殼錢各一

右為末每服一二分白湯調下

貝母湯 主百日內嬰孩咳嗽有痰

貝母一兩

甘草半兩

右件剉焙為末每服二字或半錢用陳米煎湯空心調服痰感痰薑湯調下

惺惺散 主傷風傷寒痰嗽逆理虛和氣甯心清肌止啼去煩利咽解失音

人參去蘆半兩

桔梗剉炒

白茯苓去皮

白朮

天花粉四味各一兩

細辛去葉二錢

防風去蘆

川芎

南星生用三味各二錢半

甘草半兩

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片薄荷三葉慢火煎七分無

時溫服

外臺小品療少小十日以上至五十日卒得暴欬吐乳嘔逆晝夜不得息四物湯

六斗焦電

天

幼科



桔梗

紫苑各三

甘草炙一分

麥門冬去心

右藥切以水一升煮取六合去滓分五服以瘥

為度千金有桂心無桔梗以水二升煮取一升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過節哺乳

張漢雄黃膏 治月裏兒欬嗽并三歲已下皆可服

雄黃一錢細研

杏仁七粒去皮尖

半夏七個童子小便浸一宿切作片子焙乾為末

右一處研勻用生薑自然汁半兩蜜半兩一處

入藥末於罐子內重湯中熬用柳枝攪成膏每服一皂子大塗爛頭與兒吮或糯米飲調下

趙氏治小兒未時欬嗽方

白礬蠶直者

右為細末塗少許爛頭上令兒喫立效

嗽膿血錢氏曰有喘而咯膿血者乃肺熱食後服甘桔湯 久嗽者肺亡津液阿膠散主之即補肺散見前 效而痰實

不甚喘而面赤飲水者編銀丸下之方見 段齋即子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血前醫以桔梗湯及防己丸

治之不愈涎上攻吐喘不止請錢氏下編銀丸一大服復以補肺湯補肺散治之或問段氏之咯血肺虛何以下之

錢曰肺雖咯血有熱故也又則虛癆今涎上潮而吐當下其涎若令吐涎則不甚便蓋吐涎能虛又生驚也痰實上

攻亦能發搐故依法只宜先下痰而後補脾肺必涎止而吐愈為順治也若先補其肺為逆耳此所謂識病之輕重

先後為治也

甘桔散

桔梗

米泔浸一宿焙乾

甘草炒各二兩

右為細末每服一大錢水一大盞入阿膠半兩炮煎至五分食後溫服海甘

桔湯仲景少陰咽痛藥也孫真人治肺癰吐膿血用生甘草加減二十餘條

王氏手集解肌丸 治外搏風邪內挾痰飲寒熱往來煩渴頰赤心忪減食熱在上焦欬嗽有血方

防風

地骨皮各一

右件燒沙糖為圓每服一丸食後前茶蘇湯下

