

萬病回春

	已 4
	71-2
	共 8 冊



新刊增補萬病回春原本卷六

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

義集

婦人科

脉脉經曰寸關調如故而尺脉絕不至者月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻胸臆也○寸口脉浮而弱滑則為虛弱則無血○尺脉來而斷絕者月水不利○尺脉滑血氣實婦人經脉不利○肝脉沉主月水不利腰腹痛○少陰脉弱而微微則血少○脉來至狀如琴弦若小腹痛主月水不利孔竅生瘡○胃脉濡少陰脉微而遲微則無精遲則陰中寒濡則血不來此為居經三月一來○少陰脉滑而數者陰中生瘡○少陰脉數則氣淋陰中生瘡○少陰脉弦者白腸必挺核○少陰脉浮而動浮則為虛動則為痛婦人則漏下

婦人生死脉訣

脉經曰婦人漏下赤白且下血數升脉急數者死遲者生○婦人漏下赤白不休脉小虛浮者生大緊實數者死○婦人新生乳子脉沉小滑者生實大弦急者死○婦人症瘕積聚脉弦急者生虛弱者死○婦人生產因中風寒熱病喘鳴而肩息脉實而浮緩者生小急者死○婦人生產之後寸口脉盛疾不調者死沉細附骨不絕者生○金瘡在陰處出血不絕陰脉不能至陽者死接陽而復出者生○懷孕六七月脉實大牢強弦急者生若沉而細者死

丹溪曰產前脉細小產後脉洪數者死又曰產前當洪數既生而洪數如故豈得不死

此亦大藥言之亦有洪數而生者

調經

婦人諸病者多是氣盛而血虛也

調氣養血湯 專治婦人室女血氣不和胎前產後諸病蓋婦人以血為主殊不知血氣先不調然後血脉不順即生諸病 香附米炒 烏藥一錢 砂仁一錢 當歸 川芎 熟地黃姜汁浸炒 白芍酒炒 甘草

右到一劑生薑棗煎服或丸或散皆可○氣痛加吳茱萸○痰盛加二陳湯金服

婦人經水或前或後或多或少或踰月不來或一月兩來者俱是不調之故也○千金調經散 治婦人經水

不調或曾經小產或常下三十六病腹痛口乾或發熱小腹痛急手足煩熱大腑不調時時泄血經水不調

久不懷孕○當歸 川芎 白芍 酒炒各 人參 阿膠 炒 牡丹皮 肉桂 路 一 吳茱萸 錢 一 麥門

冬心法 半夏 姜製各一 甘草 五 右到一劑生薑煎服 川芎 五 白芍 八分 酒炒 主地黃 錢 一 阿膠 五

經水先期而來者血虛有熱也 治當補血清 當歸 半 錢 川芎 五 白芍 八分 酒炒 主地黃 錢 一 阿膠 五

艾葉 分 條 錢 一 黃柏 分 五 知母 分 五 香附 錢 一 甘草 分 三 右到一劑水煎空心溫服 熟地黃 錢 一 桃 分 二

經水過期不來作痛者血虛有寒也 治當溫經養 當歸 半 錢 川芎 五 白芍 錢 一 酒炒 熟地黃 錢 一 桃 分 二

簡去皮 紅花 分 三 香附 錢 一 肉桂 分 五 蓬朮 錢 一 蘇木 錢 一 木通 分 八 甘草 分 五 右到一劑水煎空心

溫服 經水將來作痛者血膏氣滯也 腹中陣陣作痛作止氣血 當歸 川芎 白芍 生地黃 黃連 香

附 桃仁 去皮 玄胡索 牡丹皮 莪朮 分 各 等 紅花 減 半 右到一劑水煎空心溫服發熱加柴胡黃

芩 經行着氣作心腹腰脇疼痛者乃瘀血也 治當順氣消 當歸 川芎 白芍 生地黃 桃仁 去皮 紅花

玄胡索 莪朮 青皮 分 各 等 右到一劑水煎溫服 紅花 牡丹皮 青皮 香附 玄胡索 當歸

經水過期而來紫黑成塊者氣鬱血滯也 治當調經順 紅花 牡丹皮 青皮 香附 玄胡索 當歸

川芎 白芍 生地黃 桃仁 去皮 甘草 右到一劑水煎服 生地黃 桃仁 去皮 紅花

經水過期而來色淡者痰多也 治當活血化 當歸 川芎 白芍 生地黃 陳皮 半夏 炒 白茯苓 去

甘草 各 等 右到一劑生薑三片水煎服 生地黃 陳皮 半夏 炒 白茯苓 去

皮 經水過期而來色淡者痰多也 治當活血化 當歸 川芎 白芍 生地黃 陳皮 半夏 炒 白茯苓 去

皮 經水過期而來色淡者痰多也 治當活血化 當歸 川芎 白芍 生地黃 陳皮 半夏 炒 白茯苓 去

經水過期而來作痛者血虛有熱也治當涼血清熱○當歸 川芎 白芍炒酒 生地黄 牡丹皮 桃仁去皮

紅花 木香 玄胡索 香附 甘草 右剉水煎服

經水過多久不止者成血崩也治當涼血補血經自正也○當歸 川芎 白芍炒酒 生地黄 白朮 荆芥 條芩 阿膠炒 白茯苓皮不 山梔 地榆 香附 甘草 右剉水煎空心服久不止者加茅根汗麝香同服

經水行後作痛氣血虛也治當調養血氣痛自止也○當歸 川芎 白芍炒酒 熟地黄 人參 白朮皮去 乾姜炒中 甘草 右剉一劑姜棗煎服

經水去多久不止發腫滿者是脾經血虛也治當補血健脾利水腫自消也○當歸 川芎 白芍炒酒 木香 熟地黄 茯苓 白朮 砂仁 大腹皮 陳皮 厚朴姜汁炒 蘇子 猪苓 木通 香附 玄胡索 牛膝去皮

甘草 右剉一劑水煎溫服

經水日久不行發腫者是瘀血滲入脾經也治當活血健脾行氣腫自消也○當歸 川芎 白芍 桃仁去皮 紅花 牡丹皮 乾姜 肉桂 厚朴 枳殼炒 木香 香附 牛膝去皮 玄胡索 右剉一劑水煎溫服

經水日久不行腹脇有塊作疼者是血瘀結癥瘕也治當調經止痛塊漸消也○當歸 川芎 砂仁 木香 小茴香 乳香 枳實 厚朴姜炒 桃仁 紅花 牡丹皮 肉桂 香附 玄胡索 牛膝去皮 右剉一劑水煎溫服

錯經妄行於口鼻者是火載血上氣之亂也治當滋陰降火順氣調經經自平也 當歸 川芎 白芍 生地黄 山梔 牡丹皮 阿膠 犀角 白茯苓皮去 麥門冬去心 陳皮 黃芩 右剉一劑水煎服

熱頭痛目眩等症○依本方去乾姜加羌活獨活牛膝姜棗煎服中寒

經水不調或腹痛白帶或淋漓不止或肌膚瘦弱此血氣俱虛也○大補經湯 治婦人氣血虛弱血海寒冷

曾補萬病回春

卷六 調經

二

經水不調或時心腹疼痛或下白帶如魚腦髓或似米泔色錯亂不分信期每月淋瀝不止面色痿黃四肢無力頭目眩暈肌體羸瘦○當歸酒 白芍酒 香附各六 川芎 熟地黃各二 白朮去 白茯苓

黃芪 陳皮 玄胡索各四 人參 砂仁 阿膠炒 沉香另 小茴香酒 吳茱萸炒 肉桂

粉甘草 各三分 右到一劑姜棗煎服

○經驗調經湯 治婦人經水或前或後或多或少○當歸 熟地黃 香附各一錢 白芍酒 吳茱萸炒

大腹皮 紫荊皮 肉從蓉各一 川芎 條芩各七 粉草五 右到一劑生薑三片棗一枚水煎待

經至之日腹起○每一日一劑服四劑而止經即對

○艾附暖宮丸 治婦人經水不調小腹時痛赤白帶下子宮虛寒○南香附米一斤 四兩醋浸四兩童便浸 四兩酒浸四兩湯浸各

浸一宿 北艾葉 四兩焙乾搗爛 當歸 川芎 白芍酒 熟地黃 各一錢 玄胡索子 兩 甘草

半用 右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七八十九空心米湯送下用酒亦可

○調經八物丸 養血調經如期除赤白帶久服立孕○當歸酒洗 南芎 益湯浸 白芍酒炒 熟地黃酒

二 白茯苓 去皮 白朮 焙一兩 橘皮 益湯洗 牡丹皮 兩 條芩 酒炒 玄胡索 一兩 ○右為末煉

蜜為丸如梧桐子大每服八九十九空心淡鹽湯下寒月酒下

一婦人肺熱肢體瘦倦食少無味月經不行或鼻衄或血崩半載矣或用順氣清熱等劑不應更加寒熱且時

欲作嘔余以為鬱怒虧損脾胃濕火錯經妄行而然耳遂朝用補中益氣湯夕用六味丸各數劑半載而痊

補益方見

一婦人經行遇怒其經即止甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰氣搐搦瞳子上視此肝火熾盛以小柴胡湯加熟地

黃山梔鉤藤而愈

一婦人多怒經行旬餘方止後淋瀝無期肌體倦瘦口乾內熱盜汗如洗口脯熱甚皆由肝脾虧損無以生發

元氣用補中益氣湯加茯神遠志酸棗仁麥門五味牡丹皮龍眼肉治之即痊方見補益

一婦人經行感冒風邪晝則安靜夜則譫語此熱入血室也用小柴胡湯方見傷寒加生地黃治之頗安但內熱頭

暈用補中益氣方見補益加蔓荊子而愈後因怒惱寒熱譫語胸膈脹痛小便頻數月經先期此肝火血熱妄行

用加味逍遙加生地黃而愈方見婦人虛勞

經閉

婦人壯盛經閉者此血實氣滯宜專攻也

通經丸 治經閉不通 班猫二十個 大黃錢五 桃仁四十個 右為末酒糊為丸如梧桐子大空心酒下

五七丸甚者十五丸如血枯經閉者四物湯送下

通經甘露丸 治婦人經血不通崩漏腸風赤白帶下血氣五淋產後積血男女五勞七傷及小兒骨蒸勞

熱夫婦陰血陽精不調諸疾神効○大黃四兩用頭紅花四兩入水取汁浸一日不用童便四兩用紅花四兩童便入鹽

如杏核大兩錢入巴豆去皮三十五粒同炒黃色去巴豆頭○右四分共合一處入南木香二兩百草霜五

錢共為細末以當歸醋紅花水煮米糊為丸如梧桐子大每服三十四丸空心溫酒送下

反經丸 治婦人經閉不通不論新久○乳香 沒藥 孩兒茶 巴豆去殼 葱白各五 班猫五 右為

末共搗為丸綿裹三層繫於筒上將線住繫送入陰戶內三四寸許俟一炷香時經水即下

○一粒仙丹 治婦人乾血勞並赤白帶下種子如神○巴豆一百二十個去殼用新磚一塊將豆紙

甲五錢油煎 過為末 包英一兩刮粗皮 火炮為末 苦厚應末一 大黃兩一 右合一處以棗煮去皮核丸藥如彈子

大用綿繭張開裹藥在內穿入三寸竹筒上頭後仍留繫二三寸餘挽一轉不令藥氣出外用時先以溫水

洗陰內令潔淨拭乾却以葱汁浸濕藥頭送入子宮極深處整一日一夜去出藥不用此藥用後少間耳冷

氣下行發寒發熱如傷寒之狀不怕飲食任意食用無妨半日即通或鮮血或死血一切惡物悉下忌生冷



發物自此子宮和暖而交媾則有孕矣

婦人虛弱經閉者此血脈枯渴宜補經自通也

○通經調氣湯 治婦人經閉虛弱者 當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 生地黃酒浸 香附重便炒 牡丹皮錢

柴胡六錢 黃柏酒炒六錢 知母酒重便炒八錢 黃芩酒炒六錢 牛膝去節酒洗八錢 桃仁 紅花二味量用 右剉作十劑水煎空心一服臨卧一服

煎空心一服臨卧一服

○牡丹皮湯 治室女經閉咳嗽發熱 柴胡 黃芩各七錢 牡丹皮半錢 當歸半錢 白芍 生地黃

陳皮 白朮 香附各一錢 甘草分四 右剉一劑水煎服

○養真湯 治婦人經閉不通臍下一塊已經三載顏色如故百藥無功服此數劑經行又投數劑而塊消矣

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 益母草 香附酒醋米泔童便同浸炒 熟地黃姜汁炒 山茱萸去核 白茯苓皮 白朮

子炒 小茴酒炒 陳皮各等分 右剉六劑水煎服盡經通後此作丸服

○六味地黃丸 治婦女經閉發熱或咳嗽等症方見補益依本方加桃仁紅花

婦人半虛半實經閉者宜攻補兼施也

○通經湯 治婦女經閉不行○當歸 川芎 白芍 生地黃 大黃 官桂 厚朴 枳殼 枳實 黃芩

蘇木 紅花 烏梅 右剉一劑姜棗煎服

○調經養血丸 治婦女經脈不行或不調或前或後赤白帶下久不成孕服此有孕任服○香附十二兩酒醋盪湯重 當歸酒洗 白芍酒炒各 川芎一兩 生地黃酒洗 茯苓去皮 白芷一兩 牡丹皮酒洗 乾

姜炒一兩 肉桂兩 紅花一兩 桃仁泡去皮 玄胡索六錢 沒藥一兩 半夏一兩 阿膠蛤粉炒成 小茴炒三 我朮五錢 甘草分五 右為醋末糊丸每服八十九空心白湯黃酒任下

便各浸三 日取出炒 當歸酒洗 白芍酒炒各 川芎一兩 生地黃酒洗 茯苓去皮 白芷一兩 牡丹皮酒洗 乾

肉桂兩 紅花一兩 桃仁泡去皮 玄胡索六錢 沒藥一兩 半夏一兩 阿膠蛤粉炒成 小茴炒三 我朮五錢 甘草分五 右為醋末糊丸每服八十九空心白湯黃酒任下

婦女經閉有積塊者宜養血破積也



○四物調經湯 治婦女或十五六歲經脉不行日夜生寒熱手足麻痺飲食少進頭痛惡心嘔吐腹中忽熱結一塊冲動痛者宜此候食生冷傷感而致也 當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 柴胡 枳殼去穢炒 黃

芩八分 熟地黃酒浸 陳皮 莪朮炒醋 三稜炒醋 白朮去節 白芷 小茴炒鹽水 玄胡索各五分 香附童便炒 二分 青皮炒麵 砂仁 紅花 甘草各四分 右劉一劑生姜三片葱白三根水煎溫服○若有塊不通與調經丸間服○遍身疼痛加羌活獨活○咳嗽加杏仁五味子各五分 肚痛加炒乾漆分○瘧疾加草果

常山○泄瀉去枳殼加肉蔻

○調經丸 當歸酒洗 川芎 熟地 青皮炒麵 陳皮 白朮去節 厚朴姜汁炒 小茴香炒 艾葉去穢炒 香附醋炒 三稜煨醋 莪朮煨醋 砂仁 白芷 牛膝酒洗 玄胡索各一 粉草 琥珀各五錢 枳殼去皮炒 右為末醋打糊為丸如梧桐子大每服八九十九丸米湯下酒亦可若肚痛加蒼朮去白木

婦人經通之後宜調理之劑也○加減四物湯加香附陳皮之類補益

○滋陰百補丸 治女人勞傷氣血不足陰陽不和下寒下熱心腹疼痛不思飲食疴瀉乏力 香附一斤炒

四製酒醋鹽湯重乾 益母草八兩 當歸六兩 熟地酒洗 白朮去節 人參去皮 茯苓去皮 玄胡索各二 各浸四兩俱炒焙乾 白芍炒 甘草一兩 川芎四兩 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服六十九丸空心縮砂湯下或酒醋白

滾水任下

一婦人胃氣素弱為哭母吐血咳嗽盜汗發熱經水三月不行余以為悲則傷肺思則傷脾遂朝服補中益氣

湯補益加桔梗貝母知母夕用歸脾湯健忘送六味丸而愈方見○一婦人久患瘧瘧作則經不行形虛脉

大頭痛懶食大便泄瀉小便淋瀝口乾唇裂內熱腹脹蓋由瘧正氣已虛陰火獨旺用補中益氣湯治之尋

愈惟不時頭痛乃加蔓荊子而痛止又兼用六味地黃丸而經行方見○魏憲副寵夫人患逆經吐血不止

予診六脉微瀋有力此血虛火盛也以四物去熟地用生地共一兩加酒蒸大黃一兩同煎入童便服之服

後血止經通矣○魏憲副寵夫人患經閉人皆擬有孕乃七八箇月新覺黃瘦腹中左右有塊如鼓發熱面赤不思飲食余診六脉微瀼此血枯氣鬱也以四物湯加香附牡丹皮白朮之類十數服又加桃仁紅花又數服方與四炒枳殼丸不三四服打下血塊若許始愈

血崩 脉帶下崩中脉多浮動
虛遲者生實數者重

崩漏者有新久虛實之不同也

初起屬實熱者宜解毒也○黃連 黃芩 黃柏 生地黃 蒲黃 右剉一劑水煎空心服

治婦人血崩 年四十以上悲哀太甚則心悶急肺弱舉焦而上焦不通熱氣在先以黃連解毒湯後以涼膈散合四物湯調治其効立見

稍久屬虛熱者宜養血而清火也

○溫清散 治婦人經脉不佳或加豆汁五色相雜面色痿黃時腹刺痛寒熱往來崩漏不止 當歸 白芍

熟地黃 川芎 黃連 黃芩 黃柏 梔子 各一錢半 右剉一劑水煎空心服

日久屬虛寒者宜溫

○益母湯 治婦人血崩 當歸 川芎 白芍 酒炒 熟地黃 姜汁炒 條苓 陳皮 香附 醋炒 阿膠 蛤粉炒

益母草 白朮 去節各錢半 元參 蒲黃 炒各八分 甘草 四分 右剉一劑水煎空心服

○五灰散 治血不止成血崩 蓮蓬殼 黃絹 血餘 百草霜 棕皮 右各燒灰加山梔炒黑蒲黃炒

黑墨血竭共為細末調入煎藥服之或煉蜜為丸每服五十丸清米湯送下

秘傳經驗治血崩雜方

一方用乾黑驢糞為粗末入壘內燒烟令崩婦坐其上烟薰久久自愈○一方用京墨燒烟盡為末服二錢

黃酒送下○一方用管仲燒存性為末黃酒調下○一方用蘇刺芽汁加重便和酒服○一方用乾漆二錢



五靈芝一錢研為末同黃酒下○一方用柿餅燒灰二錢白熟水下○一方用棉花子仁炒黃色甘草黃各等分為末每服二錢空心黃酒下○一方用香附炒四錢五靈芝炒二兩歸尾二兩二錢共為末每服二錢空心黃酒下或米糊為丸如梧桐子大每服五十九空心醋湯下○一方治漏不止用槐子燒存性為末空心溫熟水下三錢即止○一方治崩漏如神用童子髮焙乾小桃紅子不拘多少共為細末黃酒湯送下○一方治經崩不止用狗頭骨燒灰末羅細用好無灰黃酒一鍾用反一分二鍾用二分三鍾用三分如不止者照常加至七鍾用七分神效自見○一婦人崩漏面黃或赤時覺腰間臍下痛四肢困倦煩熱不安其經行先發寒熱兩脇如束此乃脾胃虛損元氣下陷與相火濕熱下迫所致用補中益氣湯加防風芍藥炒黑黃柏兼服歸脾湯而愈補中益氣湯方見內傷歸脾湯方見健忘○一女子漏下惡血月經不調或暴崩不止多下水漿之物或白帶脫漏不止皆因飲食不節勞倦所傷或素有血氣不足致令心火乘脾必怠惰嗜卧困倦乏力氣短氣急脾主滋榮週身者也脾胃虛而心胞乘之故漏下月水不調也况脾胃為血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱抑風氣上升以勝其濕又云火鬱則發之用補中益氣湯去陳皮人參白朮加蒼朮稿本防風羌活獨活蔓荊子

補遺方

○樗白湯 治崩漏不止

樗白皮即臭椿根皮

枯苓一錢半

熟地黃補血一錢

當歸頭一錢半

地榆一錢

血拔

川芎一錢

白芍酒炒

生地黃七分

伏龍肝一錢

艾葉六分

右剉一剉水二鍾醋一匙煎八分空心服三五劑即止

帶下

婦人赤白帶下者皆因月經不調房色過度或產後血虛胃中濕痰流下滲入膀胱而帶也腰酸頭暈眼花小腹脹痛四肢無力困倦而虛用八物湯加減吞下止帶丸肥人多痰有帶症瘦人多火亦有之帶與夢遺同

法帶下屬氣血虛者

○加減八物湯 治婦人赤白帶下

藥 杜仲炒酒

香附分各等

甘草半

烏梅個

○右剉一劑姜棗煎食前溫服

○肥人加半夏○瘦人加

黃柏○飽悶去人參加砂仁

○腹痛加小茴

○玄胡

○冬加煨乾姜少許

○香附炒

青黛半

牡蠣煨

○止帶丸

當歸酒洗

川芎

白朮去節

人參去節

山藥

杜仲姜汁酒炒去絲

香附炒

青黛半

牡蠣煨

故紙炒酒

續斷

椿根皮此藥大治白帶

○右為細末煉蜜為丸

如梧桐子大每服五十丸

空心清米湯

吞下○腹痛加玄胡索

○玄胡

○飽悶加砂仁

去人參○夏月加黃柏○冬月加煨乾姜少許

○肥人

加姜製半夏○瘦人加酒炒黃柏

帶下屬虛寒者

○五積散

治婦人赤白帶下

方見中寒

依本方加香附子小茴香吳茱萸

白芷

川芎

大附子麩包裏去灰

○右為末每服五分

○四仙散

治婦人白帶

蒼朮一兩

黑皮炒乾

白芷

川芎

大附子麩包裏去灰

○右為末每服五分

○心好酒調下

○香朮丸

治婦人白帶臍腹脹痛

香附浸醋煮乾八兩

蒼朮米甘浸四兩

陳皮

當歸酒洗

川芎

白芍炒酒

熟

地黃姜汁酒浸各二兩

○右為末酒糊為丸

如梧桐子大每服三十丸

空心溫酒送下

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

帶下屬濕熱者

滾水送下

滾水送下

滾水送下

滾水送下

滾水送下

滾水送下

滾水送下

滾水送下

滾水送下

滾水送下

滾水送下

○加減六合湯

治婦人上有痰火下有白帶腹痛

椿根皮酒炒

當歸酒洗

白芍酒炒

川芎鹽水浸

熟地黃酒洗焙

橘紅鹽水浸去

白茯苓去皮

甘草炙

半夏姜製

目母去心糯米炒

白朮鹽水浸

錢一黃柏酒洗

知母酒洗

右到一劑生薑三片水煎空心熱服若痰火盛者加枯苓七分臨臥服下

○收帶六合丸

一名益氣固腸丸治赤白帶下肚腹疼痛和

白朮米泔

蒼朮米泔

白茯苓去皮

陳皮水

洗去當歸酒洗

白芍酒洗

熟地黃酒洗

椿根皮酒洗

牡丹皮酒洗

黃柏酒洗

甘草炙

防風酒洗

甘草炙

升麻酒洗

右為末酒糊丸如梧桐子大每服百丸空心米湯下鹽湯亦可

加香附枳殼

○滋榮收帶丸

治崩後氣下陷或白帶小腹脹滿痛甚等症

當歸酒洗

白芍酒炒

蒼朮米泔

白茯苓去皮

黃柏酒炒

椿根皮一兩

白朮二兩

半夏姜製

川芎鹽湯浸

香附米泔

防風酒洗

升麻酒洗

青皮酒洗

醋炒各五錢

木香

大甘草四錢

右為細末酒打糊為丸如梧桐子大每服一百二十丸空心鹽湯米湯

白湯任下

○雙白丸

治白帶如神○石灰一兩白茯苓二兩為末水糊為丸每服三十九丸空心白水送下

專治赤白帶下○蕎麥麵不拘多少用鷄蛋清為丸每服三五十丸白湯送下即愈

婦人頭暈吐痰胸滿氣喘飲食稍緩患於白帶二十餘年諸藥不應此氣虛而痰飲也痰飲愈而帶自愈遂

朝用六君子湯夕用六味丸不見而驗補方見○婦人帶下四肢無力余曰四肢者土也此脾胃虛弱濕痰下

症以補中益氣歸脾二藥治之而愈○婦人年踰六十內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下或用化痰行氣前症

益甚飲食愈少肢體或麻恪服祛風化痰肢體常麻手足或冷或熱日漸消瘦余曰症屬脾氣虛弱而不能

生肺祛風之劑復損諸經也當滋化源遂用補中益氣加茯苓半夏炮姜二十餘劑脾氣漸復飲食漸加諸

症頓愈方見補益

虛勞 或虛經來數大

虛勞者多因氣結憂思驚恐或情慾動心或經水不調變成諸病上盛下虛手脚心熱或皮焦骨熱或于後怕寒夜間發熱或日夜不退盜汗減食情雜怔忡嘔噦煩燥胸腹在痛飽悶作瀉痞塊虛驚面白唇紅頭目眩暈腰背酸疼四肢無力困倦小水赤色重則虛火上攻兩頰額紅骨蒸勞熱陰虛火動也治之宜養血健脾以治其本降火清鬱以治其標以逍遙散茯苓補心湯之類選而用之

虛勞吐血者

○清肺飲子

治婦女虛勞發熱咳嗽吐血先服此清熱止血後服逍遙散加減調理 當歸酒 川芎 黃芩 各一 知母 炒 阿膠珠 蒲黃 炒 陳皮 各八分 白芍 炒 生地黃 麥門冬 去心 天門冬 各一 薄荷 分六 枳殼 麵炒 藕節 片 甘草 炙三

○徐溫服

徐溫服 治肝脾血虛發熱或潮熱或自汗盜汗或頭痛目眩或怔忡不寧煩赤口乾或月經不調或肚腹作痛或小腹重墜永道疼痛笑腫痛出膿內熱作渴 當歸酒 白芍 炒 白朮 炒 白茯苓 柴胡 各一 甘草 炙五

○逍遙散

○滋陰至寶湯

治婦人諸虛百損五勞七傷經脉不調肢體羸瘦此藥專調經水滋血脉補虛勞扶元氣健脾胃養心肺潤咽喉清頭目定心慌安神魄退潮濕除骨蒸止喘嗽化痰涎收盜汗往泄瀉開鬱氣瘴腹痛利胸膈解煩渴散寒熱祛體疼甚有奇効 當歸酒 白朮 去 白芍 炒 白茯苓 皮 陳皮 知母 生用 之 火 貝母 去 香附 薑便 地骨皮 去 麥門冬 去心 各 薄荷 柴胡 酒 甘草 各三

○割用煨生薑三片水煎溫服

○右到一劑煨姜一片薄荷少許水煎服加牡丹皮梔子炒名加味逍遙散

○右到一劑煨姜一片薄荷少許水煎服加牡丹皮梔子炒名加味逍遙散

○右到一劑煨姜一片薄荷少許水煎服加牡丹皮梔子炒名加味逍遙散

○右到一劑煨姜一片薄荷少許水煎服加牡丹皮梔子炒名加味逍遙散

○右到一劑煨姜一片薄荷少許水煎服加牡丹皮梔子炒名加味逍遙散

○右到一劑煨姜一片薄荷少許水煎服加牡丹皮梔子炒名加味逍遙散

○右到一劑煨姜一片薄荷少許水煎服加牡丹皮梔子炒名加味逍遙散

虛勞熱嗽無汗者

○茯苓補心湯

治婦人以血旺氣順為本心生血肝藏血冬血衰而氣盛者由心氣虛耗不能生血又不能

制乎肺金使肺氣得以乘乎肝木肝之虧損則不能藏血漸至枯涸不榮經絡故月信不調矣此藥專補心

元之虛抑其肺氣之盛調和榮衛滋養血脉其疾自愈兼治去血過多虛勞發熱及吐血咳嗽痰喘上壅胸

膈不利

當歸 川芎 白芍 熟地 陳皮 半夏 白茯苓 桔梗 枳殼 前胡

乾葛 紫蘇 各七

人參 木香 甘草 分三 右到一劑姜棗煎服

○滋陰地黃丸

治婦人經水不調或不通虛勞吐血衄血咳嗽血便血發熱咳嗽盜汗痰喘心喘一切虛損癯

怯之病

當歸 熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 牡丹皮 澤瀉 各一

兩

天門冬 生地黃 麥門冬 知母 貝母 香附 米 各二兩 右為細末煉蜜

丸如梧桐子大每服百丸空心鹽湯下痰吐涎姜湯下

○烏骨雞丸

治婦人虛弱咳嗽吐血或骨蒸勞熱或赤白帶下或經水不調形體瘦倦無力口乾舌燥 人

參 五錢

當歸 熟地 白芍 白茯苓 香附 川芎 陳皮 秦艽 玄

胡索 貝母 牡丹皮 甘草 右俱剉成飲片聽用

用黃芪為末拌飯喂烏雞喂至肌肥眼生時縊死乾燥去毛破開取出腸胃好酒洗淨入煎藥飲片在雞肚內

線縫住用酒醋等分煮雞爛如泥撈起焙乾或曬乾為細末將雞汁打麵糊為丸如梧桐子大每服五十九

空心清米湯吞服

一婦人為哭母吐血咳嗽發熱盜汗經水不行此悲傷肺思傷脾朝服補中益氣加桔梗貝母知母夕服歸脾

湯健忘送下六味丸而愈○一女子懷抱素鬱胸滿食少吐血面赤用六味丸及歸脾加山梔貝母芍藥而

愈○一婦人素勤苦冬初咳嗽發熱 血盜汗遍身作痛或寒熱往來用化疫降火之藥口噤筋攣此血本

虛而樂復損之耳子用八味丸為主佐以補中益氣麥門五味山藥年餘而愈○一婦人患勞嗽不時發熱或時寒熱或用清熱之劑其熱益甚盜汗口乾兩足如炙遍身皆熱昏瞶如醉良久熱止方甦或陣熱至旦方止此陰血虛而陽氣弱也余朝用六味丸一料夕用十全大補湯月餘諸症稍愈更兼以補中益氣兩月餘而全愈

已上俱見補益

求嗣

脉求嗣之脉專責於尺右尺偏旺火動好色左尺偏旺陰虛非福惟沉滑勻易為生息微瀋精清兼遲冷極若

見微瀋入房無力女不好生脉亦氣既生兩儀肇判萬物之中而惟人最靈通天地之幽微達聖賢之蘊奧

審神仙之法術窮造化之根源窮所不知矣自盤古及今建羲農之為帝分陰陽運會之源流有夫婦人倫

之道理故普天率土之姓貴賤窮達之人無子覆宗絕嗣者蓋不惻然而痛哉則夫男女之生本陰陽自然

之奧理固非智術勉強之為也但世情早立嗣者以為常未立嗣者以為變論實鬼神齋僧佈施以求復嗣

其愚甚矣其實萬戶之侯無後孰能以繼百畝之田無後孰能與守是誠可悲也無嗣有不動心而求者寡

矣故孟子曰不孝有三無後為大誠哉是言也求嗣者不若求之於己其理甚明人所易曉愚竊聞黃帝之

論百家之奇方秘訣雖乃不經之言是或一種之道惟取其生育立胎之理胎元配合之妙虛陰老陽之說

其道專生乎男耳訣不生乎癯瘠其子且壽而弗夭胎連生女而轉男之嗣者效之每每經驗百無一謬好

事者潛心於此不惟得嗣子凡興陽採戰固精取藥養身之術無不在其中矣豈專指論事而已哉人間大

道乃我眾仙師之秘訣誠不可輕泄而易露也珍之重之軒轅曰婦人有微老不生男女者何也多因房事

損動臟腑天癸不通子宮挾寒或男子事狂陽弱精少清寒不能射又不能濟而相勝此所以不能相長也

或有正生座常年便斷六七年數歲不生何也亦由女人尚有數疾勞損身體以致經脉不調雖亦有微弱

終難以容納陽精如主請客尚無備客來多而不管待此賓主不能相歡客何以久留此又難以生長也須

要陽事舉經脉勻子宮暖精純熱且壯射而相濟然後可成故足月生者中道不足月生者貧薄過月生者其子貴重決矣

交合日月時刻佳期論

凡女人生長十三歲為始至四十九歲為終五十歲生者四十九歲受胎來也每年十二月有生男生女之月不同按婦人歲數有三十七圖交合可揀生男之月以待婦人經水來時有兩日半淨者有三日淨者亦有女人血旺氣盛六七日淨者不可拘定但觀寶田看經水之顏色何如耳乃以潔白之物或綿或帛夾之於戶外取而目之金色者乃佳期也鮮紅者未淨不及也淺淡者太過也惟以敗血去淨新血初生如金色者為佳期此時交合無不成矣若先期而交者縱使施精則金水太盛子宮於塞且無受精之處胎亦難成後期而交者則子宮已閉施精亦無門而入胎豈有成也哉所謂敗血已淨子宮虛新血復生正等陽時乃是乾道之日以此時施精如爐煉金如漿點腐立胎箇箇成矣又云經水淨後單日下種則成男雙日下種則成女四日以後不成矣施精亦要在子時後方可也蓋子時後夜氣清明一陽發生古語云一陽動處外興工是也此時施精順則成人也此時修煉逆則成丹也此時再遇天晴月朗風日清和又是定成吉日又逢天月二德合日行房不惟成子而子且貴神氣清秀聰明必過人矣或揀生女月交合却生男揀生男月交合却生女何也蓋陰陽運會之差以致胎氣之錯如女胎當以男名喚男胎當以女名喚易名呼喚可保長生矣

結胎交合妙訣

妻子要摘金丹先要點穴動情結胎若要都成須明交合之道要興陽要動情要奈戰要採藥要頓挫要斟酌要謹慎要用功然後其胎可成未交之先要種子先將紅印紙剪下燒灰用無根水調女人面東服之然後交接使夫婦各歡微醺乃有興趣或以言語引戲手足撫摩挑挽皮面相猥女人面赤用手摟抱可見慾動

矣如男子陽事未舉却取月華秀氣以意運下與陽再戰蟠桃煨爐鑄劍走馬撫琴以招鳳至然後交合望鳳而進龜第一要藏神只可體交不可神交令鼎氣端睡正卧甚勿偏斜如泄精却用五字之訣 齋 齋 齋 以使神於利害怒惡之地進退交合以待女人樂生果見目瞑身顫兩頰赤熱鼻口涼氣兩手若緊抱美子亦開弓鼻口接吸女人真氣却用神交着力深入直撞鳳凰靈臺女人股體不收滑精流溢此則女人快美之極子宮正開之際男子亦泄精陽先至是陰定生女陰先降包陽定生男此所謂陰陽同濟相感一種一子百種百男胎皆成也切記泄精之時猛咬女人上唇令其自驚仍用男呼女吸如忍大小便之狀則精始混融而成胎矣殊不知子宮有二穴男在左穴女在右穴入爐偏於左施精亦在於左交合畢令女人穩睡勿動屈左足而左側卧者男胎多成若屈右足而右側卧而女胎多成頓飯時節不可動身始交之時令鼎器先去小便交後不可小解此胎定成無錯矣且若不用壯陽敗陰之手段譬如陰盛之婦而遇衰老之夫將何以使陰精之先至而必於生男哉

胎成禁忌秘訣

胎既成矣則陰陽之精且純渾融一氣已無雜氣脉精血蕊嫩而未老動之易尅而易化第恐風邪感入損傷胎氣切忌復後連交挾持重物過險越壑深怒大笑大驚高語是何也蓋以胎嬰之結一月如白露二月如桃花三月之後男女分可當靜以守之逸以待之故曰靜而有常故也且如連交一次則胎息反被動搖感受風邪入於子宮譬如果木開花若遇風寒霧露花定不能結果縱有結成必定生蟲風落結胎後若要連交亦不能以成子耳縱有一成亦不能以結實完真非小產則臍風非生蟲風落而何將產若連交則胎受毒穢產後滿頭生瘡之必然也慎之忌之

未及三月轉女成男妙訣

東南桃枝作斧柄親夫張口自作成孕婦床下刀向上無人見他男孕成若置把雞巢下安滿巢盡是雞之雄