

臨證指南醫案卷九

丁卯 茗溪漫士曉本

許開李太瞻圖

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田氏

姪旦玉

調經

熱鬱
氣血
帶下

張二 經先期色變膚腠刺痛無定所晨泄不爽利從來不

生育由情淫少歡悅多愁悶鬱則周行之氣血不通而

脈絡間亦致間斷蒙瘕例以通劑

川芎 小當歸 肉桂 生艾 小茴 有香酌量用

臨證指南醫案

卷九

調經

淋帶

崩漏

胎前

產後

癰疽

熱入血室



南京中医药大学图书馆版权所有

臨證指南醫案卷九

丁卯 茗溪漫士曉本

許開李太瞻附圖

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田氏書

姪旦玉

調經

熱鬱
氣血
帶下

張二 經先期色變膚腠刺痛無定所晨泄不爽利從來不

生育由情淫少歡悅多愁悶鬱則周行之氣血不通而

脈絡間亦致間斷蒙瘕例以通劑

川芎 小當歸 肉桂 生艾 小茴 有香附等藥

肺數者不
宜用桂枝
建中湯為
脈遲而設
仲景有明

後則
傷
久嗽
肺氣
虛

扶苓 生香附 南山查 益母膏丸

姚二久嗽昔寒晨汗右臥咳甚經事日遲脈如數而虛

減不欲食此情志鬱傷延成癆怯非清寒肺虛所宜

黃芪 桂枝 白芍 炙甘草

南康 枝 飴糖

肺為氣出入之道內有所傷五臟之邪上逆於肺則

咳嗽此則久嗽昔寒晨汗全是肺氣受傷而經事日

遲不但氣血不流行血枯肝閉可想而知脈數虛火

也虛則不可以清寒况穀減不欲食中氣之餒已甚

可復以苦寒損胃乎與黃芪建中損其肺者益其氣

肝犯胃

而桂枝白芍非斂陰和血之妙品乎

秦一氣衝心痛嘔涎氣墜少腹為瀉經來後期其色或

或紫病在衝脈從厥陰陽明兩治

此先學費之病不宜相燥藥

川連

小茴

川棟子

歸尾

炒半夏

茯苓

桂枝

橘紅

某鬱傷肝脾是因懷抱不暢致氣血不和逍遙散減白

朮加山查香附不欲其守中務在宣通氣血耳今經來

日遲鬱痺宣痛而氣弱不主統血况春深泄氣之候必

佐益氣之屬方為合法 歸脾湯

又有鬱傷肝脾用逍遙散歸脾湯甚合今因動怒小



婦人全以
血爲主治
急事以

腹氣衝過胃上膈咽喉腫痺四肢逆冷遂令昏迷此皆
肝木拂逆甚則爲厥夫肝臟相火內寄病來迅速皆動
極之徵爲肝用太過宜爾其用前此芩朮守種不可用
矣 安胃理中丸去黃柏細辛

錢

脈滿腕悶減食經水來遲腹痛墜

此當張用如案

柴胡

炒白芍

黃芩

鬱金

香附

茯苓

蘇梗

神麴

又

諸恙未減腹但通不墜

逍遙散去白朮甘草加鬱

金香附神麴

許八經閉寒熱便澹腹痛

加味逍遙散去山梔



南京中医药大学图书馆版权

血結
鬱熱
腹痛

奇脈
虛寒
滯

某血虛肉熱經不至加味逍遙散去朮

某經遲腹痛風疹絲血不寧久鬱成熱法當通利

涼膈去枳殼加丹皮赤芍

孫二奇脈下指經遲腹痛先用當歸建中湯續商水脈治

法歸建中湯

又久嗽遇勞寒熱歸芪建中土薑

謝三能食不運腹泄經事愆期小腹中乾涸而痛下焦麻

痺衝心嘔逆腹鳴心辣八脈奇經交病

人參 艾葉 製香附

淡薤蓉 淡骨脂 肉桂 當歸

鹿角霜

小茴香

紫石英

益母膏

王三脈右緩左瀉經水色淡後期嘔吐痰水食物畢爛三

載餘不孕此久鬱凝痰滯氣務宜宣通護陽明厥陰五

方

半夏方廣皮

茯苓

厚朴

芡朮

淡吳萸

小香附

山楂肉

薑汁法丸

又三月中用辛溫巨膠方痰癰自下胸次寬嘔逆緩今

喜暖食惡寒經遲至五十餘日來必色淡且少議用溫

養德任栽培生氣方法

八珍去朮草地加小茴肉桂

蘇艾香附紫石英河車膠丸

肝腎虛寒

朱

二

經水

一月

兩至

或幾月

不來

五年來

立不孕

育下焦

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

肢體常冷

是衝在脉

損無有藏

苦煖益腎

肝主

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

人參

河車膠

熟地

製砂

歸身

此

此

此

此

川芎

香附

茯神

肉桂

此

此

此

此

此

小茴

紫石英

煨益母膏丸

此

此

此

此

此

此

衝脈虛冷

程

三

十三年

不孕

其中

勾病

非一

病人

述經

期遲

至

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

期預先

三日

周身

筋骨

脈絡

牽掣

痠楚

不得

舒展

凡女

此

此

此

此

此

此

此

此

入月水

諸絡

之血

必彙

集血

海而

下血

海者

即衝

脈也

此

此

此

此

此

此

此

此

男子藏

精女

子繫

胞不

孕經

不調

衝脈

病也

腹為

陰陰

此

此

此

此

此

此

此

此

虛生

熱肢

苦為

陽陽

虛生

寒寒

究竟

全是

產後

不復

之虛

此

此

此

此

此

此

此



肝腎
陰虛
宗

損或見病治病之悞有終身不育淹淹之累肝血陰虛
未火肉寄古人溫養下焦必佐涼肝堅陰勿執後天
為氣滯亂投破氣剛藥劫陰

此藥重而溫其

河車膠

生地

枸杞

沙苑

生杜仲

白薇

山查

黃柏

白花盆母草

經云陽維為病苦寒熱緣上年冰雪甚少冬失其藏

春半潮濕地氣升泄以肝腎血液久虧之質春生方淺

五臟已蓄毒也

八脈隸乎肝腎一身綱維八脈之束固之司陰陽內動

陽微外寒矣督脊常痛經事愆期血海漸涸久延虛怯

情景已露屬方逍遙散固女科聖藥大意重在肝脾二

經因鬱致損木土之氣血痺阻和氣血之中任柴胡
微升以引少陽生氣上中二焦之機勃可使條暢今
入暮病劇天曉安然顯是肝腎至陰損傷入應不為約
束故熱無汗至陰深遠古人謂陰病不得有汗則陽氣
仲景甘藥之例勿取氣辛助陽可矣

此方無者

炙甘草

阿膠

經生地

生白芍

麥冬

牡蠣

無汗不得用此

陰虛

某

陰虧內熱經事愆期

雞島骨雞

小生地

阿膠

白芍

枸杞

天冬

茯苓

茺蔚子

女貞子

桂圓



痛經
客傷
氣血

張四

三寒熱間日經來腹痛

宜用清熱氣之藥古入竹黃葶未自不先治其表月

右十味用青蒿汁童便醇酒熬膏加蜜丸

小生地

丹皮

知母

花柳

生龍甲

澤蘭

某仁先腹痛而後經至氣滯為多晨泄腹鳴亦脾胃之病

與下焦痰泄則異

川芎

當歸

香附

煨廣木香

查肉

茯苓

某二寒熱無汗經先腹痛喉中燥囊以逆食物不思此變

傷氣血入脈主病姑先與澤蘭湯

丹身、澤蘭、丹參、白芍、

柏子仁、茯神、此方無著

同計室女經水不調先後非一來期必先腹痛較之平日
為重飲食大減始於初夏入秋下焦常冷腹鳴泄瀉
結究脈察色是居室易於鬱怒肝氣偏橫胃先受戕而
奇經衝任躋維諸脈皆肝胃屬隸脈不循序流行氣血
日加阻痺失治必結瘕聚疰痞之果

南山查、生香附、延胡、當歸、青皮、

三棱、蓬朮、牛膝、川棟子、澤蘭、

肉桂、炒小茴、葱白汁丸



顧

經來筋掣腹痛常有心痛乾嘔此肝氣厥逆衝任結

病務在宣通氣血以調經溫燥忌用自可得效

川棟一錢

丹皮三錢

炒查一錢

胡連五分

延胡一錢

澤蘭二錢

歸身二錢

生白芍一錢

又

柏子仁丸

吳

鬱傷絡脈痛經

此衝任脈有寒

川芎

當歸

香附

小茴

烏藥

茯苓

紅棗

賈

經水紫黑來時嘈雜脈絡收引而痛經過帶下不斷

形瘦日減脈來右大左弱上部火升下焦冷致骨中陰

1990

一時

以異於人

道開後目

庸醫

五興之門

取利

易經

新世及所

鱖魚內經用此生地別有意者

當歸 芎 柏子仁 煅山查 牛膝

紅棗雞火湯法九

脈數右肩痛痿經不調經來氣攻觸皆性躁氣分有

熱

細子琴 白芍 黑山施 釣藤 茯苓

留歸鬚
香附
茺蔚子
桑枝

酸、滯、入、寒、氣、血、呆、鈍、痛、自、心、胸、脹、及、少、腹、背、經、行、三

方以爲獨
 開生面別
 授秘傳定
 微廣博并
 宗大巧此
 風至令愈
 薛此老如
 薛作值之
 然結之近
 日時既先
 能識真移
 病症因不
 敢施用經
 方反藉此
 希奇實誣
 之物寒責
 心時明知
 誤治轉可
 令人無從
 辨聚耳是

篇

臨川指南醫案卷九
 日今四日猶未已爲凝滯所致痺脹何疑讀內經遺篇
 以辛勝酸主治但辛氣最易入表當求其宣絡者宜
 韭白汁 桃仁 延胡 小茴
 當歸鬚 川棟子
 王三苦辛泄降胸腹脹悶已舒此嗽血皆肝膽氣
 必經來可安

南山查

桃仁

黑山梔

丹皮

橘葉

降香木

老韭白汁

朱

當節令呵欠煩倦秋深進食微有惡心病起至本月

事不來夫衝任血海皆屬陽明主司見症胃弱此陰柔

以此風日甚而荷葉邊豆殼螺殼橘白枇杷杉查核淡茶五筋一切神農本草及方書所棄之物收用不遺丹此胃腸道之一變不遺其六

賦滯當停以理胃腸為務

人參

半夏

廣皮白

茯苓

生益智仁

煨薑

見寒症方可用

脈數形疲咳經閉

半年已經食減便溏浮腫無清嗽

通經之理扶持中土望其加穀

四君子湯

然者不宜

用和中為主

半夏

老蘇梗

茯苓

廣皮

枳殼

川斛

濕滯某腹痛

夏令寒熱經阻少腹痛脹血結洞瀉不爽乃內傷氣

