

东21
46(3)-9
3.

王
一

金匱歌括下

三
十



金匱方歌括卷五

閩長樂陳念祖修園定

黃痺病方

茵陳蒿湯 歌見傷寒

治穀瘴寒熱不食食即頭眩心胸不安久久發黃此湯主之

男元犀

按太陰濕土也陽明燥土也經云穀入於胃游溢精氣

其上輸下轉藉脾氣之能也穀痺者食穀入胃脾氣不輸濕與

男

蔚古愚參訂

元犀靈石韻註

孫男

心典微菴
心蘭芝亭

熱併久則薰蒸成黃。黃成則榮衛流行之機爲之阻而不利。故有寒熱不食之病。經云食入於陰。長氣於陽。食卽頭眩。心膈不安者。穀入於胃。挾濁氣以上干也。主以茵陳蒿湯者。茵陳厚冬。令寒水之氣寒能勝熱。佐以梔子味苦瀉火。色黃入胃。挾大黃以滌胃腸之鬱熱。使之屈曲下行。則穀瘴邪悉從二便而解矣。

硝石礬石散

治黃家日晡所發熱而反惡寒。此爲女勞得之。膀胱急少腹滿。身盡黃。額黑。足下熱。因作黑瘰。其腹脹如水狀。大便必黑。時瘡。此女勞之病。非水病也。腹滿者難治。此散主之。

硝石熬

礬石燒等

右二味為散大麥粥汁和服方寸七日三服病隨大小便去小
便正黃大便正黑是其候也

歌身黃額黑補及一身之黃俱黑足如烘腹脹如水便澹色黑而晡熱晡熱

日晡熱以申屬膀胱西屬腎也等分礬硝和麥汁女勞瘵病奪天工

徐忠可云硝能散虛鬱之熱為體輕脫而寒不傷脾礬能却水

而所到之處邪不復侵如紙既礬則不受水滲也以大麥粥調

服益土以勝水合而用之則散鬱熱解腎毒其於氣血陰陽汗

下補瀉等法毫不相涉所以為佳

梔子大黃湯

治酒瘴心中懊憹或熱痛者此湯主之



梔子十四枚

大黃二兩

枳實五枚

豉一升

右四味以水六升煮取二升分溫三服

歌酒痺懊懣懣熱蒸大黃二兩豉盈升山梔十四枳枚五升下

分消要順承

男元昇

按梔子豆豉徹熱於上枳實大黃除實去滿於下此所

謂上下分消順承熱氣也

徐忠可云因酒徒陰分大傷故不用燥藥以耗其津亦不用滲

藥以竭其液調熱散則濕不能留也凡治濕熱而兼燥者於此

可悟

桂枝加黃耆湯

歌見水氣病中

治黃癰病。但當利其小便。假令脈浮者。當以汗解之。宜此湯。
男元犀按黃癰症。多由濕熱內鬱而成。為病在內也。鬱在內者。
宜內解。故曰。但當利其小便。小便通則所鬱皆去矣。假令浮脈
者。病在肌表也。當外解。故曰。當以汗解之。桂枝湯解肌表。

黃芪助之以黃芪有發汗退黃之專長也。

猪膏髡煎

治諸黃癰病

猪膏

半斤

亂髮

如雞子大三枚

右二味和膏中煎之。髮消藥成。分再服。病從小便出。

千金云太醫核尉史

脫家婢黃病服此胃中燥糞下便差神驗

歌諸黃腹鼓大便堅古有猪膏八兩傳亂髮三枚雞子大髮消藥熟始停煎

男元昇

按猪膏主潤燥髮灰主通小便故神農本草經有自還神化句最妙調髮爲血餘乃水精奉心化血所生今取以煉服仍能入至陰之臟助水精以上奉心臟之神以化其血也沈目南謂寒濕入於血分久而生熱鬱蒸氣血不利證顯津枯血燥皮膚黃而暗晦卽爲陰黃當以此治之且熱鬱既久陰血無有不傷治者皆宜兼滋其陰故曰諸黃主之又按時醫惑於以人補人之說每遇虛證輒以紫河車配藥余幼時隨侍聞家君與客常談及紫河車一物曰其也服此今反肌肉羸瘦某也

服此病反增劇。吾行道數十年。見有用紫河車者。未嘗一效。余
默識之。今省中行道輩。遇病人家。有餘貲。或病證虛弱。火熾
證。即曰。非紫河車不能成功也。嗚呼。是醫也。而能活人乎。
也。而能活人乎。

茵陳五苓散

治黃疸病

茵陳

分五苓散

右二味。和先食。飲服。方寸七日三服。

疸病傳來兩解方。

表裏兩解

茵陳末入五苓散。五苓散專行水。

十分茵陳却退黃。



男元犀按五苓散功專發汗利水助脾轉輸茵陳蒿功專治濕退黃合五苓散為解鬱利濕之用也蓋黃疸病由濕熱夾鬱蒸成黃非茵陳蒿推陳致新不足以除熱退黃非五苓散轉輸利濕不足以發汗行水二者之用取其表裏兩解為治黃之良劑也

大黃硝石

治黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之宜此湯

大黃

黃蘗

硝石

各四

梔子

十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓內硝更煮取一升頓服

歌自汗

表無邪也。尿難大便。

腹滿時。表和裏實。貴隨宜。硝黃四兩藥。

同數十五枚。梔任指麾。

男元犀

按黃痺病。濕熱交鬱。不得外通。今自汗出者。外已通也。

腹滿。小便不利而赤者。濕熱仍實於裏也。實者當下。故用大黃。

除滿去實。硝石領熱氣下趨。二便又以黃蘗除濕退黃。梔子散

熱解鬱濕熱散。二便調則裏氣亦和矣。

小半夏湯

歌見痰飲

治黃痺病。小便色不變。欲自利。腹滿而喘。不可除熱。熱除必噦。

噦者。此湯主之。

元犀

按傷寒論云。痰熱在裏。身必發黃。此云小便色不變。欲自

利者可知。內無痰熱矣。蓋喘滿屬中氣虛弱。故曰不可除熱。師恐後人誤投寒劑傷中。故立小半夏湯以救誤治也。用半夏和胃以鎮逆。生薑溫理中臟。中溫則升降自如。而喘滿嘔逆自愈。又按若中虛發黃者。余每用理中湯、真武湯等。加茵陳蒿多效。

小柴胡湯 歌見傷寒

治諸黃、腹痛而嘔者。宜此湯主之。

男元犀

按嘔者胃氣不和也。腹痛者木邪犯胃也。小柴胡湯達

木鬱和胃氣。使中樞運則嘔痛止。而黃退矣。非小柴胡湯可概

治諸黃也。

小建中湯 歌見傷寒



治男子黃小便自利當與虛勞小建中湯

吳蔚按此言土虛而現出黃色也。虛極者宜補土之母。四逆散

可與間服。然單言男子。謂婦人血瘀發黃。尚有桃仁承氣湯。法也。苟屬虛黃。亦宜以此湯加當歸益母葉之類也。

附方

瓜蒂散

歌見傷寒

治諸黃

男元屏

按瓜蒂散傷寒論三見。俱主胸中之病。金匱取之附治

諸黃何也。蓋黃乃濕熱相併。鬱蒸不得外越。用瓜蒂散吐而越之。使上膈開而下竅達。濕熱之邪自有出路矣。故曰治諸黃一



北京中医药大学图书馆藏

千金麻黃醕酒湯

治黃痺

麻黃

三兩

右一味以美酒五升煮取二升半頓服盡冬月用酒春日用水
煮之

歌黃痺病由鬱熱成驅邪解表仗雄兵五升酒煮麻三兩春換
水兮去酒烹

另元昇按麻黃輕清走表乃氣分之藥主無汗表實症黃痺病
不離濕熱之邪用麻黃醕酒湯者以黃在肌表榮衛之間非麻
黃不能走肌表非美酒不能通榮衛故用酒煮以助麻黃發汗



北京中医药大学图书馆版权所有

汗出則榮衛通而內蘊之邪悉從外解耳。

驚悸吐衄下血方

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯 歌見傷寒

治火邪者此湯主之

孫男心典

稟按舉火邪冠於方首示人治血先治火也又恐治

火專主寒治之品故拈出此方不寒不滯以立榜樣意深哉傷寒論註解甚詳不必再釋

半夏麻黃丸

治心下悸者此丸主之

半夏 各等 麻黃 各等



中國醫藥大學圖書館藏

右二味末之煉蜜爲丸小豆大飲服三丸日三服

歌心下悸都緣飲氣雜夏麻等分蜜丸醫一升一降存其意神

化原來不可知

尤在涇云半夏蠲飲氣麻黃發陽氣妙在作丸與服緩以圖之

則麻黃之辛甘不能發越津氣而但能升引陽氣卽半夏之苦

辛亦不特蠲除飲氣而並和養中氣非仲景神明善變者其孰

能與於此哉

柏葉湯

治吐血不止者此湯主之

柏葉

乾薑

各三兩

艾葉

三兩



中國醫藥大學圖書館版權所有

右三味以水五升取馬通汁一升合煮取一升分溫再服○下

金加阿膠三兩亦佳

歌吐血頻頻不肯休

久吐不止片一切寒濕補瀉之藥服之殆盡矣馬通升許

熱氣伏藏於陰分過血妄行不止乾薑三兩艾三把

三味溫散宣發其熱

馬屬火取其通之同氣以導之

柏葉行陰三兩求

柏葉抑之使降合馬通導之使下則食盡

之瘀一槲蠟矣

前方歌括之小註頗詳毋庸再釋但愚每用前方病家皆驚疑

不能聽今擬加減法用生側柏五錢乾薑炮透一錢五分生艾

葉三錢水一杯半馬通一杯煎八分服如無馬通以童便代之

○馬糞用水化開以布濾汁澄清為馬通水

黄土湯

治下血先便後血此遠血也亦主吐血

甘草

乾地黄

白朮

附子炮

阿膠

黃芩

各三

竈中黄土

半

右七味水八升

煮取

三升

分溫

二服

歌遠血

先便

血續來

半

竈中

土莫徘徊

朮膠

附地

芩甘草

三兩

同行血證

該

不

僅治下血

而吐血

衄血

與

婦人血崩等症

俱該在內

王晉三云

金匱以下

血先血後

便為近血

明指脾絡

受傷日

滲

腸間瘀積

於下故大

便未行而

血先下主

之以赤小

豆利水散

瘀常歸和

脾止血若

先便後血

為遠血明

指肝經別

絡之血因

