

或大川芎丸主之。

大川芎丸

川芎

四兩

天麻

一兩

右件依法修合爲末。煉蜜爲丸。每兩作十丸。每服一丸。細嚼茶酒食後任下。

病勞風病。強上冥視。吐涕惡風。腎入肺中振慄。故俛仰成勞風。喉中不利。頭目昏眩。以芎枳丸主之。

方芎枳丸

川芎

枳殼

各等分

右件依法修合爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服二十丸。食後溫水送下。一日三服。

病因於露風。乃生寒熱。頭目昏眩。肢節疼痛。手足亦痺。上膈壅

滯以解風散主之。

方解風散

人參

川芎

獨活各一錢

甘草

五分

細辛

四分

薄荷

少許

生薑

五片

麻黃

一錢

二分

右咬咀。用水煎熟。食遠服。

病風痰壅甚。中風之人。須常服白附子丸。以保之。

方白附子丸

全蝎

三錢

白附子

南星

半夏

旋覆花

甘菊花

天麻

川芎

橘紅

僵蚕

乾生薑

右件依法修合爲末。生薑自然汁。打糊爲丸。如梧桐子大。每五十丸。荆芥湯。食遠送下。

○中風

氣者陽也。爲血之剛。與火同體。故先哲云。冲和不息之謂氣。元常擾亂之謂火。丹谿云。氣有餘則是火。以其外護皮毛。內榮臟腑。引道血行周流。一身循環不息。而爲生生之本。若遇七情內攻。六淫外襲。以致乖亂失常。清者變而爲濁。行者鬱而不流。外失榮衛之權。內失健運之職。五者厥陽之火隨起。諸病生焉。經云。一息不運。則机穢。一毫不續。則窵壤。別又云。百病生於氣。又云。熱則氣泄。寒則氣收。怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。驚則氣亂。勞則氣耗。思則氣結。是以王叔和註云。怒則氣逆上。而肝木乘脾。故氣上矣。喜則氣利。志達榮衛通利。故氣緩矣。悲則氣急。肺葉布舉。致上不通。榮衛不暢。熱鬱於中。故氣消矣。恐則精佈。而氣墜。致氣下矣。寒則湊理閉密。歛氣於中。故氣

收矣。熱則泰理踈豁。故氣泄矣。驚則心無所依。神無所歸。慮無所定。故氣亂矣。勞則喘息汗出。內外皆越。故氣耗矣。思則心有所存。神有所歸。止氣而不行。故氣結矣。其九氣爲病。方法悉以五行所勝治之。是以經云。悲可以勝怒。喜可以勝悲。恐可以勝喜。怒可以勝思。思可以勝恐。暑可以勝寒。逸可以治勞。勞可以治逸。又云。高者抑之。下者舉之。驚者平之。勞者溫之。虛者補之。實者瀉之。結者散之。滯者行之。分經而治。用藥不同。是以人參黃芪補中氣。枳實橘紅散滯氣。枳殼利肺氣。青皮寫肝氣。木香調結氣。香附踈鬱氣。紫蘇散表氣。厚朴破壅氣。檳榔墜至高之氣。藿香和胃氣。沉香降真氣。腦麝走散元氣。各治不同。詳証而用。大抵補氣不越其溫。瀉氣不越其熱。全在活法。幸毋拘泥。

○脈症備言

脉經云滑者多血少氣滯者少血多氣大者氣血俱多小者氣血俱少細而緩者血氣俱虛代者氣衰細者氣少浮而無者氣欲絕也

經云實者邪氣實虛者正氣虛是以實者宜用牽牛厚朴等以瀉之虛者宜用人參黃芪等以補之氣滯者行之氣鬱者疎之下陷者提之上逆者降之寒者溫之熱者清之

夫人之身以氣為主以陰陽之所以升降者氣也血脉之所以流行者氣也榮衛之所以運動亦此氣也五臟之所以相生相養者亦此氣也盛則盈衰則虛順則平逆則病氣血者獨非人身之根本乎人有七情病有七氣七氣者寒熱怒思喜憂愁哉或以爲喜怒憂思悲驚恐皆通也然則勻調是氣將何先焉曰氣結則生疾氣盛則痰愈結故調氣

必先豁痰。如七氣湯以半夏爲主而官桂佐之乃良法也。蓋冷則生氣在調氣必先豁痰其中亦不可無辛劑溫劑之藥是以方中用桂者乃溫中散結之意也。不然七情相干痰涎凝結如影如膜甚如梅核膠室於咽喉之內吐之不出吞之不下或中滿艱食或上氣喘急曰氣壅曰氣滯曰氣閉曰氣中以五積六聚痞瘕癥瘕心腹塊痛發則欲絕殆無往而不至也是以七情皆能致病。

如寒氣鬱於中而作痛宜七氣湯益煎散東垣升陽順氣湯之類。

如氣逆抑之以木香流氣飲降氣湯之類。

如有熱者加涼劑抑之斯乃從陰引陽也。

如氣在膈臆間而爲痞滿刺痛伏梁等症宜二陳湯加枳實黃

連桔梗。瓜蒌。木香之類。

如下焦。而爲奔豚七情等症。本方加桃仁。梔子。山楂。橘核。茴香。川練子。荔枝之類。

如在兩脇。攻築作痛者。本方加青皮。柴胡。芍藥。龍胆草之類。

如在中焦。而爲痞滿。脹急者。本方加木香。厚朴。檳榔。枳殼。或平胃散。以平其敦阜之氣。

如婦人胎前產後。一切氣症。以四物湯爲主。加之疎氣行氣之劑。而爲治氣之大法也。

如破諸滯氣。上焦須用枳殼。下焦須用枳實。但不宜多用。多則瀉真氣。

如實熱在內。相火上冲。氣滯者。宜用黃柏。黃連。黃芩。知母。順氣之劑。

如陰虛氣滯者。宜四物湯。加玄參。黃連。以補陰血。

如氣刺痛。用枳實。看何部分。以引經藥。導便以行之。

如稟受素壯。而氣刺痛。宜枳殼。烏藥。

若肥白氣虛之人。氣刺痛者。宜參朮。加木香。

如胸中氣鬱。不舒暢而刺痛者。亦宜木香。

〔病〕男婦一切冷氣。冲胸脇作痛。脾胃虛冷。嘔泄疝痛。是以用川

芩。厚朴。檳榔。陳皮。枳實。以行滯氣。苾澄茄。砂仁。草果。良薑。

麥芽。肉苳蔻。溫脾和胃。消宿積。散冷氣。以止嘔泄。羌活。蒼

朮。以疎滯之氣。甘草。茯苓。健脾。茴香。利膀胱。小腸之氣。以

除疝痛。

〔方〕溫煎散

川芎七分。厚朴八分。檳榔一錢。枳殼八分。陳皮。砂仁。

苾澄茄 各一錢

草果

麥芽

良薑 各七分

肉豆蔻

茴香

蒼朮

各一錢

甘草

炙五分

白茯苓

八分

右咬咀用鹽一撮水煎熟食遠服。

〔病〕有血虛隧道枯澁氣因壅滯是也。

〔治〕法宜補血以榮經隧為本疎導滯氣為標是以用當歸川芎

地黃芍藥以補血檳榔木香以導滯。

〔方〕六合湯

當歸 三錢 川芎 一錢 地黃 二錢 白芍 七分

木香 二錢 檳榔 八分

右咬咀用水煎熟食遠服。

〔治〕氣虛積冷停食不消心下堅痞噫宿腐氣及霍亂吐瀉水穀不消一切食積之疾並皆治之。

方如意丸

半夏

湯泡吐沫 三稜

枳殼 去白

檳榔

陳皮

乾薑

黃連

蓬朮

各三兩

巴莖

三十七粒連殼同煎藥醋

用煮

右除巴莖外。餘俱剉如莖大。用好酒煮乾。用巴莖同藥焙為末。薄糊丸如棗豆大。每服十丸。加至二十丸。用茶清薑湯任下。食後溫服。孕婦不宜服之。

治

一切氣。化一切積。奪造化有通塞之功。調陰陽有補瀉之妙。久堅沉痼。磨之自消。暴積乍聞。導之立去。

方化滯丸

南木香

堅實者不見火

丁香

去苞不見火

青皮

四花者去穢

紅橘皮

水濕去白

黃連

大者各二錢半

京三稜

慢火煨

莪朮

火煙用醋一盞八分

半夏

揀白淨半夏研末搗生薑汁和為餅晒乾一

五分前八味晒

乾和研為細末

巴豆

去殼滾湯泡透一研開去

宿慢火熬至醋乾秤六錢重研細將藥末和再研

令勻入後烏梅肉膏巴豆若乾止用四錢五分

烏梅

用肉厚者打碎去核細剉入焙乾為細末秤五錢重用米醋調畧清慢火熬成膏和入前藥

右通和勻用白麴八錢重水調得所慢火調糊為丸如粟

米大每服五七丸人盛者十丸五更空心用橘皮湯送下

諸氣痛生薑橘皮湯任下

小腸氣痛用茴香湯送下

婦人產後血氣痛用當歸湯空心送下

大人小兒常服磨滯通氣不欲通泄津嚥下

食瀉不休及霍亂嘔吐俱用冷水下

停食飽悶枳殼湯送下

但有所積物。取本汁待冷下。心動石菖蒲湯下。
因食吐不止。津液燕下即止。

赤痢冷甘草湯下。白痢冷乾薑湯下。

赤白痢冷甘草乾薑湯下。

孕婦勿服此藥。得熱則行。得冷則止。

病 一切濕熱之氣壅塞鬱悶。

治 宜勝濕清熱兼疎壅可也。經云苦以勝濕。寒以勝熱。是以用

黃芩黃連之苦寒。勝濕除熱。又云辛以散之。是以用蒼朮

香附之辛散鬱燥濕。

方 清膈丸

黃芩炒

黃連炒薑汁浸一宿

蒼朮米泔浸一宿

香附用童便煮

水浸米

乳汁分作四處各浸
五七日用各二兩

右件共爲末以鮮紅熟瓜麩去皮用根搗糊爲丸如棗荳大
白湯下三五十丸

病男子婦人諸氣不和多因憂愁思慮忿怒傷神或臨食憂戚
或事不遂意使抑鬱之氣留滯上下不散停於胸膈之間
不能流暢以致心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通吞酸噎氣
嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色痿黃口苦舌乾飲食
減少目漸羸瘦或大腸虛閉或因病之後胸中虛痞不思
飲食並皆治之

分心氣飲

木通

官桂

茯苓

去皮

半夏

薑製各三錢五分

桑白皮

大腹皮

洗

青皮

去穢

陳皮

各五錢紫蘇二兩

羌活

五錢

甘草

二錢五分

赤芍

三錢五分

石件咬咀。用生薑三片。葱一枚。燈心一團。水煎溫服。

右方。加穀櫛榔。香附。治氣百病。最能升降陰陽。調順三焦。屢

用屢驗。其功難以盡述。

如水氣面目浮腫。加猪苓。澤瀉。車前。木瓜。葶藶。麥門冬。

如氣塊。加莪朮。性急。加柴胡。

中氣者。為因七情氣鬱。或一時怒氣。忿遏不舒。以致痰厥氣作。

卒然癇倒。神昏牙緊。口噤。狀類中風。但中風身溫。中氣息

寒。既病之後。尚有餘痰未盡。氣逆未得調和。不可悞施中

風藥。餌宜先用蘇合香丸。薑湯磨灌。方見本卷前。或用四磨湯。

〔方〕四磨湯

人參 櫛榔 沉香 烏藥 各等分

右咬咀。用生薑湯磨濃汁。和溫服。

○稍甦進以星香湯

方見本卷前或後方

○木香調氣散

木香

白荳蔻

丁香

檀香

藿香

甘草

炙砂仁各等分

○右剉一劑。鹽少許。食遠服。

○然後察其虛實。虛者八味順氣散。

方見本卷前欵內。

○實則四七湯或順氣導痰湯。

方見本卷前欵內。

○四七湯

半夏

二錢三分

茯苓

二錢

紫蘇

一錢

厚朴

一錢五分

右剉一劑。生薑五片。棗子一枚。水煎。食遠服。○痰盛加竹瀝。

生薑自然汁。各一蛤殼。若無別疾。宜當隨證調理。但口開脉絕。不可治也。

治氣不升降。痰涎壅塞。氣滿氣痛等證。治宜行氣血。豁痰涎。是

以用蘇子。厚朴。陳皮。生薑。利滯氣。前胡。半夏。豁痰涎。歸尾。活血。肉桂。溫中。通血脈。甘草。大棗。補中健脾。

方蘇子降氣飲

蘇子 苦甘辛 溫七分

厚朴 苦辛溫 一錢

陳皮 苦辛鹹 二錢

生薑 辛溫 三片

前胡 苦辛涼 一錢

半夏 苦辛溫 一錢

歸尾 苦辛溫 二錢

大棗 甘寒 三枚

肉桂 苦辛溫 七分

甘草 炙甘溫 五錢

○右剉水煎溫服。

治男婦一切氣痛。經云。通則不痛。不通則痛者。皆由抑鬱而

不通暢之故也。治宜疎鬱。經云。辛以散之。是以用香

附陳皮。紫蘇。乾薑。諸辛散之。鬱行滯。

方正氣木香散

烏藥 順氣 一錢

香附 行散 一錢

紫蘇 辛寒 八分

陳皮 辛溫 去白 二錢

乾薑 辛溫 五分

○右咀。水煎稍熱服。

諸氣痞塞不通。胸膈膨脹。面目浮。四肢腫。口苦咽乾。大小便不利。此皆中氣有虧。運動失常。冷氣壅鬱所致。治宜補中氣健運動可也。故用人參。白朮。茯苓。甘草。補中健脾。木香。陳皮。青皮。厚朴。香白芷。菖蒲。檳榔。沉香等。諸辛藥行滯氣。通痞塞。以除脹滿。木瓜。大腹皮。行水清熱。斂氣寬中。以消浮腫。麥門冬。清肺金。理氣之源。半夏。豁痰涎。以開經絡。莢朮。削堅積。木通。踈腎氣。利小便。丁香。棗。藿香。快脾和胃。肉桂通血脈。

方木香流氣飲

人參

甘溫
二錢

白朮

苦溫
一錢

茯苓

甘淡平
八分

炙草

甘溫
七分

木香

苦辛溫
七分

厚朴

苦辛溫
二分

青皮

辛溫
一分

香附

辛溫
三分

白芷

辛溫
八分

菖蒲

苦辛溫
七分

紫蘇

辛溫
六分

肉桂

辛熱
六分