

金鏡內臺方議卷之三

建安許宏集

古吳程永培校

大青龍湯 二十六

治太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者此方主之

麻黃

二兩

桂枝

二兩

甘草

二兩

杏仁

四十枚

石膏

雞子大

生薑

三兩

大棗

十二枚

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫
內諸藥再取三升去渣溫服取微汗如一服
汗出停後服汗出多者溫粉撲之

湯議

議曰余昔讀大青龍湯方以症參之嘗涉疑焉既
是太陽中風見傷寒脉浮緊是也又何發熱惡寒
身疼痛不汗出若此證參之皆是傷寒而加煩躁
又何得有中風之證在焉故諸家皆無明載只言

傷寒見風脉傷風見寒脉以此正經論之終是涉
疑一日請于先師伯榮黃公曰乃此一症中全在
不汗出三字上藏機且此不字是微有汗而不能
得出因生煩躁也無汗者乃全無汗也以此不字
方是中風此乃古人智深識妙之處今此中風症
復見脉浮緊乃中風症見寒脉也若與桂枝湯則
能治風而不能去寒若與麻黃湯則能治寒而不
能去風以此用桂枝麻黃各半湯中加石膏而治

煩躁名之曰大青龍者以其能發越風寒而散邪
氣者也故用麻黃爲君而散浮緊之脉桂枝爲臣
而治不汗之風杏仁甘草生薑大棗合而爲使石
膏爲佐而解風寒之併于經而加煩躁者也

大青龍湯戒

經曰若脉微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆
筋惕肉瞤此爲逆也

議湯中有芍藥

議曰桂枝湯治中風麻黃湯治傷寒大青龍治中風傷寒二症合病者也既治二症湯中當用芍藥乃卽桂枝麻黃各半湯中加石膏而用薑棗爲引也只可治傷寒又安能治中風症也且芍藥一味其體雖小其用至大既有中風之症若無芍藥以和其營則用桂枝麻黃專治其衛汗出則成厥逆亡陽筋惕肉瞤者可立待也於乎千載之間世遠莫辨自先代宗師如朱奉議楊仁齋許叔微之儔

非曰不知乃知之而不肯明言也自後世之隔留此數行以爲心口相傳之秘由是其書不得大行于世予早承師訓書此以爲賢達者鑒

疑問

問曰何爲中風見寒

答曰中風症反見傷寒脉也如有自汗惡風乃中風証脉當浮緩今反見脉浮緊者乃傷寒脉也故曰中風見寒屬大青龍湯

問曰何爲傷寒見風

答曰傷寒症反見中風脉也如無汗惡風乃傷寒症脉當浮緊今反見脉浮緩者乃中風脉也故曰傷寒見風屬大青龍湯

問曰二症皆見若不煩躁者此可用乎

答曰旣無煩躁可除石膏勿用也

溫粉者只用白朮藁本川芎白芷各一兩米粉三兩爲細末撲其身則汗止

小青龍湯 二十七

治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而渴或咳或利或噎或小便不利少腹滿或喘此方主之

麻黃 芍藥 乾薑 甘草 桂枝

細辛 各三兩 五味 半夏 各半升

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥再取三升去渣溫服

加減法

若微利者去麻黃加薤花如鷄子大熬令赤色下
利者不可攻表汗出必脹滿故去麻黃加薤花能
去十二經水水去則利自止故加之

若渴者去半夏加栝蒌根三兩以其半夏性燥故
去之栝蒌根味苦能生津故加之

若噎者去麻黃加附子一枚水得寒氣冷必相搏
其人必噎故加炮附子以溫之

若小便不利小腹滿去麻黃加茯苓四兩以其能利水道也

若喘者加杏仁半升去皮尖以其能潤肺而散水氣其脉浮者不去麻黃但脉沉者宜去麻黃也

湯議

議曰傷寒表不解則發熱心下有水氣則乾嘔而咳此乃水氣與溫邪相搏而成此症也或渴或利或噎或小便不利小腹滿或喘者皆有水氣內攻

也故與此方主之以麻黃爲君桂枝爲臣芍藥行
榮而散表邪以乾薑細辛半夏之辛爲使而行水
氣止嘔咳以五味子之酸而斂肺之逆氣以甘草
之甘而和諸藥爲佐經曰以辛散之以甘緩之以
酸收之者此也謂之曰小青龍者以其能發越風
寒分利水氣越超乎天地之間也

葛根湯 二十八

治太陽病項背強几几無汗惡風者

又治太陽與陽明合病者必自下利此方主之

葛根

四兩

桂枝

芍藥

甘草

各二兩

麻黃

生薑

各三兩

大棗

十二枚

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去

沫內諸藥再煎取三升溫服取微汗

湯議

議曰太陽病項背強几几無汗惡風者此中風表實也屬葛根湯若太陽病項背強几几反汗出惡

風者爲中風表虛也屬桂枝加葛根湯主之已載
于前詳矣又太陽病不解併于陽明者必下利亦
必此方內外均解之葛根性平能祛風行于陽明
之經用之爲君麻黃爲臣輔之發汗解表桂枝芍
藥爲佐通行于榮衛之間甘草大棗之甘生薑之
辛以通脾胃之津爲使此方乃治其表實而兼治
其合病併病者也

疑問

問曰表實無汗者麻黃湯均主之矣今又有此葛根湯發汗何也

答曰麻黃湯治寒邪表實惡寒無汗者今此項背強几几然惡風者乃有風在表而不得散只因無汗爲兼有寒邪故與桂枝湯中加葛根麻黃主之問曰經云下利不可發汗發汗則脹滿今此下利又發汗者何也

答曰少陰病下利清穀者爲裏虛若更發汗則脾

虛而脹今此太陽症未罷或有頭痛惡風寒等症
尙在表其脉尙帶浮便傳入陽明有口渴身熱等
症者必自下利也必須此方微發汗而散表邪中
有葛根以除陽明之邪也若是諸症發熱兼有裏
而脉浮者此方用之最善

葛根半夏湯

二十九

治太陽與陽明合病不下利但嘔者此方主之
本方中加半夏半升

右如法

湯議

議曰邪氣外盛裏氣不和氣下而不上者卽爲下利而不嘔裏氣上逆而不下者但嘔而不下利故與葛根湯以散其邪加半夏以下逆氣也半夏味辛能逐水飲止逆氣故用之也

葛根黃連黃芩湯 三十

治太陽症桂枝病醫反下之利遂不止脉促者

表未解也喘而汗出者此方主之

葛根

四兩

黃連

二兩

黃芩

二兩

甘草

一兩

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥

煮取三升分溫服

湯議

議曰太陽病桂枝症宜發肌表之汗醫反下之內
虛協熱遂利不止脉促者爲表邪未解不當下而
下之所致也喘而汗出者卽裏熱氣逆所致故用