

疔瘡

遺精

痿

諸蟲


諸毒

中惡 瘰癧 瘰癧

脚病

附鶴膝 瘰癧

會約醫鏡



羅氏會約醫鏡卷十三

湖南整齋羅國綱振占氏著輯

俊賓初氏

胞弟羅國興盛世氏校定

英冠羣氏

男定泰鴻編次

論疝癰

腹病曰疝。九病曰癰。有寒氣溼熱虛冷。男子為奔豚。女人曰育腹。小兒有本腎。

五十

經以任脉為病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。

任脉起於中極之下。以上毛際。

論痼病由來

循腹裏上關元。總諸陰之會。痼者。即方書所云狀如黃水者是也。

總言病之原也。所云衝、狐、癰、

厥、癰、癰、癰。分言痼之狀也。丹溪以爲痼症皆始於濕熱。蓋五臟各有所傷。則皆生火。火鬱之久。溼氣便盛。濁液凝聚。並入血隊。流於厥陰。肝性急速。爲寒所束。宜其痛甚。是痼爲筋病。皆挾肝邪。若言止在肝經。不與內經合也。治此者。當分寒熱虛實。若如張子和一概用下。則誤矣。察其形氣病氣。若果有熱症。熱脉顯然外見者。治以寒涼。則可。如無可據。而但云痼由溼熱。則不可。至於溼則腫墜。虛者亦腫墜。在血分者不移。在氣分者多動。是故諸寒收引。則血泣而歸肝。下注於左九。諸氣憤鬱。則溼聚。

論治痢大
法

論痢宜兼
氣治

而歸肺下注於右丸且畢丸所絡之地非盡由厥陰而太陰陽
明之筋亦入絡也故患左丸者痛多腫少患右丸者痛少腫多
但治初受之邪必當以溫經散寒行氣除濕爲主切不可早用
寒涼致留邪氣以遺其害及其久也則有始終爲寒者有因寒
鬱而爲熱者有元陽受傷而虛陷日甚者當用調補之劑因病
制方不得泥執

一治痢必先治氣故病名亦曰痢氣非無謂也蓋有寒氣熱氣
淫氣逆氣氣在陽分則爲氣中之氣氣在陰分則爲血中之氣
凡氣實者破之氣虛者補之故治痢者必於諸證之中俱當用

氣藥

脉候

弦急搏皆疝

診在何部自知其臟

尺部滑為寒疝

滑脉寸上見為大熱陽與陽併也兩尺見滑者

丙丁不勝壬癸從寒水之化也

脾脉大而虛木旺剋土厥逆上升寸口脉沉而

弱疝氣少腹痛疝屬肝病脉必弦急

肝脉弦急常也

牢急者生

疝係陰寒牢主

裏寒常也

弱急者死

治疝由外

五積散

治疝氣初起或愈後復發必有外因痛不可忍最效

當歸

蒼朮

陳皮

茯苓

各一錢

厚朴

姜炒八分

乾姜

炒五分

白芍

八分

麻黃

冬天去節六分夏天留節四分

枳殼

八分

半夏

一錢

治一切疝

八分 甘草 炙六分

肉桂 六分

川芎 七分 加吳茱萸 湯泡 乾七分

小茴 鹽炒 七分

生姜 六分

葱白 五寸

同煎熱服

治平湯

新

治一切疝氣痛。衝上心。小便赤。寒熱虛實俱效。

當歸 一錢 三分

白芍 一錢

茯苓 一錢

澤瀉 七分

猪苓 八分

山梔

七分 木香 五分

蒼朮 一錢

川練子 一錢

小茴 六分

橘核 七分 炒研

肉桂 八分

陳皮 七分

荔枝核 一錢 三分 燒焦研

水煎服。寒甚加吳

茱萸五分。脇痛。加柴胡七分。

治肝腎寒

煖肝煎。治肝腎陰寒。小腹疼痛。疝氣等證。

當歸 三錢

枸杞 三錢

茯苓 二錢

小茴 半錢

肉桂 一二錢

烏藥

二錢 木香錢一姜引如寒甚加吳茱萸不應加附子

痢方分類

治衝痢 氣上衝心二便不通小腹與陰相引痛甚此肝厥也

木香散 木香 陳皮 良姜炒 乾姜炒各六分 訶子 枳實

各錢半 草豆蔻錢一 黑牽牛分六 川芎錢一 水煎服

治狐痢 卧則入腹立則出腹與狐相似

蜘蛛散 蜘蛛十四枚勿用五色者身有毛刺者薄小者須用屋西南有網身小尻大腹內有蒼黃膿者

佳去頭微炒研 肉桂分五 右為末每服一錢此仲景方也

治癰痢 陰囊腫大不一痛不可忍

荔枝散

荔枝核

性十四枚燒存用新者

大茴

炒

沉香

木香

青鹽

食鹽

各七分

川練肉

小茴香

炒各二錢

爲末酒調三服

治木腎不痛

南星

半夏

黃柏

蒼朮

枳實

白芷

神麴

滑石

吳茱萸

昆布

山查

等分

爲末酒糊丸。鹽下湯

外用馬鞭草搗塗効。

治厥疝

脾受肝邪厥逆心痛吐食。

當歸四逆湯

當歸尾

一錢四分

附子

製

肉桂

小茴

炒各六分

柴胡

七分

白芍

八分

元胡

六分

川練子

一錢

茯苓

一錢二分

澤瀉

六分

水煎服。

治瘕疝 脾經溼熱傳於腎陰腫痛或挺縱不收或漬膿血自流出

烏頭湯

川烏頭炮

梔子仁炒各三錢煎服治內熱外為寒束

治癰疔

陽明經病小腹旁壯如黃瓜血漬脬囊結成癰腫膿

少血多

用桃仁元胡甘草茯苓白朮枳殼山查橘核荔枝

核等分

水煎服

治癰癰疔 內有膿血小便不通

加味通心散

瞿麥穗

木通去皮

梔子仁

黃芩

連翹

甘草

枳殼

川練子去核

歸尾

桃仁去皮尖炒

山查

右等分為末燈心車前子煎湯調服三錢或用五苓散加

仁山查亦妙

治久疝

木香練子散 治疝氣久不愈者服此神效

石菖蒲

炒一兩

青木香

炒一兩

萆薢

錢五

荔枝核

二十枚 搥碎炒

川練子

二十枚巴豆二十枚同炒黃赤色去巴豆不用

共研末

水調服

治濕熱疝

龍胆瀉肝湯

治腎本不虛而肝經濕熱火旺筋縮莖中或痛

或痒或挺縱不收白物如精隨溺而下者此筋疝也

龍胆草

酒炒

天冬

麥冬

甘草

黃連

炒

山梔

知母

各一錢

黃芩

一錢二分

柴胡

錢半

五味

三分

水煎服

治寒疝

神應散

治寒疝諸疝心腹大痛散氣開鬱

治聖丸
墜

元胡

胡椒

小茴

等分

爲末。每服二錢。酒調下。

守效丸

治久墜而不痛者。是卽癰疽之類。單宜治溼理氣。

蒼朮

南星

白芷

川芎

山查

半夏

枳殼

或改橘核

等分爲末。姜汁糊丸。鹽湯下。有寒加吳茱萸。有熱加山梔子。

又或加青皮。荔枝核。此方治癰疽之妙藥。

治血疳

桃仁膏

治小腹鞭而有形。大便秘結而黑。小水利。是血疳也。

桃仁

去皮尖炒

大茴

炒

等分爲末。每用二錢。蒸白二寸。煨熟。蘸

藥細嚼。空心酒下。不應。用四物湯加桃仁。紅花。朴硝。大黃。草

凡少年暴病。或爲邪熱所閉。或腫痛之極者。是邪盛勢急。非行

氣利水之劑不可。故下之之法亦不可廢。

行氣下水方

導水丸

大黃

黃芩

各一兩

滑石

黑丑

頭末各二兩

甘遂

五錢

共爲末。水丸桐子大。每服七八十九。水下。

瀉水方

禹功散

瀉水之劑

黑丑

頭末二兩

茴香

炒五錢

或加木香

三錢

爲末。以生姜湯調一二錢。臨卧服。

凡治痢。當用五苓散。加茴香。金鈴子。橘核。枳櫚。木通。多效。

治囊潰丸露

凡治陰囊潰爛。辜丸脫露。名爲脫囊。用真紫蘇莖葉爲細末。乾

敷。如未破。用香油調塗。將青荷葉包上。內服苓連甘草木通

當歸之類。多得保全。患者勿慮。

備採古來治疝至簡至穩神方於後以便取用

卒得疝氣小腹及陰中切痛汗出欲死者沙參研末酒服三錢。陰疝腫墜木別子仁醋磨調芙蓉葉末敷之。疝氣偏腫并遂茴香等分爲末酒服二錢。疝氣荔枝核二十四枚陳皮五錢硫黃燒溶入水出毒三錢爲末塩水調麪爲丸錄豆大空心酒服九丸日三服。偏墜掣痛臍下撮痛吳茱萸一斤酒醋開水童便各浸四兩一夜焙乾澤瀉二兩爲末酒丸塩湯下。狐疝地膚子五錢白朮二錢半桂心五分爲末酒服三錢忌葱。疝氣偏墜大茴小茴俱炒各一兩爲末用猪尿

一具連尿入藥於內。札定入罐內。以好酒煮爛。連胞搗爲末。白湯送下。○小兒陰腫。木香五分。甘草枳殼各一錢。煎服。○一切冷氣及小腹痛。艾葉香附醋煮丸。○小腸疝氣。莖縮囊腫。浮水石爲末。每服二錢。用木通赤茯苓麥冬煎湯調下。○疝氣或連小腹痛極。荔枝核炮微焦一兩。大茴香炒六錢。研末酒調服。

凡疝受病於肝。見證於腎。以厥陰肝脉絡陰器也。多因寒濕所致。亦有挾虛者。當加參朮於溫散藥中。○又方用橘核炒去皮研末酒調服五錢愈。

論遺由心
火

論遺精

有心虛

濕熱

脫精

腎虛

兼肝脾者

五十一

遺精之病雖多所因而總由於心心爲君火腎爲相火心有所動腎必應之則腎不能藏精隨以泄初不爲意由是而再而三隨觸而泄斯時精竭陰虛爲勞爲損去死不遠可不畏哉然亦有無夢而遺者謂之滑精心腎之傷居多治宜固腎夢而後遺者謂之夢遺相火之強爲害治宜清心亦有值勞倦而遺者此筋力不勝肝脾之氣弱也有因用心思索過度而遺者此中氣不足心脾之虛陷也有因濕熱纏藏而遺者此脾腎之火不清也有無故滑而不禁者此下元之虛肺腎之不固也有素稟不

論遺兼各
經

足而精易滑者。此先天元氣之薄弱也。有久服寒涼以致元陽失守而泄者。此藥誤之所致也。有壯年精滿而溢者。此不足慮也。故治此之法。亦當兼求所因。乃善。

以下治無夢而遺者

治下元虛滑

固精丸 治下元虛損精滑將脫者。

牡蠣煨四兩

兔絲子淘淨酒蒸六兩

韭子炒二兩

龍骨煨四兩

北五味微炒二兩

白茯苓四兩

桑螵蛸酒炙三兩

白石脂煨四兩

山茱萸四兩

杜仲鹽炒三兩

右為細末。山藥研糊為丸。空心鹽湯下。

直指固精丸

治腎虛有火精滑心神不安。

治腎虛精滑

熟地四兩

棗皮三兩

黃柏酒炒

知母酒炒各八錢

牡蠣煨

龍骨煨

蓮薤炒各三兩

志肉甘草水製二兩

茯苓三兩

右研細末。山藥四兩。糊為丸。空心鹽湯送下。

治腎虛精流

士才倍苓丸。治腎虛不固者。服之神效。凡用秘瀉藥。能通而

後能秘。此方茯苓倍於五倍。能瀉能收。是以能盡其妙也。

茯苓四兩

五倍子二兩

山藥。糊為丸。空心開水送下。

治精滑不固

金鎖丹。此治嗜慾太過。精滑不固。澁以救脫之劑。

蓮薤六兩

芡實炒十兩

石蓮子四兩或二兩

金櫻膏二片

石為末。以金櫻膏和為丸。空心淡鹽湯送下。人能久服。固