

二
十
一

唐千金類方

上海千頃堂書局發行
嚴如經署



備急千金要方卷第二十二 痔漏

後學三水黃恩榮幹南編述

三男 中醫藥學專門畢業 悌君校對
學生 廣州中醫藥大學學士 陳景山 覆校
學館專門畢業

九漏第一 療癰附

腸癰第二 妙乳附

五痔第三

疥癬第四 癰易疔目附

惡疾第五

九漏第一 論一首 灸法十六首 方八十三首

論曰 靈樞寒熱篇 夫九漏 玉篇瘡也 之為病皆寒熱癰癰 猶言累實似瘡非瘡硬實有 在

于頸腋者何氣使生此皆鼠瘻寒熱之毒氣也 音底 留于脉而不 音底 去者也鼠瘻之

本皆根在於臟其末上出于頸腋之下其浮于脉中 經曰 留于脉而未著于肌肉 文經

未內著于肌肉 而外為膿血者易去去之奈何曰請從其末引其本 言臟 可使衰去而絕其

寒熱按其道以予之徐往來以去之其小如麥者 小如一刺 知三刺已決其死生奈

何曰反其目視其中有赤脉從上下貫童子見一脉一歲死見一脉半一歲半死見

二脉二歲死見二脉半二歲半死見三脉三歲死赤脉不下貫腫子可治



凡項邊腋下。先作瘰癧者。猶言累累然欲作漏也。宜禁五辛酒麪。及諸熱食。凡漏初起有似石

癰。累累然作瘰子。有核在兩頸及腋下。不痛。不熱。尚未清漏治者皆鍊石散。見卷二十一

附方用粗理黃石鹿角白斂。傳其外。內服五香連翹湯下之。中有大黃已潰。治如癰法。諸漏結核起

未破者。火針針。使著核結中。無不瘥者。

幹南按。近人治瘰癧疾核。初起堅硬。或如梅李。用縫衣大針二口。將竹筋頭劈

開。以針雙夾縫內。相離一分許。用線扎定。將桐油一盞。用燈草六七根。油內排

勻點著。將針燒紅。用手將核捏起。當頭刺入四五分。核大者再刺數孔。核內或

疾或血。隨孔流出。徐泗溪謂強實人方可用。

何謂九漏。一曰狼漏。二曰鼠漏。三曰螻蛄漏。四曰蜂漏。五曰蚰蟥漏。六曰蟻螬漏。七

曰浮沮漏。浮源作瘰癧。八曰瘰癧漏。九曰轉脉漏。源此九瘰也。

幹南按。獨形而小核者為結核。生根而累累實者為瘰癧。諸瘡久則變膿潰而成

漏。謂之瘰。凡瘰皆有膿汁。瘰癧瘰亦因其變膿而潰。名之漏。即瘰義同。世但以

凡累累實在頸。遂名為瘰癧。其實九瘰不盡起於頸。源發于頸。或兩腋下。反

瘡起于頸者。不盡是瘰癧。不過混言累累實未破者為瘰癧。即未破成漏者。一條已

潰成膿為瘰癧瘰耳。下有瘰癧。要之無論瘰癧。無論瘰癧瘰。與非瘰癧瘰。其根在

臟。其經在肝在膽。少陽經所經。其因在氣在火在痰。而其毒則在蟲。策源諸瘰

皆有蟲。從治肝治膽治氣治火治痰多無效。千金諸方不斤斤治肝膽治氣火痰而專治蟲。以蟲毒既結成癰。癰蟲不去。則癰根不除。所用之藥多透毒殺蟲。拔根破癰。取金石通靈之品。以深入經絡。烏獸昆蟲。臭腐神奇之物。以引出蟲毒。專為強實人立法。其中養血益氣祛寒散陰之藥。不過為氣血大傷虛勞久困。及膿血不止惡候立法。當斟酌而善用也。

狼漏

空青商陸散 治狼漏。始發于頸。腫無頭。有根起于缺盆之上。連延耳根腫大。

此得之憂患。氣上不得下。其根在肝。一作肺空青主之。商陸為之佐。

空青

蝟腦各二

蝟肝乾一具

芎藭半分

獨活

乳婦蓐草

黃芩

蟹甲

斑貓

乾薑

商陸

地膽

當歸

茴香

礬石各一

蜀椒三十粒

右十六味治下篩。以酒服方寸匕。日三十五日服之。

寒熱毒氣稽留于脉不去。著于肌肉。變成膿汁。始發于頸。無頭。有根起于缺盆之上。

連延耳根腫大。名狼漏。得之憂患。氣上不下。其根在肝。肝氣虛則恐。實則怒。其脉上抵頭角。下耳後循頭入缺盆。

空青商陸散。空青通血脉。益肝氣。經本為主。商陸瀉結癰。除腫毒為佐。獨活茴香蜀椒

甘薑散陰邪。黃芩清濕熱。乳婦蓐草合當歸芎藭。排膿血。礬石蝕腐肉。蝟腦蝟肝蟹

甲斑猫地膽拔癭根酒服溫行寒熱毒氣除而狼漏根在肝臟以去

鼠漏方七首

狸骨知母散

治鼠漏始發于頸無頭尾如鼯鼠使人寒熱脫肉此得之食于

鼠毒不去其根在胃

鼠源作在肺

狸骨主之知母為之佐

狸骨

鯪鯉甲

知母

山龜殼

甘草

桂心

雄黃

乾薑各等分

右八味治下篩以飲服方寸匕日三仍以蜜和納瘡中無不瘥先灸作瘡後以藥傳之已作瘡不用灸

寒熱毒氣稽留于脉不去著于肌肉變成濃汁始發于頸無頭尾如鼯鼠鼠之極小者使人寒熱脫肉

謂瘦削

名鼠漏得之食鼠毒不去鼠源飲食不擇蟲蛆變化所生其根在胃狸骨知母散

狸骨治鼠癭惡瘡為主知母清肺胃積熱為佐桂心甘薑散陰邪雄黃甘草解濕毒

鯪鯉甲山龜殼拔癭根飲服並蜜和納瘡中寒熱毒氣除而鼠漏根在胃腑亦除

方治鼠漏

得蛇虺所吞鼠燒末服方寸匕日再不過三服此大驗自難遇耳並傳瘡中

貓所吞鼠可變通代之

方

死鼠

形者一枚中

亂髮

如雞子大一枚

右二味。以臘月猪脂。取令淹鼠髮。煎之令鼠髮消盡膏成。分作二分。一分稍稍塗瘡。一分稍稍以酒服之。則瘡矣。鼠子當從瘡中出。良秘方。

狸捕鼠而蛇吞鼠。均取制伏之義。然哀之以其屬。以死鼠治毒鼠。亦一法。髮乃血餘。借其力深入血脉。以搜惡毒。或塗或服。鼠子自無所匿而自容。從瘡中出。亦奇術也。

熨方

治鼠癰。腫核痛。未成膿。

以柏葉傳著腫上。熬鹽著葉上。熨之令熱氣下即消。

傳方

治鼠漏瘡。瘡復發及不愈。出膿血不止。

以不中水猪脂。吹咀生地黄納脂中。令脂與地黄足相淹。和煎六七沸。桑灰汁洗瘡。去惡汁。以地黃膏傳瘡上。日一易。

柏屬陰。與金相守。性後凋。耐久堅凝。取其葉。以制蟲毒。

蘇頌。柏葉殺五臟蟲。

而核腫痛可除。若

瘡後復發。膿血不止。瘡毒未清。生地消瘡毒。和猪脂透肌理。桑灰汁。桑灰汁。淋取汁。蒸。蝕膿腐。先洗後傳。瘡毒祛而膿血亦愈。

方 治風漏。及鼠漏。

赤小豆

白欬

黃耆

牡蠣

各等分

右四味治下節。酒服方寸匕。日三。

風邪在經。脉。經脉結聚成風漏。亦有因瘡遇冷。膿汁不盡乃成者。其狀如腫。有似覆手。搔之皮脫。赤汁出。乍腫乍減。漸漸生根結實。且附骨間。即潰成漏。源與鼠漏之久。潰毒深。同屬危候。赤小豆治癰腫膿血第一聖藥。白飲。本經治癰腫散結氣消風腫。牡蠣。本經除癰瘰除癰結。黃耆託內。毒酒服溫行。而風漏及鼠漏亦愈。

螻蛄漏 方二首

荏子桔梗丸 治螻蛄漏始發于頸項狀如腫此得之食瓜果實毒不去其根

在大腸荏子主之桔梗為之佐

荏子

龍骨各半兩

附子一兩

蜀椒百粒

桂心

乾薑

桔梗

礬石

獨活

芎藭各一分

右十味末之以棗二十枚合搗醋漿和丸如大豆溫漿下五丸至十丸

寒熱毒氣稽留于脉不去著于肌肉變成膿汁始發于頸項狀如腫。巢源狀如蛇形癰疹而出名

螻蛄漏得之食瓜果實毒不去。巢源食蒜于不避有毒即使噉之外絕其根在大腸

大腸支脉從缺盆上頸貫類。荏子桔梗丸。荏子。即蘇利氣寬腸為主桔梗通肺開結為佐。桂心獨

活蜀椒芎藭乾薑附子破濁陰礬石龍骨消濕腫棗和附子醋醬又制食毒溫漿調

下寒熱毒氣去而螻蛄漏根在大腸以除



納方 治螻蛄漏

槲葉灰。先以泔清煮槲葉。取汁洗拭乾。納灰瘡中。

槲皮化毒除蟲。前治附骨疽。飲服有效。茲用葉煮汁洗拭乾。納灰亦一法。

蜂漏方五首

雄黃黃芩散

治蜂漏。始發于頸瘰癧。猶言三四處俱相連以潰。此得之飲流

水。水有蜂毒不去。其根在脾。雄黃主之。黃芩為之佐。

雄黃

黃芩

各一兩

蜂房 一具

蠶甲

茴香

吳茱萸

乾薑

各半兩

蜀椒 二百枚

右八味治下篩。傳瘡口上。日一。十日止。

寒熱毒氣稽留于脉不去。著于肌肉。變成膿汁。始發于頸瘰癧。三四處俱相連以潰。

巢源。應三處。或累四處。或五處。皆名蜂漏。得之飲流水。水有蜂毒不去。勞倦。飲食不潔。或發胸膈。俱腫以潰。瘡而復發。

多飲流水。即得蜂毒。其根在脾。雄黃黃芩散。雄黃除穢濁水為主。黃芩治疽蝕火瘍。本經

為佐。茴香蜀椒乾薑吳茱萸降濁陰。蠶甲蜂房消癰重以蜂。治蜂。哀以其屬。惟其俱

腫以潰。故篩傳瘡口。寒熱毒氣去。而蜂漏根在脾臟以除。

著方 治蜂漏。初生時。狀如桃。而癢。搔之。則引大如雞子。如覆手者。

熬鹽熨之。三宿四日不瘥。至百日成癰。其狀大如四五寸石。廣三寸。中生蜂



作孔乃有數百。以石硫黃隨多少。燃燭燒令汁出。著瘡孔中。須臾間見蜂數十。惟蜂盡瘡。

傳方 治同上。

鴟頭灰傳之。

傳方 治同上。

人屎蛇蛻灰。臘月猪膏和傳之。

傳方 治同上。

蜂巢灰。臘月猪膏和傳孔中。

無形蜂毒。稽留于頸。俱腫以潰。雄黃黃芩散。治法固然。若初生如桃瘡。搔引大乃至五寸。廣三寸。中生蜂作孔。蜂毒有形。以雄黃易硫黃。先鹽熨解毒止癢。後燃燭燒令汁出。著瘡孔。以絕蜂根。最為得法。鴟頭蛇蛻灰。治風蟲。人屎猪膏。消癰腫。蜂巢灰。傳。猶是以蜂治蜂之法。症奇而方乃不得不奇耳。

蚰蟥漏

礬石防風散

治蚰蟥漏。始發于頸。初得如傷寒。此得之因食。中有蚰蟥毒。不去。其根在腎。礬石主之。防風為之佐。

礬石

防風

桃白皮

知母

雌黃



乾地黃

獨活

青黛

斑猫

白芷

松脂

柏一脂作

芍藥

海藻

當歸

各一分

白朮

蝟皮

各分四

蜀椒

百粒

右十七味治下篩。飲服一錢。凡三日三服。

寒熱毒氣稽留于脉不去著于肌肉變成膿汁始發于雲毛後發于皮膚

孔身寒似陽痿。脫虛腫脹。發不治。到百。日。生。此。浮。瘰。之。食。中。不。蛇。去。一。一。方。風。名。惡。風。內。癰。為。

鑿石防風散。鑿石治寒熱鼠癰為主。經。治寒熱鼠漏蝕死肌。附。桃皮殺諸蟲。

獨活白芷蜀椒散陰灸母青黛瘡惡腫汨汨下

濕熱地黃芍藥當歸排膿血白朮風水結腫
泄膿此豈才服

拔癭根。飲服和濟寒熱毒氣去而蚘蚘漏根存腎脾以附

瘡。口。多。在。皮。中。使。人。重。

礬石白朮散 治蟻螬漏始發于頸下無頭厚如棗核破即利石口作

熱心滿。此得之因。喜怒哀泣其根在心。磐石主之。白木爲之。作

礬石
白朮
空青
當歸
絲平
羌活
獨活
三

蝟皮
斑貓
枸杞
地膽
分
韋魚肝豆許
。川俞卜。在下高虎什。帝

右十味治下飾服方寸匕日三以酢漿服之病在上偏軀

藥流下。

寒熱毒氣稽留于脉不去。著于肌肉。變成膿汁。始發于頸下。無頭尾。如棗核塊累。移在皮中。使人寒熱心滿。名蟻螬漏。蟻螬。初生時無頭尾。腫如棗核。或移動皮肉。狀如大如六寸。更疼。得之喜怒哭泣。不止。氣毒變化所生。其根在心。磐石白木散。磐石。治寒熱惡瘡。經本為主。白朮除心腹急滿為佐。別錄。治心下急滿。細辛散濁陰。當歸枸杞滋血液空青。蝕膿腐。猬皮斑猫地膽。死肌。如治寒熱瘡。烏腦。逐風。拔癰根。醋漿調。瘳。寒熱毒氣去。而蟻螬漏根在心臟以除。

浮沮漏

地膽甘草散。治浮沮漏。始發于頸。如兩指。使人寒熱欲卧。此得之因。思慮憂

懣。其根在膽。地膽主之。甘草為之佐。

地膽

雄黃

乾薑

石決明

續斷

菴蘭根

龍膽各三分

細辛二分

大黃半分

甘草一分

右十味。治下篩。傳瘡。日四五度。古今錄驗。雄黃有硫黃。雄黃有硫黃。

寒熱毒氣稽留于脉不去。著于肌肉。變成膿汁。始發于頸。如兩指。使人寒熱欲卧。源

始發時在頸。亦在腋。下。如兩名浮沮漏。瘳。源。作。得之思慮憂滿。往反變化所生。思其指無頭尾。使人寒熱欲唾。吐。

根在膽。地膽甘草散。地膽。治寒熱惡瘡。經本為主。甘草除寒熱邪氣。為佐。細辛乾薑

溫膽寒龍膽本經治胃開石決明清肝蒼朮根本經治五續斷大開破癰結大黃

瀉肝本經治寒熱殺毒雄黃本經治寒熱鼠蝕死肌為散傳瘡寒熱毒氣除而浮沮漏根在膽膽以

去

瘰癧漏

雌黃芍藥丸 治瘰癧漏始發于頸有根初苦痛令人寒熱此得之因新沐濕

結髮汗流于頸所致其根在腎雌黃主之芍藥為之佐

雌黃 茯苓 芍藥 續斷 乾地黄 空青 礬石 乾薑 桔梗

蜀椒 恒山 虎腎 狸肉 烏腦 斑猫各一礬石一分附子兩

右十七味末之蜜丸以酒服十丸如大豆日二

寒熱毒氣稽留于脉不去著于肌肉變成濃汁始發于頸有根初苦痛令人寒熱名

瘰癧漏得之新沐濕結髮汗流于頸巢源因強力入水坐濕地或新其根在腎雌黃

芍藥丸雌黃治惡瘡毒本經為主芍藥治寒熱苦痛本經治寒為佐桔梗茯苓恒山

本經恒山治開痰結蜀椒乾薑附子破濁陰地黃續斷消痰腫空青礬石蝕膿腐狸

肉虎腎別錄虎骨治邪氣惡斑猫烏腦拔癭根蜜丸酒服溫行寒熱毒氣去而瘰癧

漏根在腎臟以除

幹南按巢源瘰癧癭候風邪毒氣客于肌肉隨虛處而停結為瘰癧或如梅李

等。大小兩三相連。而時寒熱。久則變膿潰成癰。數語所言瘰癧病情。最為明白。強力入水。或新沐浴。汗入頭中。流在頸中。乃風邪毒氣。從入原因。後附瘰癧一門。尤當參用治法。

傳方 治瘰癧。瘰癧橫闊作頭狀。若杏仁形。亦作瘰癧方。

用雄雞屎。獾月猪脂和封之。

轉脉漏

斑猫白芷丸 治轉脉漏。始發于頸。濯濯脉轉若驚惕。身振寒熱。此得之因驚。

卧失枕。其根在小腸。集驗作心斑猫主之。白芷為之佐。

斑猫 白芷 綠青 大黃 各二 人參 當歸

桂心 各三 麥門冬 白木 各一 升麻 鍾乳 甘草

防風 地膽 續斷 麝香 礬石 各一

右十七味末之。蜜丸。酒服十丸。如大豆。日三服。勿食菜。慎房室百日。外臺無大黃桂

心麥門冬白木鍾乳

寒熱毒氣稽留于脉不去。著于肌肉。變成膿汁。始發于頸。濯濯脉轉若驚惕。身振寒。

名轉脉漏。得之驚卧失枕。巢源因飲酒大醉。夜卧不安。驚欲嘔。轉側失枕。所生。又失枕。故失。其根在小腸。斑猫白芷丸。斑猫。蝕癰疽死肌。經為主。白芷。排膿血生肌為佐。桂。

枕。故失。其根在小腸。斑猫白芷丸。斑猫。蝕癰疽死肌。經為主。白芷。排膿血生肌為佐。桂。



心防風升麻散風熱大黃瀉痰毒麥冬當歸續斷義見上方通血結綠青本經破積鍾乳蝕膿腐地膽麝香拔癭根人參白朮甘草培元氣蜜丸酒服溫行寒熱毒氣去而轉脉漏根在小腸以除

九漏方二十五首

方治九漏

空青

商陸

知母

狸骨

桔梗

防風

荏子

礬石

黃芩

白芷

芍藥

甘草

雌黃

白朮

礬石

地膽

斑蝥

雄黃各等分

右十八味末之蜜丸以酢服如大豆三九三十日知四十日愈六十日平復

一百日慎房室一方為散醋服一刀圭日三老少半之

寒熱毒氣稽留于脉不去著于肌肉變成膿汁其根深入變成九癭防風桔梗白芷散風熱荏子商陸利濕濁知母黃芩芍藥消癰毒雄黃雌黃去死肌空青礬石礬石蝕膿腐癰斑猫地膽拔癭根白朮甘草益脾土蜜丸醋服溫散寒熱毒氣去而九漏根已深入亦除

方治同上

蝟皮半枚蜀椒

附子

當歸

蜂房

地榆

桂心



通草

乾漆

薏苡仁

牡丹

疾藜子

漏蘆

一作蘆

龍膽

龍骨

土辰

各二分

斑蝥

四分

苦參

蛇床子

大黃

雄黃

蘭如

細辛

蛇蛻皮

各二分

鶴骨

六分

鯪鯢甲

樗雞

各四分

蜥蜴

蜈蚣

各一分

右二十八味治下篩。酒服五分。以知為度。日二服。

寒熱毒氣稽留于脉不去。著于肌肉。變成膿汁。其根深入。變成九瘻。如上法加味。桂心。散風熱。苡仁。通草。利濕濁。牡丹。苦參。漏蘆。龍膽。清癰毒。雄黃。去死肌。加用。蝟皮。鯪鯢。鯢甲。鶴骨。蛇蛻。蜥蜴。蜈蚣。斑蝥。雞蜂房。拔癭根。變用大黃。瀉瘀腫。乾漆。蘭如。地榆。疾藜。去惡土。辰。別錄。治內。通血。結。細辛。蜀椒。蛇床。附子。破濁陰。酒服溫行。寒熱毒氣除。而九漏根已深入而愈。

方 治同上。

斑蝥

七十枚

蝟皮

真朱

雄黃

各一分

右四味治下篩。酒服半錢。七日三。

方 治同上。

斑蝥

二十七枚

雄黃

桂心

犀角

各一兩

右四味治下篩。酒服一錢。病從小便出。日再。

九方 治一切漏。

斑猫四十枝

豉四十枝

元青二十枝

地膽十枝

蜈蚣一寸半

犀角太棗核

牛黃太棗核

生大豆黃十枝

右八味末之。蜜丸飲服如梧子二丸。須臾多作酸漿粥冷飲之。病從小便出。

尿盆中看之。如有蟲形。又似膠汁。此病出也。隔一日一服。飲粥如常。小弱者

隔三四日。候無蟲出。瘡漸瘳。特忌油膩。一切器物。皆須灰洗。乃作食。崔氏云

初服藥。少夜食。明旦服二丸。至七日甚虛。可煮食蔓菁菜羹。自餘脂膩醋

口味果之類。並不得食。人強隔日一服。人弱兩三日一服。瘳後仍作二丸將

息。不能將息。便不須服。

已上三方。如上法。互有增減。首方加真朱佐雄黃。次方加犀角佐雄黃。三方去雄黃

用犀角。加牛黃大豆黃豉。清心滌痰。泄濕化濁。或散或丸。或酒服。或酸漿粥冷飲。病

均從小便出。足補前諸方所未及。

方 治諸漏。

服白馬屎汁一升。

方 治同上。

正月雄狐屎。陰乾杵末。水和服。

方 治同上。

猪脂一升。酒五合煎沸。頓服之。

方 治一切漏。

槲牡陰白皮三十斤剉之。以水一石煮取一斗。去渣煎如糖。又取都廩上雌雄黃鼠屎各十四枚燒令汁盡。末納煎中。溫酒一升投煎中。合攪之。羸人五合服之。當有蟲出。

白馬雄狐屎消腫辟惡。猪脂酒煮利脉殺蟲。槲皮合雌雄鼠屎入通血絡。深拔癰根。溫酒合服。當有蟲出。亦奇藥也。

方 治諸漏。

水研杏仁服之。

方 治同上。

故布裏鹽如彈丸燒令赤末酒服。

方 治漏發心胸以下者。

武都雄黃

松脂各三兩

右二味和為塊。刀子刮為散。飲服一方寸匕。日二。不瘥更合。

諸漏在頸腋或發心胸以下皆蟲毒所為。杏仁殺蟲消腫。治諸瘡疥消腫。鹽酒殺蟲。

解毒。藏器鹽殺蟲。雄黃松脂殺蟲燥濕。三方內服亦治蟲所必須。

納方 治漏。

