

S-293

6413

醫 述



醫述卷四

傷寒析疑目

倒序

錯簡

傳誤


脫佚

衍文

字訛

註辨

方考



會通

問難

闕疑



醫述卷四

傷寒析疑

新安杏軒程文囿觀泉輯



榜殿標
樸詠堂校

倒序

太陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此
當發其汗服湯已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所
以然者陽氣重故也麻黃湯主之

麻黃湯主之句讀當在發其汗之下

吳靈
禕

麻黃湯主之五字不當在陽氣重之下豈有衄乃解之後



而用麻黃湯之理乎

張兼善

解後復煩煩見於內此餘邪未盡故用桂枝更汗微除復煩是煩見於外此大邪已解故不可更汗仲景每有倒句法前輩隨文衍義謂當再用麻黃以散餘邪不知得衄乃解句何處著落○粗工不知倒序等法又溺於風寒二字

而曰是雖熱甚邪猶在經以麻黃治衄是發散經中邪氣耳請問邪氣寒乎熱乎若寒邪則血凝不流焉得有衄若熱邪則清降不遑而敢升發耶

柯韻伯

傷寒衄浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之

衄緊無汗者當用麻黃湯發汗則陽氣得泄陰血不傷所

謂奪汗者無血也不發汗陽氣內擾陽絡傷則衄血是奪血者無汗也若用麻黃湯再汗液脫則斃矣言不發汗因致衄豈有因致衄更發汗之理乎觀少陰病無汗而強發之則血從口鼻而出或從目出能不愼哉愚故急爲校正

恐誤人者多耳

柯韻伯

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其大便固者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

宜桂枝湯句讀當在發汗之下

吳靈樞

本條當有汗出證故合用桂枝承氣有熱當作身熱大便固從宋本訂正恰合不大便句他本作小便清者謬宜桂



枝句直接發汗來不是用桂枝止衄亦非用在已衄後也
勿以詞害義可耳○太陽衄血證宜桂枝湯句語意在當
須發汗下麻黃湯主之句在當發其汗下二句皆於結句
補出是倒序法也夫桂枝乃行血之品仲景用桂枝發汗
不是用桂枝止衄是用在未衄時非用在已衄後且奪血
者無汗此理甚明麻黃乃上升之品夫旣云衄乃解又云
自衄者愈若復用升提之藥衄流不止可必矣且衄家不
可發汗此禁甚明矣

柯韻伯

傷寒心下有水氣咳而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去
欲解也小青龍湯主之

小青龍湯主之句讀當在不渴之下

吳靈稗

小青龍主之語意在服湯已上豈有寒去欲解反用燥熱之劑重亡津液令渴不解乎且云服湯已者是何湯耶

小青龍湯主之句是繳上文他書曾易經文今仍古本

禹載

傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或咳者小柴胡湯主之

小柴胡湯主之句讀當在喜嘔之下

吳靈稗

傷寒十三日不解過經讖語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當鞭而反下利脈調和者知醫以丸藥下之非

其治也若自下利者脈當微厥今反和者此爲內實也調胃承氣湯主之

調胃承氣湯主之句讀當在當以湯下之之下

吳靈稗

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此爲有水氣其人或咳或小便利或下利或嘔者真武湯主之

末句真武湯主之語意直接有水氣來後三項是真武加

減證不是主證

柯韻伯

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥冷脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通

鯀四逆湯主之

通鯀四逆湯主之句讀當在其人面赤色之下

吳靈稗

少陰病四逆其人或咳或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之

四逆散主之句讀當在四逆之下

吳靈稗

少陰病四逆洩利下重其人或咳或悸或小便不利或腹中痛者四逆散主之

條中無主證而皆是或然證四逆下必有闕文今以洩利下重四字移至四逆下則本方乃有綱目或咳或利或小便不利同小青龍證厥而心悸同茯苓甘草證或咳或利

或腹中痛或小便不利同真武證種種是水氣爲患不發汗利水者洩利下重故也洩利下重又不用白頭翁湯者四逆故也此少陰氣分之下劑厥應下之者卽此方也

伯顏



錯簡

跌陽脈浮而濇少陰脈如經者其病在脾法當下利何以知
之若脈浮大者氣實血虛也今跌陽脈浮而濇故知脾氣不

足胃氣虛也以少陰脈沉而滑纔見此為調脈故稱如經也

若反滑而數者故知當尿膿也

按若脈浮大者氣實血虛也二句與上下文義不屬當刪

之少陰脈弦而浮豈可謂如經乎當改沉滑二字

醫宗金鑑

問曰翕奄沉名曰滑何謂也師曰沉為純陰翕為正陽陰陽
和合故令脈滑關尺自平陽明脈微沉食飲自可少陰脈微

滑滑者緊之浮名也此為陰實其人必股內汗出陰下溼也

按滑者緊之浮名也此為陰實二句與上下文義不屬官

是錯簡

金鑑 醫宗

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏急也

以飲水多接太陽病句小便利者接下句

吳靈 稗

發汗後不可更行桂枝湯無汗而喘

舊本有無字

大熱者可與麻

黃杏仁甘草石膏湯

下後不可更行桂枝湯若無汗而喘大熱者可與麻黃杏仁

甘草石膏湯

二條無字舊本訛在大熱上前輩因循不改隨文衍義爲後學之迷途仲景每于汗下後表不解者用桂枝更汗而不用麻黃此則內外皆熱而不惡寒必其用麻黃湯後寒解而熱反甚與發汗解半日許復煩下後而微喘者不同發汗而不得汗或下之而仍不汗喘不止其陽氣重者若與桂枝加厚朴杏仁湯下咽卽斃矣故於麻黃湯去桂枝之辛熱加石膏之辛寒佐麻黃而發汗助杏仁以定喘一加一減溫解之方轉爲涼散之劑矣

柯韻伯

傷寒吐下後發汗虛煩衄甚微

八九日心下痞鞭脇下痛氣

上衝咽喉

眩冒經衄動惕者久而成痿

按八九日心下痞鞭脇下痛氣上衝咽喉三句與上下文義不屬註家皆因有此三句不得不支離蔓衍牽強解釋每見此病總因汗出過多大傷津液而成當用補氣補血益筋壯骨之藥經年始愈三句必是錯簡當刪之

金鑑醫宗

傷寒發熱晡晡惡寒大渴欲飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲愈此肝乘肺也名曰橫刺期門

此肝乘肺讀當在腹必滿之下自汗出小便利當在刺期

門之下

吳靈樞

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉

屬陽明也小便數者大便必鞭不更衣十日無所苦也渴欲飲水少少與飲之但以法救之渴者宜五苓散

但以法救之一節讀當在醫下之也之下

吳靈樞

陽明病衄浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反讖語若加燒鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉湯主之

心中懊憹一節讀當在身重之下

吳靈樞

陽明病衄浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重此處當接梔子豉湯主之句若發汗三段因

不用此方而妄治所致仍當梔子豉湯主之仲景但于結句一見是省文法也後人竟認梔子豉湯爲汗下救逆之劑否則未汗下前仲景何法以治之乎

柯韻伯

病人無表裏證發熱七八日雖𧈧浮數者可下之假令已下𧈧數不解合熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血也宜抵當湯若𧈧數不解而下利不止必協熱而便膿血也

若𧈧數已下讀當在可下之下

吳靈樞

傷寒四五日𧈧沉而喘滿沉爲在裏而反發其汗津液越出大便則難表虛裏實久則讞語

表虛裏實一句讀當在沉爲在裏之下

吳靈樞