

未3

644

審視瑤函卷四



傅氏眼科審視瑤函方目

卷之四目錄

實熱生瘡症

加味四物湯
芎歸湯
擦藥一方

椒瘡症

歸芍紅花散

粟瘡症

除風情脾飲

胞生痰核症

防風散結湯
清胃湯

木疳症

羚羊角飲子 平肝清火湯

火疳症

洗心散

土疳症

清脾散 敷藥方

金疳症

瀉肺湯

水疳症

蠲毒飲



大背漏症

燥濕湯

五花丸

小背漏症

瀉濕湯

白薇丸

陰漏症

黃芪湯

陽漏症

保光散

補漏生肌散

小牛黃丸

倒睫拳毛症

石膏羌活散

流氣飲

緊皮膏

五灰膏



起曉膏
夾眼法

皮急緊小症

神効黃芪湯
東垣撥雲湯

胞翻粘瞼症

排風散
龍膽丸

胞輪振跳症

當歸活血飲

胞虛如毳症

調脾清毒飲

兼胎症



保胎清火湯 簡易知母飲 天門冬 堅子

芍蘇散 消風散 天冬飲子

爲產症

熟地黃湯 四物補肝散 四製香附丸

濁害清和症

穀精艸湯 退翳散 望月丸 疎風湯

通竅散 胎克丸 清解散 補元散

加味地黃丸 退雲散 固本犀角湯

附治小兒癰疹疳傷并暴赤疼痛翳膜諸方

消疳退雲飲 九味蘆薈丸 生熟地黃丸



鷄肝散

龍膽蘆薈丸

消疳散

天麻丸

寶鑑炙雀目疳眼法

升麻乾葛湯

車前子散

養肝丸 通頂散

轉轆轤轉關症

釣藤飲子

雙目睛通症

牛黃丸

附小兒目閉不開睛目直視目仰視目睛瞶動目劓

諸症驗方

碧霞丹

四味肥兒丸

九龍控涎散

柴胡清肝

飲

終

人參湯

生地黃散

瀉青丸

和

師牛黃丸



傅氏眼科審視瑤函卷之四

秋陵傅仁宇允科纂輯

廣陵林長生聲震較補

甥張秀徵珩訂正

大梁周靖公亮節較梓

運氣原證

增張文凱廷獻叅閱

男傅維藩國棟編集

公猷

掄

體仁

籲

全次

按內經運氣曰背瘍有二一曰熱經云少陰司天之政三

之氣大火行寒氣時至民病目赤背瘍治以寒劑是也

二曰燥經云歲金太過民病目赤背瘍又云陽明司天

燥淫所勝民病目眦背瘍治以溫劑是也



目瘍

內經曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火火鬱內發致有斯疾蓋心主血而血熱生風鬱甚則通相傳襲故火

能生土血注陽明則肌肉風熱與血熱相搏發於皮膚其名不一有黃膿而白者土生金母歸子也始生微癢而熱輕腫痛爛為熱極血凝化水氣滯成膿甚至寒熱作而飲食減尤為慮宜宜泄風毒凉心火解胃熱按日瘡瘍皆因君火司令燥火熱邪所致宜溫宜涼隨症施治可也

實熱生瘡症

實熱生瘡症瘡生各有

經汨如湯樣注澀急且羞明脾或

弦多潰胞中椒栗成瘡

生於背上心火熾盈盈臉外脾家

燥唇邊赤土形肺熱形

於鼻週身旺六經耳熱知腎燥滿

面六陽蒸三焦炎項上下部六陰乘失治應須變傷睛目

欠明

此症謂曰病生瘡之故輕重不等痛癢不同重則有准
積高厚紫血膿爛而腥臭者乃氣血不和火實之邪血
分之熱尤重如瘀滯之症膏混水濁每每流於脾皆成
瘡瘀血散而瘡自除勤勞濕熱之人每患脾皆成瘡別
無痛腫症者亦輕而無妨若火盛瘡生惟重滯腫痛者
又當急治恐濁氣治於目內而病及於珠若先曰病後
生瘡必是熱沿他症凡見瘡生當驗部分以別內因何
源而來隨其輕重而治之宜服

加減四物湯

生地黃

苦參

蘇薄荷

川芎

黍粘子

連翹

天花粉 防風 赤芍藥 當歸 荆芥穗各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分食後服

芎歸湯

川芎 當歸 赤芍藥 防風 羌活各等分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓頻洗則血活風去

搽藥方治眼皮外滿臉生瘡潰爛疼痛

溫蝎 乳香 沒藥 輕粉 陀僧各等分

右研為細末摻於瘡處

又方治眼胞上下或臉生瘡破流黃水蔭開者

青黛一錢二分 黃栢末 潮腦 輕粉一分 松香一分



右爲細末用舊青布捲藥在內蒜油濕透燒灰俟油灰滴於茶鍾內蘸搽

椒瘡症

血滯脾家火胞上起熱瘡泪多並赤腫沙擦最難當或疼兼又癢甚不便開張可惡愚頑者全憑出血良目睛惟仗血血損目無光輕時須善逐太重脾必傷胞內紅癰癰風熱是椒瘡

此症生於胞內紅而堅者是目間沙擦難開多泪而痛人皆稱粟瘡悞矣夫粟瘡亦生在胞但色黃軟不易散此症雖堅却易散俗皆以龍鬚燈心等物出血取效殊



不知目以血爲榮。血損而光華有衰弱之患。輕者只宜
善治。至於癰癰連片。跣踏高低不平。及血瘀滯者。不得
已而導之。中病卽止。不可太過。過則血損悲傷。真水難
養神膏。大槩用平治之法。退而復來。乃內有瘀滯。不可
量病漸導。若初治不可輕爲開導。孟浪恐有損也。不如
謹始爲妙。宜服

歸芍紅花散

治眼胞腫硬
內生疔瘡

當歸

大黃

梔子仁

黃芩

紅花

以上俱酒
洗微炒

赤芍藥

甘草

白芷

防風

生地黃

連翹

等分

右爲末。每服三錢。食遠白。水煎服。

粟瘡症

脾經多濕熱氣滯血行遲粟瘡胞內起粒粒似金珠細顆似膿來却軟散風清熱早醫治

此症生於兩胞之內細顆黃而軟者是今人皆稱椒瘡爲粟瘡者悞矣夫椒瘡紅而堅胞必腫硬睛必沙漬症尚易治若粟瘡一見目疼頭痛者必有變症粟瘡是風熱鬱於上焦極重但以散風清熱爲主二症雖皆生于胞內屬於血分椒瘡紅堅易散粟瘡黃軟不易散故治亦不同豈可槩論哉宜服

除風清脾飲



卷之四
四
言

廣陳皮 連翹 防風 知母 玄明粉

玄參 黃連 荊芥穗 大黃 桔梗 生地

右剉劑。白水二鍾煎至八分。去滓。食遠服。

目疣

此症或眼皮上下生出一小核是也。乃脾胃痰氣所致。上瞼屬脾經。下瞼屬胃經。若結成小核紅而自破。不藥而愈。若堅白不破。久則如蠱。如拳而成瘤矣。若初起小核時。即先用細艾如粟米壯。放患上。令患目者卧。目緊閉。以隔蒜片炙三四壯。外將膏藥貼之。又用紫背天葵子揀淨二兩。煮甜酒一壺半。皂角子二三粒。炮熟研細。飲酒時。擦疣上。自消。

胞生痰核症

凡。是。胞。生。痰。核。痰。火。結。滯。所。成。皮。外。覺。腫。如。豆。胞。內。堅。實。有。形。或。有。不。治。自。愈。或。有。癰。結。為。癭。甚。則。流。膿。出。血。治。之。



各不同名此火土之燥毋向外求情若能知劫治頃刻便清平。

此症乃胞外皮內生顆如豆堅而不疼火重於痰者色紅紫乃痰因火滯而結此生於上胞者多屢有不治自愈有恣辛辣熱毒酒色斲喪之人久而變為瘦漏重疾者治亦不同若初起知劫治之法則頃刻而平復矣宜服

防風散結湯

玄參

錢一前胡

赤芍藥

黃芩

桔梗

土貝母

防風

蒼朮

白芷

陳皮

天花粉

各八分



右剉劑。白水二鍾。煎至八分。去滓。食後熱服。

清胃湯

治眼胞紅硬。此陽明經積熱。平黃飲酒過多而好食辛辣炙博之味所致也。

山梔仁

炒黑枳殼

蘇子

各六分

石膏

煨

川黃連

炒

陳皮

連翹

歸尾

荆芥穗

黃芩

防風

各八分

甘草

生

右剉劑。白水二鍾。煎至一鍾。去滓。熱服。

木疳症

木疳多在風輪生。碧綠青藍似豆形。如是昏沉應不痛。若然泪澀目多疼。莫教變症侵眸子。不散睡神便破睛。

此症生於風輪者。多其色藍綠青碧。有虛實二症。虛者大而昏花實者小而痛澀。非比蟹睛。因破而出。乃自然。

