

厲風

疥瘡

諸瘡成漏

驚掌風

諸癬

血風瘡

楊梅瘡

癰疹

楊梅結毒

時毒

瘍科選粹卷六

瘍科選粹目錄

第六卷

癘風第七十二

醉僊散

通天再造散

防風通聖散

二聖散

換肌散

黃精丸

大造苦參丸

皂角刺散

栢葉丸

浮萍散

單服革麻

愈風丹

浴法

樺皮散

加減通聖散

神仙紫花丸

洗藥

敷藥

白花蛇丸

補氣洗浴湯

蠲痺散

凌霄花散

換骨丸

大麻風丸

紫雲風丸

活神丹

摩風膏

治諸風酒

搜風換骨奪命丹

風症方

治遍身風痛

治遍身去風

鷺掌風第七十三

蒼耳散

仙掌丸

五脂膏

單方十二條

洗法

燠方

楊梅瘡第七十四

荆防敗毒散

換肌消毒散

蠲痺消毒散

神効方

鷺膽膏

濯毒散

神秘七星散

三奇湯

洗方

擦法

楊梅瘡驗方

楊梅瘡

良方

初起方

點楊梅初起

楊梅點藥

良方增

白粉霜

楊梅結毒第七十五

黑虎丹

神妙起疳散

土茯苓酒

天花粉酒

解毒湯

椰灰散

僊遺糧湯

乳香散

香鱧湯

祛毒湯

五烟

三灰膏

楊梅結毒方

又方

五靈丹

五皮散

單方二條

疥瘡第七十六

四順清涼飲

荊黃湯

烏荊丸

天門冬膏

活血生津飲

除溼丹

升麻葛根湯

蒼朮膏

何首烏散

當歸丸

連翹飲

敗毒散

苦皂丸

胡麻散

連歸湯

升麻和氣飲

當歸飲子

苦參散

苦參丸

麻黃飲

牛黃清心丸

竹葉石膏湯

平胃散

消毒飲

吳茱萸散

剪草散

硫黃餅

三黃散

丹溪一笑散

水銀膏

大楓子膏

大槲榔散

東垣一上散

蘭茹膏

立効散

脂調膏

掃疥散

一擦光二方

疥癩方

巴豆膏

神異膏

一笑散

烏頭散

黃連散

香疥藥

四黃散

大楓膏

溼毒方

寒溼方

大楓水銀膏

溼瘡臙瘡膏

蠟油膏

水銀膏

薰筒

肥瘡

五龍膏

膿瘡方

單方五條

諸癰第七十七

打膿散

頑癰丸

消風散

祛風敗毒散

川槿皮膏

二娘子散

單方十九條

洗癰方

治癰通用五方

八寶散

定粉膏

洗方

烏蛇丸

白花蛇丸

宣風換骨散

硫黃散

一抹散

溼癰方

擦癰方

癰疹第七十八

附

瘰癧熱瘡

瘰癧子

瘰癧

加味羌活湯

羚羊角散

楓香丸

漏蘆丸

烏蛇膏

莽草膏

地骨皮湯

丹參散

黑末子

清熱方

七寶散

赤石脂散

玉女英

棟花粉

絨羊角散

秦艽湯

防風散

荊芥散

時毒第七十九

附

天泡瘡

天行斑瘡

葛根牛蒡湯

犀角升麻湯

梔子仁湯

通氣散

普濟消毒飲

漏蘆散

消毒丸

托裏溫經湯

升麻牛蒡湯

五利大黃湯

天泡斑瘡五方

諸瘡成漏第八十

陷脉散

烏金散二條

應効散

桂附丸

川芎細辛湯

神應膏

附子灸法

血風瘡第八十一

當歸飲

小柴胡湯

活血四物湯

三蛇丹

當歸拈痛湯

大馬齒膏

七珍膏

瘍科選粹卷之六目錄

終

瘍科選粹卷之六

上

繡水陳文治輯

東吳繆希雍叅校

癩風第七十二

癩風者俗呼爲癩風也名雖曰風未必皆因於風大都嗜慾無節勞動氣血熱發汗泄不避風冷淫氣與衛氣相干或熱血得寒及夏月勞甚而入寒泉洗浴或冬月酒後跣水履霜或饑餓宵行而感山嵐嶂氣或途中辛苦而遇風雪霧雨以致溼熱鬱於內而不散風寒客於表而不行人莫之知失用

發散熈鬱既久其病始作或自上虛癢或起白屑
紫雲如癰風之狀或發紫泡疙瘡流膿其邪之初
入也若氣先受之則起在上而血體多血先受之
則起在下而下體多氣血並受其邪則甚重自頭
面起而下者爲順風自足起而上者爲逆風不拘
自上自下但以漸而起者爲輕早就醫藥爲治亦
易忽而至於瘡痍遍體膿水淋漓鬚眉墮落手足
指脫頑痺痛痒鼻塌眼爛齒豁唇竭病勢則甚矣
古方謂此疾有三因五死一因於風毒卽丹溪所謂
天地間殺物之風也二因於溼毒卽前所謂涉水

履霜之類也三因於傳染同處之人素有內熱積毒故因其氣而得之也

五死者一曰皮死麻木不仁二曰脉死血潰成毒三曰肉死割切不痛四曰筋死手足緩縱五曰骨死鼻梁崩塌與夫眉落眼昏唇翻聲噎等證

宋洞虛云大風有五黑色不治餘皆可治虫食肝眉落虫食肺鼻崩虫食脾聲啞虫食心足底穿膝虛腫虫食腎耳鳴啾啾耳弦生瘡或痒或痛如鍼刺虫食身皮痒如虫行凡此皆屬於手足陽明經內經曰腸胃爲市無物不包所受之邪積於二府久

而傳之乃及於脾肺二藏肺主皮毛脾主肌肉故
病在皮毛肌肉治法必先取陽明而後及於手足
太陰

丹溪之法以在上者與醉仙散取臭涎惡血於齒縫
中出在下者以通天再造散取惡物陳出於穀道
中出後用防風通聖散調理仍用三稜鍼刺委中
穴出血張子和用汗吐下出血之法所發者臭汗
所吐者臭涎所刺者皆黑血自額至顙以排鍼上
下俱刺隔一日一次二十餘日方已內經惟用鍼
法病機所載先樺皮散從少至多服五七日灸承

漿穴七壯瘡愈再灸三灸之後服二聖散泄熱劉
河間用疎風泄熱之法宋洞虛先下以再造散以
稀粥將養半月勿妄動作勞後以醉仙散或吐或
利雖至於顙喉頭面皆腫吞不得下流出惡涎或
齒縫中出臭水血絲不能語言不能飲食俱不必
懼但以竹箬灌稀粥或旬日半月一月面色漸白
而安重者又與換肌散此數者皆先哲之治法不
外乎吐惡涎出惡血下惡物自可全愈

若虛痒者四物湯加芩酒調浮萍末痒甚加荊芥蟬
退皮皺而有白屑者白花蛇丸眉髮落者三蛇丹

栢葉丸眉落鼻崩者換肌散補氣養榮湯蝕眼者
蘆薈丸肢節廢者蠲痺散通用凌霄花散胡麻散
加味苦參丸大楓丸換骨丸大麻風丸紫雲風丸
活神丹腎氣丸四聖不老丹外用摩風膏浴癩方
因證用藥亦可謂詳盡矣但終身不得食鹽醬與
牛馬驢羸等肉茄子等類故丹溪切切戒人以絕
味斷欲再發則終不救曾醫五人惟一寡婦因貧
得免於死亦於本病外服四物湯百餘貼乃十分
全愈

孫真人云吾嘗治四五百人終無一人免於死非孫

真人不能活人蓋病人不能守禁忌云耳由此觀之癘風非無治法非不能全愈特人之輕疾重欲不能自惜死云耳醫家當以此首戒病人也

醉仙散

胡麻仁

苦參

右爲末每壹兩五錢入研細輕粉貳錢和勻每日

辰午夕各以壹錢茶清調服服後五七日先於牙

縫內出臭涎渾身疼痛昏悶如醉後利下膿血惡

臭屎爲効證候重而急者須先以再造散下之補

養數日方服此藥必斷鹽醬醋諸般魚肉椒料水
果及煨燒炙燂與茄子等物止宜淡粥淡菜并烏
稍菜花蛇淡酒煮食以助藥力

通天再造散

大治癰
風惡疾

大黃

錦紋者
壹兩

皂角刺

獨生經年黑大
者壹兩五錢

鬱金

生用
五錢

白牽牛

頭末陸錢壹
半生壹半炒

右爲細末每服伍錢

人弱
減半

日未出時冷酒調面向

東服當日利下惡物或臭膿或虫如虫色黑者乃

是多年虫色赤者係是近日所生三四日後再用

一服以虫盡爲止但終身不得食牛馬驢羸等肉