

治赤口瘡乳香散

乳香

沒藥

各一錢

白礬

飛羅錢

銅綠

少許

爲細末摻用

治白口瘡沒藥散

沒藥

乳香

雄黃

各一錢

輕粉

半錢

巴豆霜

少許

右細末乾摻

瘰癧論第二十七

夫瘰癧者經所謂結核是也或在耳前後連及頤頷下連
鉄盆皆爲瘰癧或在胸及胸之側下連兩脇皆爲馬刀手

足少陽主之此經多氣少血故多堅而少軟膿白而稀如
泔水狀治者求水清可也如癰癰生去別經臨時于銅人
內隨其所屬經絡部分對證之穴灸之并依經內藥用之
獨形而小者爲結核續數連結者爲癰癰形表如蛤者爲
馬刀

治馬刀連翹湯

連翹

二斤

薤麥

一斤

大黃

三兩

甘草

兩

右咬咀一兩水兩碗煎至一盞半早食後已時服在頃
兩邊是屬少陽經服藥十餘日後可于臨泣穴灸二十七
壯服藥不可住了至六十日決効有一方加大黃不用

甘草更加貝母五兩雄黃七分攪御半兩同未熟水

下三五錢

治瘰癧文武膏

桑椹也

文武實

二斗黑熟者

布以布袋取十銀石器中熬成薄膏白湯點一匙日三服

痔疾論第二十八

論曰手陽明大腸名曰害蜚

蜚蟲也

六元正紀論陽明又曰司

殺府

手陽明屬金

大腸名害蜚謂金能害五虫又曰司殺府謂金

生殺既有此二名何以自生虫蓋謂三焦相火盛而能制

陽明金故木來相侮內經曰侮謂勝已也木主生五重叔和云氣主生于脾臟傍大腸疼癘陣難當漸覺稍瀉三焦熱莫謾多方立紀綱此言飲酒多食熱物脾生大熱而助三焦氣盛火能生土也當瀉三焦火熱退使金得氣而反制木木受制則五重不生病自愈矣

蒼朮澤瀉丸

蒼朮

四兩 去皮

澤瀉

二兩

枳實

二兩

地榆

一兩

皂子

二兩 燒存性

右爲細末燒飯爲丸桐子大每服三十丸食前酒或米飲下

又方

川鳥

炮

古石灰

等分

依前丸服

淋洗藥

天仙子

荊芥

小椒

蔓荊子

等分

右以水煎洗

黑地黃丸治痔之聖藥也在虛損門下有方

婦人胎產論第二十九

論曰婦人童幼天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆從厥陰論之天癸已絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰經者是祖生化之源也厥陰與少陽相為表裏故治法無

犯胃氣及上二焦爲三禁不可汗不可下不可利小便發
汗者同傷寒下早之證利大便則脈數而已動于脾利小
便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯三禁則榮衛
自和榮衛和而寒熱止矣外則和于榮衛內則調于營衛
先將此法爲之初治次後詳而論之見證消息同壞證傷
寒爲之緩治或小便不利或大便秘結或積熱于腸胃之
間或以成痿或散血氣而爲浮腫蓋產理多門故同傷寒
壞證如發渴用白虎氣弱則黃耆血刺痛而用以當歸腹
中痛而加之芍藥已上例證不犯三禁皆產後之久病也
凡產後暴病禁犯不可拘也如產後熱入血室者桃仁

氣抵當湯之類是也。胃堅燥者，大承氣不可以泄藥言之。
產後泄人多用烏金四物，是不知四時之寒熱，不明血氣
之虛與實，盲然一槩用藥如此，而愈加增劇，是醫人誤之
耳。大抵產病天行從增損，柴胡雖證從加添四物，然春夏
雖從柴胡，秋冬約同四物，藥性寒熱，病證虛實，不可不察
也。四物湯常病服餌四時各有增損，今具增損于后。

春倍川芎

一日春二日脉
弦二日赤痛

夏倍芍藥

一日夏二日
脉洪三日泄

秋倍地黃

一日秋二日脉
滑三日血虛

冬倍當歸

一日冬二日脉沉
三日寒而不食

此常服順四時之氣，而有對證不愈者

謂失其輔也。春防風四物

加防風
倍川芎

夏黃芩四物

加黃芩
倍芍藥

秋天門

冬四物

加天門
倍地黃

冬桂枝四物

加桂枝
倍當歸

此四時常服，證證用之也。

如血虛而腹痛微汗而惡風四物加茂桂謂之腹痛六合
如風虛眩暈加秦艽羌活謂之風六合如氣虛弱起則無
力匡然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合如發熱而煩不能
安卧者加黃連梔子謂之熱六合如虛寒脉微氣難布息
不渴清便自調加乾薑附子謂之寒六合如中溫身沉重
無力身涼微汗加白朮茯苓謂之溫六合此婦人常病及
產後病通用之藥也治婦人虛勞局方中謂之首尾六合
者如人聖散下熟乾地黃丸是治無熱虛勞專其養也中
道藥牡蛎煎丸空心食前人參荊芥散臨卧食後是治有
熱虛勞藥也

治婦人懷胎腹脹枳殼湯

枳殼

三兩 燥

黃芩

一兩

右爲麤末每服半兩水一盞半煎一盞去滓溫服

治產前脹滿身體沉重枳殼湯中加白朮一兩

治產前寒熱小柴胡湯中去半夏謂之黃龍湯

治懷孕胎漏二黃散

生地黃

熟地黃

各等分

右爲細末加白朮枳殼湯調下一兩日二服

治有孕胎痛地黃當歸湯

當歸

一兩

熟地黃

二兩

右爲麤末作一服水三升煎至升半去滓頓服

束胎丸

白朮

枳殼去穢炒等分

右爲末燒飯爲丸如桐子大每月一日食前服三五十九溫熟水下胎瘦易生也服至產則已

產間藥

治胎衣不下或子死腹中或血衝上昏悶或血暴下及胞乾而不儲產者宜服半夏湯

半夏翹

一兩半

桂

七錢半去皮

大黃

五錢

桃仁

三十箇去皮煎炒

右爲細末先服四物湯三兩服次服半夏湯三錢生薑

三片水一盞煎去三分食後如未効次服下胎丸

下胎丸

半夏

生

白鯁

各半兩

右爲細末滴水爲丸如桐子大食後用半夏湯下三三丸續續加至五七丸如有未効者須廣大其藥榆白皮散主之又不効大聖散主之有宿熱人宜服人參荊芥散

產後藥

治產後經水適斷感于異證手足牽搐咬牙昏冒宜增損

柴胡湯

柴胡 八錢

黃芩 四錢

人參 三錢

半夏 三錢

石膏 四錢

知母 二錢

黃耆 九錢

甘草 四錢

右爲麤末每服半兩生薑五片棗四箇水一盞半煎至

一盞溫服清無時

前證已去次服秦艽湯去其風邪

秦艽 八錢

人參 三錢

防風 四錢

芍藥 半兩

柴胡 八錢

黃芩 四錢

半夏 三錢

甘草 四錢

右爲麤末每服五七錢水一盞煎至七分溫服清無時

二三日經水復行前證退宜服荊芥散小柴胡小料中

加荊芥穗五錢只殼五錢麩炒去穰同小柴胡湯煎服

三二日後宜正脾胃之氣無除風邪宜服防風湯

蒼朮

四兩

防風

三兩

當歸

半兩

羌活

一兩半

右爲麤末每服一二兩水三盞煎至一盞半取清續續常服無時

凡胎前之藥無犯胎氣產後變化並同傷寒無證盡從加減四物湯

治產後腹大堅滿喘不能卧白聖散

樟柳根

三兩

大戟

一兩半

甘遂

一兩

炒

右爲極細末每服二三錢熱湯調下取大便宣利爲度此藥主水氣之勝藥也

治產後風氣在表面目四支浮腫宜加減局方中七聖丸
每服二十九白湯下日加三四丸以利爲度如浮腫喘嗽
加木香檳榔倍之謂氣多浮則腫如頭目昏冒加羌活川
芎謂多風也如只浮腫依七聖丸本方服之

治產後日久虛勞雖久而脉浮疾者宜服三元湯

柴胡

八錢

黃芩

人參

半夏

洗

甘草

炙已上
各三錢

川芎

芍藥

熟地黃

當歸

各二錢半

右爲麤末同小柴胡湯煎服

治日久勞虛微有寒熱脉沉而浮宜柴胡四物湯

川芎

熟地黄

當歸

芍藥各一兩半

柴胡八錢

人參

黃芩

甘草

半夏麴已上各三錢

右為麤末同四物煎服

如日久虛勞鍼灸小藥俱不効者宜服三分散

白朮

茯苓

黃耆

川芎

芍藥

熟地黄

當歸各一兩

柴胡一兩六錢

黃芩六錢

人參一兩六錢

半夏大錢

甘草六錢

右為麤末每服一兩水一盞煎至半盞溫服清日一服

治產後虛勞不能食宜十全散

白朮

茯苓

黃耆

各二兩

人參

川芎

芍藥

熟地黄

當歸

各一兩

桂

半一兩

甘草

半一兩

右剉如麻豆每服半兩水一盞半入生薑五片棗三枚

同煎至七分空心食前溫服清

凡虛損病者淺深治有次第虛損論中詳論之

治產後諸風痿痺無力血風湯

秦艽

羌活

防風

白芷

川芎

芍藥

當歸

地黄

白朮

茯苓

各等分

右爲細末一半煉密丸如桐子大一半散溫酒調下九
子五七十丸甚妙

治產後諸積不可攻當養陰去熱其病自退宜服芍藥湯

芍藥

一箇

黃芩

茯苓

各六兩

右三味爲麤末每服半兩水煎日三服去滓溫服

治產後兇枕大痛黑白散

烏金石

燒紅醋土遍另爲細末

寒水石

燒存性末

右二味各等分另頓洗臨服各抄末一錢半粥飲湯下

痛止便不可服未止再服大効

治產後不煩而渴桃花散