

和陣

景岳全書

卷五十四



景岳全書卷之五十四書集

古方八陣

會稽 張介賓 會卿 著

錢塘 曹如璫 璧臣氏 訂

和陣

局二陳湯一 治痰飲嘔惡風寒欬嗽或頭眩心悸或中脘不快或因生冷或飲酒過多脾胃不和等證

陳皮

半夏

制各三錢

茯苓二錢

炙甘草一錢

水二鍾薑三五片棗一枚煎八分食遠服

加減二陳湯二 治嘔吐吞酸胃脘痛呃逆

全書卷五十四 古方和陣



即前方加丁香九粒氣滯甚者可加一二錢

丹加味二陳湯三 治食鬱痰滯胸膈不快

蒼朮 米泔浸白朮炒

橘紅

半夏泡

茯苓

川芎

香附各八分 枳壳

黃連薑炒

甘草各五分

水盞半煎八分食前稍熱服

二米二陳湯四

治一切嘔吐清水如注

蒼朮土炒

白朮炒

陳皮

半夏制

茯苓各一錢

炙甘草五分

水一鍾半薑三片棗二枚煎八分稍熱服○虛寒者加入參



煨乾薑○煨飲加南星倍半夏○宿食加神麴砂仁

明黃芩二陳湯五 治熱痰

黃芩

陳皮

半夏

茯苓等分

甘草減半

水一鍾半薑三片煎七分食遠服

辨柴葛二陳湯六

治一切瘧暑濕勞食等證

柴胡

乾葛

陳皮

半夏

茯苓

甘草

白朮

蒼朮制

川芎

黃芩各等分若陰瘧除此味

水二鍾薑三片煎服○內乾葛川芎蒼朮乃發散之劑若久



瘧及發散過者除之。○陽分汗多加人參黃芪去乾葛。○陰分虛者加酒炒芍藥當歸生地。○久瘧微邪潮熱加四君子湯去祛邪之藥。○若欲截瘧加常山枳檳青皮貝母各一錢。桂附二陳湯七方在熱陣百十五。

治寒瘧厥冷

金小少夏湯八

治嘔吐穀不得下及心下有飲者

半夏一升

生薑半升

右二味以水七升煮取一升半分溫再服。○局方用半夏五

錢生薑二錢半水一鍾半煎服

金小半夏加茯苓湯九

治卒嘔吐心下痞滿有水眩悸者

即前方加茯苓三兩煎法同

^{金匱}大半夏湯

治胃反不受食食入即吐○外臺云治嘔

心下痞鞭者

半夏

二升洗人參三兩

白蜜一片

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍者釀取三升

半溫服一升餘分再服

藥大半夏湯十一

一名橘皮湯

治痰飲及脾胃不和

半夏

陳皮

白茯苓各二錢

水二鍾薑五片煎八分溫服

茯苓半夏湯十二

治嘔吐噦心下堅痞

膈間有水痰眩驚悸及小兒等病

白茯苓 二兩 半夏 五錢

右每服三五七錢薑水煎服

宣橘皮半夏湯十三

治痰涎壅嗽久不已者 常服潤燥解

陳皮 五錢

半夏 制二錢半

水一鍾半加生薑三五片煎七分溫服

靈秘米半夏湯十四

久病不寐者神效世醫解用之

秫米一升

半夏 五合

右用千里長流水八升揚之萬遍取清者五升煮秫米半夏

炊以葦薪令竭至一升半去渣飲汁一小杯日三服其新病

者覆杯即臥汗之即已久病者三日而已也



南京中医药大学图书馆版权所有

陳半夏白米天麻湯十五 治眩暈及足太陰痰厥頭疼

半夏錢半 白米 神曲錢各一 麥芽

陳皮各錢半 人參 黃芪 茯苓

蒼朮 天麻 澤瀉各五分 黃柏二分

乾薑三分

右咬咀每服半兩水二鍾煎八分食遠熱服

金匱黃芩半夏生薑湯十六 治乾嘔而利者

黃芩 生薑各三兩 炙甘草 芍藥各二兩

半夏半升 大棗十二箇

石六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服



東平胃散十七

治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛

嘔噦惡心吞酸噫氣體重節痛自利霍亂噫膈反胃等證

厚朴

薑制炒

陳皮

去白各五兩

蒼朮

去皮米泔炙

甘草

三兩

本方加人參茯苓各二兩即名參苓平胃散

右爲末每服二錢水一鍾薑三片棗二枚煎七分去渣溫服

○或去薑棗入鹽一小撮單以沸湯點服亦可○如小便不利

利加茯苓澤瀉○如飲食不化加神麴麥芽枳實○如胃中

氣痛加木香枳實或枳殼○如脾胃困倦加人參黃芪○如

有痰加半夏○如便鞭腹脹加大黃芒硝○如脈大內熱加

調氣平胃散十八

治胃氣不和脹滿腹痛

厚朴制

陳皮

木香

烏藥

白豆蔻

砂仁

白檀香各一錢五分

藜蘆錢半

藿香一錢二分

水一鍾半生薑三片煎八分食遠溫服

錢氏益黃散十九

治脾土虛寒寒水反來侮土而嘔吐不食或

肚腹作痛或大便不實手足逆冷等證

陳皮一兩

青皮

訶子肉炮去炙甘草各半兩

丁香三錢

右每服四錢水煎服

藿香正氣散二十

治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂



泄瀉痞滿嘔逆及四時不正之氣瘧痢傷寒等證

藿香

紫蘇

桔梗

白芷

大腹皮各錢

陳皮

半夏

茯苓

甘草

白朮

厚朴各八分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗

不換金正氣散二

治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發

寒熱或作瘧疾或受山嵐瘴氣等毒

厚朴

薑制

藿香

半夏

蒼朮

米泔浸

陳皮

各一錢

甘草

炙五分

薑棗水煎服

陳不換金正氣散二

治感冒風寒或傷生冷或瘧瘧或疫



蒼朮

米泔浸炒

厚朴 薑汁炒 各四兩

炙甘草

半夏 制

藿香 各二兩 人參

木香 溫紙裹煨

白茯苓 各一兩

右每服一兩薑棗水煎服

徐氏正氣散 二三

正胃氣進飲食退寒瘧食瘧瘴氣 脾胃滯者用之為宜

藿香

草果 各二兩 半夏 制

陳皮

厚朴

砂仁

炙甘草 各一兩

右為末每服三錢加生薑七片棗三枚同煎 俟瘧未發前和渣服

濟生大正氣散 二四

治脾胃不和為風寒濕氣所傷 心腹脹悶有妨飲食

白朮

陳皮 各二錢 半夏 制

藿香葉

厚朴 薑炒

桂枝

枳殼

檳榔

乾薑

炮各一錢

甘草

炙五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分不時溫服

東升陽益胃湯二五

治秋燥令行濕熱少退脾胃虛弱怠惰

嗜臥體重節痛四肢不收口苦舌乾飲食不消大便不調小

便頻數兼見肺病酒淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽

氣不伸故也當升陽益胃○良方無黃芪甘草半夏芍藥

人參

炙甘草

半夏

肺瀆者宜用各二錢黃芪二錢

白朮三分

白芍

防風

羌活

獨活

各五分

柴胡

茯苓

小便利者勿用澤瀉不淋者勿用各三分

陳皮

四分

黃連

二分

右咬咀每服三錢漸加至五錢生薑五片棗二枚水三鍾前一鍾早飯午飯之間溫服忌語語一二時及酒濕助火之物○服藥後如小便畢而病反增是不宜利小便也當去茯苓澤瀉若得喜食增食初二日間不可大節藥力尚淺胃氣再傷不得轉運也或用美食以助藥力而滋胃氣慎不可淡食以損藥力而助邪氣之沉降也亦可小役形體使胃氣升發切勿大勞致令復傷但以胃氣安靜為尤善

藏白米湯二六

治風濕惡寒脉緩

白米

防風

甘草

右咬咀加生薑煎服

濟生白木湯二七

治五臟受濕軟嗽痰多氣喘身重脉濡細

白木

橘紅

半夏

茯苓各二錢

炙甘草一錢

水一鍾半薑五片煎七分食後服

旗二味白木湯二八

方在婦人十二

治妊娠內熱心痛

旗四味白木湯二九

方在婦人十三

治妊娠胃虛惡阻

白木散三十

治白汗盜汗極效

白木半斤

右將白木切成小塊用淨麥一升水一斗同煮乾如白木尙



南京中医药大学图书馆版權所

硬再加水煮透爛取起切片焙乾爲末每服二三錢仍用粳
麥煎湯食遠調服○如治小兒以炒黃芪煎湯薑兒大小
服○忌蘿蔔辛辣炙煨之物乳母尤忌

暄白朮散三一 方在固陣三

治虛風多汗痿弱

煨白朮散三二 方在婦人十一

治妊娠傷寒內熱等證

調胃白朮散三三 治脾胃不和腹脹泄瀉身面浮腫

白朮

茯苓各二錢陳皮

白芍藥炒

澤瀉

檳榔各一錢木香五分

水二鍾薑二片煎八分食遠服○如腫不退倍加白朮并和

白朮芍藥湯三四

治脾經受濕水泄體重微滿困弱無力

欲飲食或暴泄無數水穀不化宜此和之

白朮炒

芍藥炒各一甘草炒牛

右每用一兩水煎服

草白朮芍藥湯三五

治痛瀉要方

白朮炒三兩芍藥炒二兩陳皮炒兩半防風二兩

右或煎或丸或散皆可用久瀉者加炒升麻六錢

金苓桂朮甘草湯三六

病痰飲者當以溫藥和之凡心下有

痰飲胸脇支滿目眩此方主之



南京中医药大学图书馆