

名醫類案卷第八

新都篁南江瓘集後學

仁和余集蓉裳
錢塘魏之琇玉橫
仁和沈煥敦曾
欽鮑廷博以文
重校

血症

張杲在汝州因出驗尸有保正趙溫不詣尸所問之即云衄
血已數斗昏困欲絕張使人扶掖至鼻血如簷滴張謂治
血莫如生地黃遣人覓之得十餘斤不暇取汁因使生服
漸及三四斤又以其滓塞鼻須臾血定又癸未娣病吐血
有醫者教用地黃自然汁煮服此治熱日服數升三日

而愈。有一婢半年不月。見釜中餘汁。輒飲數盃。尋卽通利。其效如此。

東垣治一貧者。脾胃虛弱。氣促。精神短少。衄血吐血。以麥門

冬二分。人參歸身三分。黃芪白芍甘草各一錢。益氣血脫五味

五枚。作一服。水煎。稍熱服。愈。繼而至冬。天寒居密室。臥大

熱炕。而吐血數次。再求治。此久虛弱。外有寒形。而有火熱

在內。上氣不足。陽氣外虛。當補表之陽氣。瀉裏之虛熱。夫

冬寒衣薄。是重虛其陽。表有大寒。壅遏裏熱。火邪不得舒

伸。故血出於口。憶仲景傷寒有云。太陽傷寒。當以麻黃湯

發汗。而不與之。遂成衄。却與麻黃湯立愈。此法相同。遂用

之以麻黃桂枝湯人參益上焦元氣而實其表。麥門冬保肺氣各三分。桂枝以補表虛。當歸身和血養血。各五分。麻黃去根節去外寒。甘草補脾胃之虛。黃芪實表益衛。白芍藥各一錢。五味三枚。安其肺氣。臥時熱服。一服而愈。

丹溪治一婦貧而性急。忽衄作如注。倦甚。脉浮數。重取大。大

陽。脉亦有。大則爲。虛非重取而得之也。且芤。此陽滯於陰。病雖重可治。急以

萱草根入薑汁各半飲之。本草云萱草根同薑汁。服乃大熱衄血仙方。就以四

物湯加香附側柏葉四服覺渴。仍飲以四物十餘貼而安。

有形之血不能速生。無形之氣所當急固。況症倦甚而衄。如注耶。乃先生以爲陽滯於陰。不投參朮而用四物。後學

宜細心別焉。

一壯年患嗽而咯血，發熱肌瘦。吐血發熱治女人要問經次行否，恐氣升而不降，當閱經

水俞子容治案可法醫用補藥數年而病甚，脉濇。此因好色而多怒。

精神耗少，又補塞藥多，榮衛不行，瘀血內積，肺氣壅遏，不

能下降，治肺壅，非吐不可。精血耗，非補不可。唯倒倉法，二

者兼備。但使吐多於瀉耳。兼灸肺俞。左右二穴。肺俞，膀胱穴。在三

椎骨下橫過各一寸半，灸五次而愈。

一人咳嗽吐血，四物加貝母、瓜蒌、五味、桑白皮、杏仁、款冬花。

柿霜。今人治血大率如此。

一人年五十，勞嗽吐血，以人參、白朮、茯苓、百合、白芍藥、紅花、

細辛。細辛、紅花，配方甚奇。黃芪、半夏、桑白皮、杏仁、甘草、阿膠、訶子、青

黛瓜、萋、海石、五味、天門冬。

一人近四十、咳嗽吐血、四物換生地、加桑白皮、杏仁、款冬花、五味、天門冬、桔梗、知母、貝母、黃芩。

一人不欬吐而血見口中、從齒縫舌下來者、藥用滋腎水、瀉相火、治之不旬日而愈、後二人証同、俱以此法治之、效。

一人因憂病欬吐血、面黎黑、色藥之不效、曰、必得喜可解、其兄求一足衣食地處之、於是大喜、卽時色退、不藥而瘳、經曰、治病必求其本、又曰、無失氣宜、是知藥之治病、必得其病之氣宜、苟不察其得病之情、雖藥亦不愈也。

滑伯仁治一婦、體肥而氣盛、自以無子、嘗多服煖宮藥、積久

火盛迫血上行爲衄。衄必數升餘。面赤。脉躁疾。神恍恍如癡。醫者猶以上盛下虛丹劑鎮墜之。伯仁曰。經云。上者下之。今血氣俱盛。溢而上行。法當下導。奈何實實耶。卽與桃仁承氣湯三四下。積瘀旣去。繼服旣濟湯二十劑而愈。

一人病嘔血。或滿杯。或盈盆盎。且二三年。其人平昔嗜市利。不憚作勞。中氣因之侵損。伯仁視之。且先與八寶散一二日。服黃芩芍藥湯。少有動作。卽進犀角地黄湯。加桃仁大黃湯。稍間。服抑氣寧神散。有痰。用礞石丸。其始脉芤大。後脉漸平。三月而愈。屢效。

一人乘盛暑往途中。吐血數口。亟還。則吐甚。胸拒痛。體熱。頭

眩病且殆。或以爲勞心焦思所致。與茯苓補心湯。仁至診其脉洪而滑。曰是大醉飽。胃血壅遏。爲暑迫血上行。先與犀角地黃湯。繼以桃仁承氣湯。去瘀血宿積。後治暑卽安。一人病咳血痰。診其脉數而散。體寒熱。仁曰。此二陽病也。在法不治。當以夏月死。果然。

子和治一書生過勞。大便結燥。欬逆上氣。時喝喝然有音。吐嘔鮮血。以苦劑解毒湯。加木香。漢防己煎服。時時啜之。復以木香檳榔丸泄其逆氣。月餘而痊。

呂滄洲治一人病衄。浹旬不止。時天暑脉弱。衆醫以氣虛不

統血。

老生常談

日進芪歸茸附。滋甚求治。呂至。未食頃。其所衄

血已三覆器矣。及切其脉，兩手皆虛芤。右上部滑數而浮。

躁。脉浮參以時令其鼻赤，查而色白。即告之曰：此得之酒。酒毒

暴悍而風暑乘之，熱蓄於上焦，故血妄行而淖溢。彼曰：某

嘗飢走赤日，已而醉酒向風臥。公所診誠是，為製地黃汁。

三升許。補其本兼用防風湯。瀉其標飲之即效。

項彥章治一婦，患衄三年許。醫以血得熱則淖溢，服瀉心涼

血之劑，益困。衄纔數滴，輒昏。六脉微弱，寸為甚。曰：肝藏血

而心主之。今寸口脉微，知心虛也。心虛則不能司其血，故

逆而妄行。法當養心，仍補脾實其子。子實則心不虛矣。虛則補母

有之虛而補子之說，今見此案，信哉醫理。以琥珀諸補心
無窮盡無方體也。故其命方曰歸脾湯。

藥遂安

許先生論梁寬父病。右脇肺部也。欬而吐血。舉動喘逆者。肺脹也。發熱脉數不能食者。火來刑金。肺與脾俱虛也。脾肺俱虛而火乘之。其病爲逆。如此者。例不可補。瀉若補金。則慮金與火持而喘咳益增。瀉火則慮火不退位而痧癰反甚。真知箇中三昧正宜補中益氣湯先扶元氣。少以治病。藥加之。

聞已用藥未效。必病勢若逆。而藥力未到也。遠期秋涼。庶可復爾。蓋肺病惡春夏火氣。至秋冬火退。只宜於益氣湯中隨四時升降寒熱。及見有證。增損服之。或覺氣壅。間與加減枳朮丸。或有飲間服局方枳朮湯數月。逆氣少回。逆

氣回則可施治法。但恐今日已至色青色赤。及脉弦脉洪。則無及矣。病後不見色脉。不能懸料。以既愈復發言之。惟宜依准四時用藥。以扶元氣。庶他日既愈不復發也。其病初感必深。恐當時消導尚未盡。停滯延淹。變生他証。以至於今。宜少加消導藥於益氣湯中。庶可漸取效也。

一人膏粱而飲。至今病衄。醫曰。諸見血者爲熱。以清涼飲子投之。卽止。越數日。其疾復作。醫又曰。藥不勝病故也。遂投黃連解毒湯。或止或作。易數醫。皆用苦寒之劑。俱欲勝其熱而已。飲食起居。浸不及初。肌寒而時躁。言語無聲。口氣臭穢。似熱惡如冷風。其衄之餘波。則未絕也。或曰。諸見血者。

熱。衄。熱。也。熱。而。寒。之。理。也。今。不。愈。而。反。害。之。何。耶。內。經。曰。以。平。爲。期。又。言。下。工。不。可。不。慎。也。彼。惟。知。見。血。爲。熱。而。以。苦。寒。攻。之。抑。不。知。苦。瀉。土。土。脾。胃。也。脾。胃。人。之。所。以。爲。本。者。今。火。爲。病。而。瀉。其。土。火。未。嘗。除。而。土。已。病。矣。土。病。則。胃。虛。虛。則。榮。氣。不。能。滋。榮。百。脉。元。氣。不。循。天。度。氣。隨。陰。化。而。無。聲。肌。寒。也。噫。粗。工。嘻。嘻。以。爲。可。治。熱。病。未。已。寒。病。復。起。此。之。謂。也。

吳球治一少年患吐血來如湧泉諸藥不效虛羸瘦削病危亟脉之沉絃細濡其脉爲順血積而又來寒而又積疑血不歸源故也嘗聞血導血歸未試也遂用病者吐出之血

各醫類集卷八
瓦器盛之。俟凝入銅鍋炒血黑色。以紙盛放地上出火毒。細研爲末。每服五分。麥門冬湯下。進二三服。其血遂止。後頻服茯苓補心湯數十貼。以杜將來。保養半年復舊。

徐德占治一人患衄尤急。灸項後髮際兩筋間宛宛中三壯立止。蓋血自此入腦。注鼻中。常人以線勒頸後。尚可止衄。此灸宜效。

秀州進士陸迎忽得疾。吐血不止。氣蹙驚顫。狂躁跳躍。雙目直視。至深夜欲拔戶而出。如是兩夕。諸醫盡用古方。及單方。極療不瘳。舉家哀禱。事觀音。夢授一方。但服一料。當永除根。用益智一兩。生硃砂二錢。青皮半兩。麝香一錢。爲細

末燈心湯下

治驚狂吐血方莫過於此

陸覺取筆記之服之乃愈

一人勞瘵吐血取茜草一斤

琇按後云翦草狀如茜草則此處當作翦草

淨洗碎

爲末入生蜜一斤和成膏以陶器盛之不得犯鐵器日一蒸一曝至九日乃止名曰神傳膏令病人五更起面東坐不得語言用匙抄藥如食粥每服四匙良久呷稀粟米粥壓之藥只冷服粟米飲亦不可太熱或吐或下皆無害凡久病肺損咯血吐血一服立愈

翦草狀如茜草又如細辛婺台二州有之惟婺可用

饒州市民季七常苦鼻衄垂困醫授以方取蘿蔔自然汁和無灰酒飲之則止醫云血隨氣運轉氣有滯逆所以妄行

蘿葡最下氣而酒導之。是以一服效。經五日。復如前。僅存

喘息。而張思順以明州刊王氏單方。刮人中白。置新瓦上。

火逼乾。以溫湯調下。卽止。

按人中白能去肝火三焦火導膀胱火下行故也且不多用火

力則清涼矣

今十年不作。張監潤之江口鎮。適延陵鎮官曾棠

入府。府委至務。同視海舶。曾著白茸毛背子。盛服濟潔。正

對談之次。血忽出如傾。變所服爲紅色。駭曰。素有此疾。不

過點滴耳。今猛來可畏。覺頭空空然。張曰。君勿憂。我當爲

製一藥。移時而就。持與之。血止不復作。人中白者。旋盆內

積鰾垢是也。蓋秋石之類。特不多用火力。治藥時。勿令患

人知。恐其以爲污穢。不肯服。此方可謂奇矣。

魏華佗善醫，嘗有郡守病甚，佗過之。郡守令佗診候，佗退謂其子曰：「使君病有異於常，積瘀血在腹中，當極怒嘔血，卽能去疾，不爾無生矣。」子能盡言家君平昔之慝，吾疏而責之。其子曰：「若獲愈，何謂不言？」於是具以父從來所乖謬者盡示佗。佗畱書責罵之，父大怒，發吏捕佗。佗不至，卽嘔血升餘，其疾乃平。獨異志

蔡子渥傳云：同官無錫監酒趙無疵，其兄衄血甚，已死入殮。

血尚未止。

琇按血未止則生氣猶存

一道人過之，聞其家哭，詢之道云：

是曾服丹或燒煉藥，予藥之，當卽活。探囊出藥半錢，吹入鼻中，立止，得活。乃梔子燒存性末之。

一人鼻衄大出欲絕取茅花一大把水兩碗煎濃汁一碗分二次服立止良方

一人指縫中因搔痒遂成瘡有一小竅血濺出不止用止血藥及血竭之類亦不效數日遂死復有一人於耳後髮際搔痒亦有小竅出血與前相似人無識者適有道人云此名髮泉但用多年糞桶籬曬乾燒灰敷之立愈使前指縫血出遇之亦可以無死矣

邵村張教官患衄血多諸治不效首垂任流三晝夜不止危甚一道人教用生藕一枝搗貼顙顙更以海巴燒存性爲末鵝管吹入鼻內二三次卽止

海巴俗名壓驚螺卽雲南所用肥也

一人毛竅節次出血，少間不出。卽皮脹如鼓，口鼻眼目俱脹。合名曰脉溢。以生薑汁併水各一二盞服之愈。

人有灸火至五壯，血出一縷，急如溺，手冷欲絕。以酒炒黃芩一二錢酒下則止。

一婦人三陰交脾穴無故出血如射，將絕。以手按其竅，縛以布條，昏仆不知人事。以人參一兩煎灌之愈。

陳斗崑治薛上舍高沙人，素無恙。驟吐血半缶。陳診之曰：脉弦急，此薄厥也。病得之大怒，氣逆陰陽奔併。羣醫不然。檢素問通天論篇示之，乃服飲六鬱而愈。

有患衄出血無已，醫以爲熱。沈宗常投以參附，或驚阻之。沈