

產後火之症

生一肖愚治吳收之室年二十餘產前已有感冒今婉三日後  
目責汗離林時正冬月覺身上慄慄遂身熱頭痛或用參  
蘓飲其汗頭痛止而身熱不除遂以產後當大補氣血  
散劑而煩熱日甚又擬用補中益氣湯脈之兩手雖弱而  
六脈帶浮右已見數曰脈虛正產後之平脈但左手猶浮  
知表邪未散右手見數欲傳裡之候也宜急解其表微通  
其裡少緩便有承氣之患矣用柴葛根桔黃芩花粉甘草  
山查一劑而煩熱減二劑而身涼以清氣養榮湯調之

乃胎前伏邪也。屢用參朮則邪愈結而正愈阻。肌表惡寒者邪熱內鬱逼陰于外也。口乾面赤胸滿者邪氣挾火挾食上凌清道也。仍宜一表一裡治之。用葛根防風蘊梗枳殼桔梗杏仁蘊子薄荷一服而表症已。右關尺轉見滑實。隨而大黃五錢元明粉三錢甘草一錢一服下穢穢甚多。復發疹發顯此表裡兩和邪畢達之徵也。再與辛涼解透之劑而安。此症邪伏于內久而不宣清陽泄表苦寒達下兩泄之猶發疹發顯而乃安行溫補將謂脉伏惡寒為陽虛之候耶。其亦不審病機甚矣。

氏婦產後一月神氣昏倦上氣喘促胸滿中痛咳嗽發熱百治無效。診之兩脉沈澁無結。此胎前已有伏邪。兼產後氣血

此君大藥與孫  
文垣陸氏祖師  
同尋惟能大  
用人參附子耳

兩虛邪益內結法宜表裡兩和使邪從外達氣從內泄病  
自愈矣以桂枝柴胡蘓梗枳殼半麴薑子杏仁廣皮透邪  
達滯之劑頓安脈已稍舒或投參地歸芍飲滯之品遂徹  
夜靡寧如喪神守此邪結于中補之生變也乃用桂枝炮  
薑黃連枳實厚朴廣皮等一劑而胸膈中痛除復用瓜蒌  
實枳實胡桂枝半夏枳實杏仁蘇子桔梗再劑而表熱喘咳  
平但大便不行此久病津液失養也加生首烏一兩便行  
餘邪盡去然心氣大虧再與歸補氣血之劑而安

李季虬治魏季嘗正產後飲食不節復感風寒遂致發熱譫

以脉氣浮大有力故也用大劑陳風消食之藥二劑便霍  
然先是有用白朮芎歸等補藥者疑為誤廣筆記

張意田治一婦人產患病已及半載咸作勞損治且云陰虧  
已極勢難痊愈張連診五次確知此症服小柴胡湯法必  
當應奈群議紛紛以參朮非治陰虧之藥又言肺熱咳嗽  
大忌人參因立案正之幸病家見信一服而寒熱大作三  
服之後寒熱退而咳嗽平十服全愈案云診得六脉皆數  
右寸大而軟關尺兩部沈候弦急左寸洪數關部三候皆  
虛數之中空大夫右寸軟大肺氣虛也關尺沈候弦急關  
主中州尺司火位沈裡也弦肝木也此目中氣虛而不邪  
犯位木氣動而火從之也左寸洪數心經虛火也關中虛

數肝無血養也。尺中空大，腎水虛也。是脉本屬陰虛而寒邪乘之，留連不已，以至於此。今所見症，五更發熱，上午寒熱得汗，則身熱稍減，寅卯木旺之時，肝木扶邪，隨時而動也。得汗熱減，邪稍泄而勢稍緩也。咳嗽之聲，結而不暢，此久咳傷肺，肺氣虛而邪不得越也。胸腹時脹而微鳴，此肝木犯脾，脾主脹也。以症合脉，以脉合症，是為虛中，揆實不得，樞轉外出之候也。大全曰：產後血氣虛弱，飲食未平，不滿百日，將養失所，風冷客于氣血，顏容憔悴，飲食難消，感於肺，故咳嗽口乾，遂覺頭昏，百節疼痛，榮衛受邪，氣通

傷或用清涼或用滋補以致寒邪鬱伏久留不解而寒熱  
往來或為咳嗽其症全似勞損欲辨之者察其表裡病情  
或身有疼痛而微汗則熱退無汗則復熱或大嚴欬嗽脈  
雖弦緊而不甚數即病至一兩月而邪猶未解此似損非  
損之症毋再悞也今此症實類此當用小柴胡湯轉動樞  
機藉少陽之生氣從內而外自下而上則陰陽和而伏邪  
解散矣半夏生當夏半能啟陰氣產後陰虧而兼口燥故  
去之胸腹時脹脾陰多鬱宜加牛膝以導之藥病相當自  
應如鼓應也

來天培治潘氏婦季夏產後二十餘日患寒熱腹便血惡露  
未淨希科以香薷飲四劑与之服後反嘔吐頭眩腹痛自

汗惡心發熱氣促發斑色微紅兩頰淡紅疹之左脉以位  
右脉沈細此虛而兼感嘔吐傷胃肝木乘相火刑金肺氣  
受傷上下拒格之症也治宜活血滋陰行氣舒脾散滯降  
逆托裡化斑之劑用牛膝茯苓杞子當歸紅芍黃耆以芎  
木香香附廣皮夏麴生薑一劑諸症大減六脉和緩但微  
嗽眩運心跳胸膈不舒此邪去正虛所致也前方去以芎  
木香牛膝加茯神丹參杏仁貝母二劑前症盡除惟心跳  
頭暈改用歸脾湯去人參木香加防黨參杞子白芍調理  
而愈



產後暑

孫文垣治一婦人年十六初產女艱苦二日偶感暑邪繼食

麩餅時師不察竟以參朮投之即大熱譫語口渴汗出如

洗

暑在氣喘暑傷多汗

泄瀉瀉皆黃水無糞

協熱下利

日夜無度小

水短少飲食不進症甚危惡時六月初旬女科見熱不退

乃投黃連黃芩白芍之劑諸症更甚又以參朮大劑因果

乾薑等止瀉一日計用參二兩四錢瀉益頻熱益劇喘汗

轉加譫語不徹口醫各束手謝曰汗出如油喘而不休死

症也又汗出熱不退瀉而熱不止譫語神昏產後脉洪大

常事。但暑邪麤食，瘀血皆未銷鎔。補劑太驟，致畜血如見。

鬼。若消瘀去積，解暑猶可生也。用益元散六銖，解暑清熱。

止瀉利水

為君。糖球子、鄧山三銖為臣。紅麴、澤蘭各一銖五分，消瘀。

安魂為佐。橘紅、半夏、麴、茯苓、理脾為使。三銖五分，消前參。

術決其壅滯為先鋒。飲下即畧睡，譫語竟止。連進二劑，大。

便減半。次日仍用前劑，其夜熱大減。大便只二次，有黃糞。

矣。惡露行黑血數枚。次日診之，脈始有緒，神亦收斂。進粥。

一盞。前方去三棱、紅麴，加扁豆。大便一次，所下皆黑糞。熱。

盡退。便調，改用四君子，加益元散、青蒿、扁豆、香附、酒芍、炮。

薑，調理而安。

易思蘭治石城王福歟之妃癸酉六月受孕偶患瀉泄醫用  
淡滲之藥止之自後每月瀉三五日有作脾瀉者用參苓  
白朮散之類二三服亦止然每月必瀉五七次至次年三  
月生產後連泄半月日夜八九次諸藥不効驚惶無措召  
易診之兩寸尺俱平和惟兩關洪大有力曰此暑病也以  
黃連香薷飲治之一劑減半再劑全愈惟肝脉未退又用  
通元二八月調理半月後平復

陸肖愚治李丹山子室自來元氣不足產後六七日正當酷

暑而臥房在樓忽頭疼氣喘昏悶體若燔炭沈沈暈去或

而非感寒宜涼解而不宜溫散令取井水洒地鋪以蘆席  
移病人卧其上飲以香薷飲遂微汗而甦再用清暑益氣  
湯四劑而起

沈明生治劉舜泉孫媳夏月產後暈厥不知人事或謂惡露  
上攻所致投去瘀清魂等劑瘀不行暈厥益甚又作痰治  
食治皆不効沈至回翔諦審笑曰吾得之矣此暑熱乘虛  
而入急宜清暑非黃連不可或謂血得冷則凝今惡露未  
去若投它涼是速其斃也沈笑曰有不諱吾任之藥甫入  
口厥甦暈止再進而惡露行蓋產時搗小人多炎敵之際  
益助其熱乍虛之體觸之豈能不病徑云暑傷心又云心  
主血心為熱冒而暈厥此中暑而非惡露明矣或曰舍時

未能透徹

從時理固然矣然血熱則行冷則凝亦古訓也今用寒涼  
而惡露反去何也曰熱行凝以血喻水道其常耳子獨  
不觀失血者有用溫暖藥而得止則瘀血者豈無用苦寒  
而得行此造化之微權從從之妙理也安可執乎



產後火熱

易思蘭治一婦產後半月餘胃有清水作逆而吐以為胃寒

令煮雞倍用椒薑初覺相宜

凡內熱虛火之人初服至三

辛熱之藥亦有小効

五日清水愈多以薑椒煎湯時時飲之近一月口氣漸冷

四肢發厥晝夜作逆腹中冷氣難堪有時戰慄用四物湯

人參一錢至二錢初服少安久則不應又加炮薑亦不効

衆議用附子理中湯

趨庸俗必易診之道

診之六脉俱無以食指復

按尺部中指無名指按尺之後

診法

脉來實數有力左右

皆同發言壯屬一氣可說三五句唇焦頰赤大便五六日

蔣仲芳治一新  
產後熱服藥不  
上效以益母炒煎  
湯加童便与之  
熱逆退蓋診其  
脈平和惟少數  
故也

又見熱風門  
薛案

連進四盞六脈俱現薑椒湯不飲食矣又進四盞身不戰  
慄清水減半服四日口中熱氣上升滿口舌尖俱發黃小  
粟瘡大便八日不通以四苓合涼膈散空心一服至午不  
動又以甘草煎湯調元明粉五錢熱服一時許腹中微鳴  
吐出酸水一二碗大便連去二次又服元明粉五錢下燥  
矢十數枚後以四苓三黃山梔枳殼調理全愈

按此為火極似水物極必反之候凡患此為燥熱溫補  
所殺者多矣哀哉

許學士云記一婦人產後獲密罔內更生火睡久及醒則昏  
昏如醉不省人事其家驚惶許用荊芥佐以交加散云服  
之即睡中必作左手搔頭覺必醒矣本事方蓋為火

產後火

沈協蘭室人善病自頗知醫最重景岳全書數年來所服多  
溫補之劑約桂附幾各半斤近以產後惡露淋瀝赤白時  
下咳嗽咳甚小便自遺脉之右寸鼓指兩關弦數右尺弱  
面有紅光舌當中無胎胸多冷氣喜熱飲稍涼則不快所  
服乃壽並加薑桂等乃列案與之曰病本三陰不足久服  
溫補則氣分偏勝遂致綿延不已其誤在便溏氣冷又喜  
熱飲認為脾胃虛寒不知火盛下迫則瀉作上冲則反冷鬱  
于中則得平熱而暫散此理方書多未論及今以產後去