

亥23

6(2)46

徐氏十三種醫書

中華圖書館印行



蘭臺軌範卷五

目錄

麥冬湯

桂枝加厚朴杏子湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

定喘湯

鐵肺丸

清燥救肺湯

以上喘

雞矢醴方

防己茯苓湯

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯

枳朮湯

蒲葶散

己椒藶黃圓

牡蠣澤瀉散

大腹水腫方

麻豆湯

十水丸

舟車神祐方

大聖瀉川丸

木香散

參蘇丸

療水病洪腫氣脹不消方

療患氣兼水身面腫垂死方

五香散

五皮散

治蠱脹方

數藥

沉香琥珀丸

調榮飲

烏鯉魚湯

小胃丹

煨腎散

禹餘糧丸

以上腹脹水腫

甘草乾薑湯

桂枝去芍藥加皂莢湯

草薢湯

桔梗白散

以上肺痿

血枯方

柏葉湯

瀉心湯

滋血潤腸湯



治吐血百治不瘥療十瘥神驗不傳方

犀角地黃湯

犀角地黃湯

四生丸

白芨枇杷丸

皮膚血汗方

汗血方

諸竅出血方

療舌上出血如孔鑽者

療舌血不止

紫霜丸

療齒斷血出

療酒醉牙齒涌血

雄黃麝香散

治牙縫出血

黃連散

療滿口齒血出

治牙宣方

療鼻瀝血三升氣絕方

茅花湯

地黃散

療淋血方

療小便出血方

瞿麥散

神效方

髮灰散

玉屑散

鹿角膠丸

黃土湯

赤小豆當歸散

牛角鰓灰散

豬臟丸

又豬臟丸

以上諸血

茱萸湯

生薑瀉心湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

豬苓散

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

生薑半夏湯

半夏乾薑散

葛根加半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

黃連湯

昆布丸

關格不通方

千金理諸噎方

又方

中風客熱噦方

嘔噦方

消穀丸

卒噦

廣濟檳榔散

崔氏方

深師治噎方

反胃方

丁香柿蒂湯

治冷呃方

撞氣阿魏丸

以上噎
膈吐

溫脾湯

訶梨勒丸

香茸丸

固腸丸

附子理中丸

以上
泄瀉



蘭臺軌範卷五

吳江徐靈胎撰

喘

素問

經脈別論夜行則喘出於腎淫氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出於肺淫氣傷心度
水跌仆喘出於腎與骨當是之時勇者氣行則已怯者則著而爲病也 陽明脈解篇陽明厥則喘而惋
惋則惡人帝曰或喘而死或喘而生者何也岐伯曰厥逆連臟則死連經則生 脈要精微論肝脈搏堅
而長因血在脇下令人喘逆 逆調論腎者水臟主津液主臥與喘也此句又爲喘之總訣生氣通天論因於暑汗
煩則喘喝靜則多言 陰陽別論陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起起則熏肺使人喘鳴 水熱
穴論水病者下爲跗腫大腹上爲喘呼不得臥者標本俱病故肺爲喘呼腎爲水腫肺爲逆不得臥

金匱

上氣面浮腫肩息其脈浮大不治又加痢尤甚

喘方

麥冬湯金匱 火逆上氣咽喉不利止逆下氣此主之

麥冬七升 半夏一升 人參 甘草各二兩 粳米三合 大棗十二枚 右六味以水一斗二升煮取六升

溫服一升日三夜一服 此即竹葉石膏湯去竹葉石膏加大棗也專清肺胃之火若火逆甚仍用竹葉石膏為妙

桂枝加厚朴杏子湯傷寒論 喘家主之 於桂枝湯方內加厚朴二兩 杏仁五十個去皮尖 餘依前法

麻黃杏仁甘草石膏湯傷寒論 發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者此湯主之

麻黃四兩去節 杏仁五十個去皮尖 甘草二兩炙 石膏半斤碎綿裹

藥煮取二升去滓溫服一升 即越婢湯加杏仁去薑棗 右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸

定喘湯振生方 治肺寒膈熱哮喘

麻黃 欬冬花 半夏 桑皮各三錢 蘇子二錢 杏仁一錢五分 白果二十一枚碎炒 黃芩 甘草各一錢

右以水煎徐徐服

鐵肺丸 治喘

欬冬花 知母 秦艽 百部去心 紫苑 貝母 阿膠 糯米炒各一兩 杏仁另研四兩

右為末將羊肺一具先以水濯洗看容得水多少即更添些煮杏仁令沸濾過灌入肺中鑿定以糯米

柑煮熱研爛成膏搜和前藥末杵數千下丸梧子大每服五十丸食前桑白皮煎湯下

清燥救肺湯 治肺鬱喘嘔

桑葉三錢經霜者石膏二錢半炒甘草一錢胡麻仁一錢炒研阿膠八分人參七分麥冬一錢二分杏仁七分尖炒黃

枇杷葉一片去毛蜜炙右九味以水一椀煎六分頻頻二三滾熱服

小青龍加石膏湯 越婢加半夏湯俱見按此二方為喘病之主方其餘衆方意不能

麻黃湯見傷寒資生腎氣丸 瀉白散錢乙黑錫丸俱見按黑錫丸鎮納元氣為治喘必備之藥當蓄在平府非一時所能驟合也

臟脹水腫

靈素

靈脹論黃帝問曰願聞脹之舍岐伯曰夫脹者皆在於臟腑之外四字總括明透排臟腑而郭胸脇脹皮膚故命

曰脹帝曰未解其意岐伯曰夫胸腹臟腑之郭也膻中者心主之宮城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送

也胃之五竅者閭里門戶也廉泉玉英者津液之道也故五臟六腑者各有畔界其病各有形狀榮氣循

脈衛氣逆為脈脹衛氣並脈循分為膚脹 水脹篇黃帝問於岐伯曰水與膚脹臃脹腸覃石瘕石水何

以別之岐伯答曰水始起也目窠上微腫如新臥起之狀其頸脈動時欬陰股間寒足脛腫腹乃大其水

已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也黃帝曰膚脹何以候之岐伯曰膚脹者寒氣客於皮膚之間鑿鑿然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹實而不起腹色不變此其候也臑脹何如岐伯曰腹脹身皆大大與膚脹等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如岐伯曰寒氣客於腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內著惡氣乃起瘕肉內生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也石瘕何如岐伯曰石瘕生於胞中寒氣客於子門子門閉塞氣不得通惡血當滯不瀉則留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下陰

陽別論云陰陽結邪多陰少陽曰石水少腹腫邪氣臟腑病形篇督脈微大爲石水起臍已下至小腹

垂垂然上至胃脘死不治

水爲有形之物故按之即起膚脹爲無形之氣故按之不起腸覃乃腸外惡氣所結故月事仍下石瘕乃胞中惡血所凝故月事不行各有定理也至石水則

在少腹之中水結不散之症若臑脹則非氣非水臑脹皮肉俱堅臑邪盛正衰難爲治矣

素腹中論黃帝問曰有病心腹滿旦食則不暮食此爲何病岐伯對曰名爲臑脹帝曰治之奈何岐伯曰治之以雞矢醴一劑知二劑已水熱穴論黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯對曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脈也故其本在腎其末在肺皆聚水也腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也故凡水病下爲跗腫大腹上爲喘呼不得臥者標本俱病氣厥論肺移寒於

胃爲涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裏漿水之病也 陰陽應象大論濁氣
在上則六腑脹

金匱

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脈自浮外證骨節疼痛惡風皮水其脈亦浮外證
跗腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗正水其脈沉遲外證自喘石水其脈自沉外證腹滿不
喘黃汗其脈沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿 脈浮而洪浮則爲風洪則爲氣風氣相

搏風強爲隱疹身體爲痒痒爲泄風久爲癰癰氣強則爲水難以俛仰風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡
風則虛此爲風水不惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此爲黃汗 寸口脈沉滑者中有水氣面目

腫大有熱名曰風水視人之目裏上微擁如蠶新臥起狀其頸脈動時時咳按其手足上陷而不起者風

水 太陽病脈浮而緊法當骨節疼痛反不疼身體反重而酸其人不渴汗出卽愈此爲風水惡寒者此

爲極虛發汗得之渴而不惡寒者此爲皮水身腫而冷狀如屬痹胸中窒不能食反聚痛暮躁不得眠此

爲黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此爲肺脹其狀如腫發汗卽愈然諸病此者渴而下利小便數者皆不

可發汗 裏水者一身面目黃腫其脈沉小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也越婢

加白朮湯主之 少陰脈緊而沉緊則爲痛沉則爲水小便卽難脈得諸沉當責有水身體腫重水病脈
出者死 夫水病人目下有臥蠅面目鮮澤脈伏其人消渴病水腹大小便不利其脈沉絕者有水可下
之 問曰病下痢後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此法當病水若小便自利及汗出者自當
愈 心水者其身重而少氣不得臥煩而躁其人陰腫 肝水者其腹大不能自轉側脇下腹痛時時津
液微生小便續通 肺水者其身腫小便難時時鴨溇 脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣
小便難 腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦師曰諸有水者腰以下
腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈 師曰寸口脈沉而遲沉則爲水遲則爲寒寒水相搏跌陽脈伏
水穀不化脾氣衰則驚漇胃氣衰則身腫少陽脈卑少陰脈細男子則小便不利婦人則經水不通經爲
血血不利則爲水名血分 師曰寸口脈遲而濇遲則爲寒濇爲血不足跌陽脈微而遲微則爲氣遲則
爲寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛不利榮衛不利則腹滿脇鳴相逐氣轉膀胱榮衛俱勞陽
氣不通卽身冷陰氣不通卽骨疼陽前通則惡寒陰前通則瘳不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣
乃散實則失氣虛則遺溺名曰氣分

氣分非水病但此病無所附因血分而類及之也然金匱云氣分心下堅大如盤水飲所停則氣分似爲水在氣中之病

水分候 水分者言腎氣虛弱不能制水令水氣分散流布四肢故云水分但四肢皮膚虛腫蠱蠱而動者名水分也

燥水候 燥水謂水氣溢於皮膚因令腫滿以指畫肉上則隱隱成文字者名曰燥水也

水腫之病千頭萬緒雖在形體而實內連臟腑不但難愈即愈最易復病復即更難再愈所以內經針水病之穴多至百外而調養亦須百日反不若臌脹之證一愈可以不發治此證者非醫者能審定病症神而明之病者能隨時觀察

有心調攝鮮有獲全者

臌脹水腫方 此卷載水腫之方最備但病情不同各有所宜當細辨之

雞矢醴方 素問 治心腹滿旦食不暮食

雞矢 八合研炒焦 無灰酒三碗 右共煎乾至一半許用布濾取汁五更熱飲則腹鳴晨已時行三

次皆黑水也次日覺足面漸有縐紋又飲一次則漸縐至膝上而病愈矣

防己茯苓湯 金匱 皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢蠱蠱動者主之

防己 黃耆 桂枝 各三兩 甘草 二兩 茯苓 六兩 右五味以水六升煮取二升分溫三服

甘草麻黃湯 金匱 裏水主之

甘草 二兩 麻黃 四兩 右二味以水五升先煮麻黃去上沫納甘草煮取三升溫服一升重覆汗出

不汗再服懷風寒

麻黃附子湯金匱 水之為病其脈沉小屬少陰浮者為風無水虛脹者為氣水發其汗即已脈沉者宜麻

黃附子湯浮者宜杏子湯金匱注云杏子湯未見恐是麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃三兩 甘草二兩 附子一枚 右三味以水七升先煮麻黃去上沫納諸藥煮取二升半溫服八

分日三服發汗為治水要訣此乃發腎水之汗也

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯金匱 氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作此方主之

桂枝各二兩 芍藥各二兩 甘草二兩 大棗十二枚 麻黃細辛各二兩 附子一枚 右七味以水七升先煮

麻黃去上沫納諸藥煮取二升分溫三服當汗出如蟲行皮中即愈

枳朮湯金匱 心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作此方主之

枳實七枚 白朮二兩 右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中軟即散

蒲灰散金匱 治水便不利

蒲灰七分 滑石三分 右二味杵為散飲服方寸匕日三服

已椒藶黃圓金匱 腹滿口舌乾燥此腸間有水氣此方主之

防己

椒目

葶藶

大黃各一兩

右四味末之蜜丸如桐子大先食飲服一丸日三服

增口中有津液渴者加芒硝半兩

此治腸間之水外症不必有水象也

牡蠣澤瀉散

傷寒論

大病瘥後從腰以下有水氣者主之

牡蠣

熬澤瀉

括蕒根

蜀漆

洗去腥

葶藶

商陸根

海藻

洗去鹹

右七味異搗下

歸為散更入臼中治之白飲和服方寸匕小便利止後服日三

大腹水腫方

千金治氣息不通命在旦夕者

牛黃

二分椒目

三分昆布

海藻

牽牛子

桂心

各八分葶藶

右七味為末別搗葶

藶如膏合和丸如桐子飲服七丸日二稍加小便利為度正觀九年漢陽王患水醫所不治余處此方

日夜尿一二斗五六日即瘥

麻豆湯

千金治遍身腫小便澀者

麻黃

二升烏豆

一斗以水四斗桑根白皮

切五

右三味以豆汁納藥煮取六升一服一升日二服

三日令盡

豆不多不能取效

十水丸

千金

蘭臺軌範

卷五 臟脹水腫

五



南京中医药大学图书馆藏

第一之水先從面目腫過一身名曰青水其根在肝大戟主之 第二之水先從心腫名曰赤水其根在心葶藶主之 第三之水先從腹腫名曰黃水其根在脾甘遂主之 第四之水先從腳腫上氣而欬名曰白水其根在肺葶藶本主之 第五之水先從足趺腫名曰黑水其根在腎連翹主之 第六之水先從面至足腫名曰元水其根在胆芫花主之 第七之水先從四肢起腹滿大身盡腫名曰風水其根在胃澤漆主之 第八之水先四肢小腫其腹獨大名曰石水其根在膀胱桑根白皮主之 第九之水先從小腸滿名曰暴水其根在小腸巴豆主之 第十之水乍盛乍虛乍來乍去名曰氣水其根在大腸赤小豆主之 右十病藥皆等分與病狀同者則倍之白蜜和先食服一丸如小豆日三欲下病者服三丸弱者當以意節之

十水之名病源亦詳載其狀今立此方想當時本有此分別也姑存之

舟車神祐方

河間

治水腫水脹形氣俱實者

黑牽牛

四兩

大黃

二兩

酒浸甘遂

一兩

麴橘紅

大戟

麴

芫花

麴

青皮

炒各一兩

木香

五錢

檳榔

五錢

輕粉

一錢

右爲末水丸每服五分五更滾水下大便利三次爲度若一二次不通利次日漸加至一錢若服後大便利四五次或形氣不支則減其服三分二分俱可或隔一二三日服一次以愈爲度

甚者忌鹽醬百日

大聖濟川丸方

大黃 牽牛

郁李仁各一兩 木香

芒硝各三錢 甘遂半錢

右爲末蜜丸桐子大該入虛實

服之此下水之鹹劑

木香散方類 治單腹脹

木香 青皮 白朮

薑黃

豆蔻各半兩 阿魏

寧澄茄各一兩

右爲末醋丸如豆大

每服二十丸薑湯送下

葶藶丸外臺 治水腫及腳并虛腫

葶藶子半兩 牽牛子半兩生熟各半

澤漆葉

海藻洗去鹽炙 昆布如上炙

桑根白皮炙 甘遂熬

椒目

郁李仁各三分 桂心一分

右爲末蜜丸桐子大一服十五丸日再加至二十丸

療水病洪腫氣脹不消食方外臺

香薷納釜中以水淹之出香薷上數寸煮濃汁去滓煎令可丸桐子大服五丸日三小便多爲度又法丸法

療患氣兼水身面腫垂死方外臺

桑白皮 茯苓 郁李仁各四兩 橘皮二兩 海藻三兩 赤小豆一升

右六味以水八升煮二升



半分三服

五香散局

升降諸氣宣利三焦疏導壅滯發散邪熱治陰陽之氣鬱結不清諸熱蘊毒腫痛結核中脫

不快心腹脹滿

木香

丁香

沉香

乳香

麝香

等分

右爲粗末每服三錢水一盞半煎八分去滓

食後溫服

此方治氣分亦宜

五皮散局

治風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急兼治皮水妊娠

胎水

五加皮

地骨皮

生薑皮

大腹皮

茯苓

等分

右五味每三錢水煎熱服一方加

白朮磨沉香木香

治蠱脹方

雜抄方

大麥粉

五錢

敷藥方

治腹滿堅硬如石陰囊腫大先用甘草嚼後用此

大戟

芫花

甘遂

海藻

各等分

右爲末用酒調

麵和覆貼腫處仍以輭綿裹住

沉香琥珀丸

治水腫一切急難症小便不通



琥珀

杏仁

紫蘇

赤茯苓

澤瀉各五錢

葶藶

郁李仁去皮尖

沉香各一兩半

防己各七錢半

右爲末蜜丸如梧子大以麝香爲衣每服二十五丸加至五十丸空心人參湯送下量

虛實加減之

調榮飲 治瘀血流滯血化爲水四肢浮腫皮血赤紋名血分

蓬朮

川芎

當歸

元胡索

檳榔

陳皮

赤芍

桑皮炒

大腹皮

赤茯苓

葶藶

瞿麥各一錢

大黃五分細辛

官桂

甘草各五分

右以薑棗水煎服分

之痢金匱有病無方此爲至當

烏鯉魚湯類方

治水氣四肢浮腫

烏鯉魚

赤小豆

桑皮

白朮

陳皮各三錢葱白五根

右以水三碗同煮不可入鹽

先喫魚後服藥不拘時

小胃丹

芫花

醋炒過一宿瓦器內不住手攪炒令黑不可煮一兩半

甘遂麝裏長流水浸半

大黃紙裏煨勿令焦焙乾切以酒浸炒熟焙乾一兩半

大戟長流水浸

一匙再用水洗曬乾五錢黃柏三兩

右爲末以白朮膏丸如蘿蔔子大臨臥津液吞下或白湯下取膈上濕痰

