

瘍醫大全目錄

卷二十三

後陰部

鵝口疽門主論

尾閭發門主論

鬻癰門主論

附方

瘰癧瘡門主論

附方

痔瘡門主論

附方

痔漏門主論

附方



湯醫大全
臟毒門主論 附方

腸風門主論 附方

寒火瘡門主論

脫肛門主論 附方

臟頭風門主論 附方

風疳門主論 附方

股陽疽門主論

股陰疽門主論

騎馬癰門主論 附方



坐馬癱門主論

上馬癱門主論

下馬癱門主論

涌泉疽門主論

穿襠疽門主論

懸癰門主論

附方



瘍醫大全卷二十三

燕湖顧世澄練江氏纂輯

後陰部

自尾閭穀道起至臀股止一切痔漏瘡疽皆彙於此部中以便檢閱叅治

增錢之栢東陽
男 槐燮用和



鵠口疽門主論

靈樞曰發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治

三十日死矣

鬼遺方云涌泉疽腫起發太陰

太陰尻尾前是也

如伏鼠

十日不穴死十日可刺發清膿赤黑者死白色可

治

陳實功曰此乃三陰虧損督脉之經濁氣濕痰流結

而成其患發在尾間之穴高骨尖上初起形似魚

胞久則突如鵠嘴朝寒暮熱日輕夜重潰後稀膿



此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertong

出而無禁又或鮮血出而不伴凡發此者壯手

可老者可危

正宗

汪省之曰初起滋陰除濕已成和氣養榮已潰滋

保元久而成漏宜琥珀蠟礬丸先天大造丸兼服

理例

曰鶴口疽老弱難斂易於成漏





南京中医药大学图书馆版权所有



尾閭發門主論

王肯堂曰尾閭發生於尾閭穴乃督脉所主最痛難

忍更難得膿


準繩

又曰病蝕生尾腠骨處結毒如桃李之大紅赤痲痛不能行動

申斗垣曰得之奔走勞傷或久坐血凝氣滯者易治得之酒色過度忍精強戰督脉虧損者破必成漏

難以收功

啟玄



醫癰門主論

王肯堂曰腫高根淺爲醫癰腫平根深爲醫疽疽屬足太陽膀胱經濕熱所致

準繩

薛立齋曰醫乃膀胱經部分也居小腹之後此陰中之陰其道遠其位僻雖太陽多血氣運難及血氣罕到中年後尤慮此患治者毋傷脾胃毋損氣血但當固根本爲主

陳實功曰醫癰生於小腹之後位遠僻與氣亦罕到血亦少來凡生此者濕熱流結凝滯而成此症必



須托毒外發庶不內攻初起毒從五臟蘊積者憲
必有頭紅腫墜重如石內必口乾發熱治當通利
積熱外以膏貼金黃散敷四圍拔出瘀膿血內兼
補托自愈若誤用敗毒寒劑外敷涼藥冰凝氣血
毒氣不得外泄反致內攻如瘡頭軟陷無膿根鄰
平散不痛口乾煩躁譫語痰喘氣僇恍惚不寧者
俱爲不治但此症多從毒積五臟自內至表者十
有八九風寒暑熱自外至裏者百中一二倘旣出
而復入裏者終爲死候

正宗

申斗垣曰癰疽乃太陽膀胱經多血少氣生於承扶穴最痛宜托之生於實處者易治近大小便處者

難治

啓玄

馮魯瞻曰癰發於髀乃膀胱之濕毒蒸熱或稟賦陰

虛此地最難高聳潰膿大宜托裏爲要

錦囊

朱丹溪曰髀癰生於髀上膀下近大腿處由濕熱相

侵氣血凝聚鬱毒而成形如大盤腫潤盈尺上覆

其腰下遮其膀此爲陰中之陰務須宣熱拔毒大

補氣血培養腎胃滋補根源如此庶血易聚而膿

易作毒易出而熱可宜不然經年累月腫仍如故
疼痛日深是以中年之後猶慮患此一見虛弱便
與滋補可保終吉若妄以清涼敗毒內服外敷則
氣血得寒益凝多致不救

醫癰門主方

醫癰

五灰龍草連根搗汁酒攪服日進四五次膿從大
便出未成者立消已成膿者以搗敷上立消

洗醫癰潰後並治股瘡



中國醫藥大學圖書館藏

苦參

金銀花

白芷

當歸

黑皮硝 各等分

絹包砂銚內煎濃汁先薰後洗

消癰癰

金銀花 四兩

甘草節 一兩

煨膏每日空心 and 酒服

揅留煎湯薰洗



坐板瘡

燕示吉曰坐板瘡

其香史財補六

手海潤開文因

梁火吸五味

刺實如日

坐板瘡門主



瘰癧瘡門主論

陳實功曰瘰癧瘡者俗名坐板瘡生於兩股密如撒
粟尖如芒刺癢痛非常渾身毛刺此因熱體見風
毛竅所閉或因患瘡濕熱流結於此洗用苦參湯
甚者皮損粘衣治以鵝黃散主之

正宗

蔣示吉曰坐板瘡有因久坐卑濕之地或坐烈日石
上釀成濕熱皆能致之

說約

中斗垣曰此乃脾經濕熱濕毒鬱久而成最痛最癢
况股乃至陰之所血亦罕來藥力少至當用外治