

卷十二

夏熱門

病熱 症治歌

濕溫

卷十三

瘟疫門

瘟疫 症治歌

癘風

大癘風

羊毛疔

破傷風

卷十四

痢門

瘟疫 毒

附五絕 自縊 墮壓 溺死

癘鬼

暴死 中諸毒

金匱啟鑰

夏熱門

病熱論

冬傷於寒。夏必病熱。則是熱病與春溫對時。而非夏時所感之熱。乃
先年所伏之寒也。彼冬傷於寒。發於春爲溫病。發於夏爲熱病。何彼
發於春。此發於夏也。蓋以所感之氣輕重不同。而人之強弱亦異。所
以觸發亦異。有因飢飽力役者。有因房室勞傷者。故春時雖行風木
之令。使氣血不致大虧。感觸亦有先後。不卽發熱也。至夏則陽氣盡

漉江黃朝坊妙山輯著

洩而火司令正屬濕土寄生爾時之邪尙肯伏乎故其發源自少陰
由出之途自陽明溫病由出之途自少陽雖所合之經不一要不離
乎陽明少陽者各因時令之氣也但爲日旣遲則熱愈熾仲景所以
用白虎湯升胃熱蕩腎伏此先賢之論治夏熱病概如此予讀書至
此不能無疑蓋熱病卽冬寒之伏也及時而發則曰傷寒有三陰三
陽之分發於春則曰溫病有冬傷於寒冬不藏精之兩條率發於夏
豈僅有清涼之條乎况云源發少陰且云觸發有異有因飢飽力役
有因房室勞傷則因房室者概以白虎未必無害予恐先賢亦有遺
議越一年甲辰夏至後有患熱病者切其脈沉靜無力知其屬陰証

后案卽此以觀。則熱病亦有用桂附之証。假此病予讀熱病書時。而不疑於心。臨証不細察其脈。乃執以治熱病法施之。未必不致於害。誌此。或亦可補前賢所論之未及耳。

証治歌

熱病莫將暑証看。熱無面垢口牙乾。一身鬱熱有休止。或有微寒脛獨寒。沉細浮遲非熱脈。陰証無庸作陽觀。二香白虎必生變。眞武右歸自解寬。浮大長洪陽病脈。人參白虎穩如磐。脈浮而緊按洪大。又

霄夏時寒暴干。慄

白香

鼓湯先薑減半。人參白虎后投安。醫人熱病

亦開鍵不外陰陽分兩端

脈

浮大洪長爲陽病爲熱証。沉細遲弱爲陰病爲寒証。脈浮而緊。按之洪大者。夏日暴寒之。干脈沉有力而遲。重按附骨者。冬傷於寒之候。

方歌

右歸飲 此益火之劑也。凡命門之陽衰陰盛者。此方加減主之。

右歸飲內地黄熟。枸杞杜仲肉桂附片山茱肉。淮朮炙草水煎。

當陽衰陰盛此方錄。

慈致湯

人參白虎湯

真武湯

均見太陽

一人夏至后潮熱頭痛。每日自午飯前發。至次日早飯後稍退。退時有汗。小便黃。大便緊。切其脈沉靜無力。知其屬陰証。以理陰煎加桂附畧鬆。次日脈浮大無力。予仍以理陰煎止用肉桂。并開當歸補血湯。予歸越數日。反見口燥。舌黑。有刺。是熟地之故也。小便赤。大便閉。已七八日矣。証似白虎湯。大柴胡湯。舉家惶惶。診其脈浮緩無力。飯後復細按之。脈仍浮空。顯是火不歸原。非重用桂附。莫能引火。細問脚下冷否。伊云脚脛下微冷。旋進大劑右歸飲。上桂用二錢。附子用八錢。人參一錢。進數劑。頭痛

除熱亦減服至十餘劑大便始解舌亦潤反見稍惡寒作嘔知其假熱方退而真寒始見又以大劑附子理中湯並進六味回陽飲加上桂北味而附片與熟地並重各用八錢每日各服一劑熱方盡退舌黑亦退後用原葯但減附片愈後算用附片六十餘兩熟地五觔有零上桂亦四兩餘。

一人五月盡發熱口燥有汗脈洪長微有力汗多精神因減需用人參白虎湯家貧難以辦參以當歸補血湯合白虎湯一劑後鬆三劑全愈。

一人患熱病素有吐血証體屬陰虧吐血若專用白虎恐新疾愈。

八仙長壽丹除丹皮服二十餘劑舊病從此未發。

一人六月間。僅頭昏痛。醫以柴葛解肌湯二劑。致惡寒發熱。又以導赤散加黃連。寒熱如故。而胸前痛。右邊亦痛甚。不能轉側。予診其脈。沉細微數而無力。知其屬陰証也。而右脇痛甚者。金受火尅。正直休囚。葯加攻伐。致苦痛難忍。以補中益氣湯加北味。阿膠。淮葯。薑附。一劑痛愈。每日下午先寒後熱。以真武湯四劑。寒減。將除熱則稍微。後以六神散加薑附。右歸飲。每日各服一劑。漸服漸鬆。一月全愈。

系圖層錯

卷之三

一

本主向
中長夏也
自夏至
方有
濕症

濕氣自春分以後與地氣上升而動矣。人先傷於濕。又中暑。名曰濕。
溫。蓋濕病緩而暑速。其証胸滿頭目痛。妄言多汗。而脛逆冷。而臂不
冷。有不同於陰病厥逆而臂皆冷也。夫濕得暑邪。遏抑陽氣。故脛冷
而腹滿。暑挾濕邪。鬱蒸爲熱。故頭痛。妄言多汗。其脈陽濡而陰弱。浮
爲陽沉爲陰。濡脈見於陽部。濕搏暑也。小急見於陰部。暑搏濕也。然
濕傷血則必小急。暑傷氣則必濡弱。揔不可以發汗。汗之名重。治宜
白虎加蒼朮湯。如有寒熱外邪。加辛涼一二味。此治濕溫之大法也。

証治歌

濕甚一身苦痛。嗟前陰不利。便微瑕。后陰大便反來快。白虎茵陳香
薷正可加寒物。滯停溫合法。必須小便清。非穀古方大順。斷難少更
有。縮脾功可佳。小便不清。不可用五苓散。入效非賒。外邪發熱。表宜
散。白虎薄荷柴入嘉。足冷昏憒。兼腹滿。六脈皆小弱而急。先服陰病
藥。以貽誤。用五苓白虎而愈。
是古五苓白虎案。非誇猪苓十味香薷飲清燥湯。通保濕溫家
案。

脈

此脈陽濡陰弱。浮者爲陽。沉者爲陰。濡脈見於陽部。乃濕搏暑之候。
小急見於陰部。爲暑搏濕之診。而小急者。因濕傷血。濡弱者。因暑傷
氣。

大順散 治暑伏熱。引飲過多。脾胃受濕。水谷不分。清濁相干。

大順散中用杏仁。乾薑。肉桂。最溫純。更加甘草水煎服。燥濕散寒。妙絕倫。

縮脾飲 清暑氣。除煩渴。止吐瀉霍亂。及暑月酒食所傷。

縮脾飲內用烏梅。草薢。砂仁。乾葛。陪甘草。炙。芍。扁豆。炒。煩除渴。止自寬懷。

丁味香薷飲 治暑熱內傷。頭重吐利。身倦神昏。

十味香薷飲最良。陳皮。人參。白朮。厚朴。茯苓。甘草。草黃。芪。扁豆。香。

蕭木瓜皆藥合水煎待冷服之康

清燥湯

治肺金受濕熱之邪痿蹇喘促胸滿少食色白毛敗頭眩

體重身痛肢倦口渴便秘

清燥湯中

人參白朮茯苓黃芪升麻黃連黃柏神麴猪苓陳皮

五味甘

草澤泄地黃當歸柴胡麥冬濕熱堪除保肺金

白虎湯

五苓散

猪苓湯均見六經

附案

人惡寒發熱口渴小便少多汗神昏不省脈浮濡沉急用白虎五苓而愈後進清暑益氣湯除黃柏加熟地

瘟疫門

施江黃朝坊妙山輯著

周禮雖以逐疫。方相氏掌之。此聖人所以必朝服而致其誠敬。則瘟疫之由。自古有之。而避疫之法。度亦宜預防也。以故元旦汲清泉以飲。芳香之藥。上已採蘭草以襲。芳香之氣。古人重絳襪也。後漢仲景著傷寒論。欲明冬寒春溫夏秋暑熱之証。自不能併入疫病以混常法。然理已畢具於脈法中。叔和不細繹。究竟所指之疫。仍爲傷寒及濕暑熱之正病耳。夫四時不正之氣。感之者。因而致病。初不名疫。必

因病致死。病氣尸氣混合不正之氣。成病傳染同証。沿門闔境。人無得免者。斯爲疫也。此必大荒大兵之后有之。飢饉之年尤甚。老幼流離。道路相望。或趨鄉鎮。或集都城。羣萃仰食。賑濟者寡術。飢傷飽病死多。連日千百一塚。埋藏不深。掩蓋不厚。時至春和。地氣轉動。浮土塌陷。白骨暴露。血水汪洋。死氣尸氣。濁氣穢氣。隨地氣上升。混入上天清淨之氣。而天地生物之氣。亦變爲殺物之氣。無形無聲。從口鼻而入。直犯臟腑。正氣閉塞。邪氣充斥。頃刻立亡。治法原不同於傷寒之例。傷寒邪中外。廓一表卽散。疫邪行在中道。雖表之不能散。傷寒邪入胃府。則腹滿便秘。攻之卽愈。疫邪在三焦。散漫不收。下之復疑。

故治疫之方未有定法。幾成千萬年之苦海。惟西江陳嘉言先生以
通今博古之才。著開天闢地之論。掃叔和之穢。闡仲景之奧。論定生
慶。高出千古。直發明前人之所未及。發或清或下。隨証而施。則後之
治疫者。得以成法而可師。而後之病於疫者。亦不致有膏肓之嘆。其
進天札於仁壽也。不幾垂奕禩而不替哉。

附匡公經治疫証口訣

初起惡寒亦發熱。傷寒外証有相同。邪從鼻口竅中進。脈大散形四
至窮。四至不足也。辨防敗毒。棋榔草。莫入未痊可用達原工。前賢發度誠
難越。特患後人心口蒙。若舌白胎仍未解。達原須入大黃攻。不拘數
劑均宜用。見舌白胎黑潤中。導亦人參白虎合。亦投數劑自然鬆。汗
流戰慄是邪潰。不必張皇福履重。愈后地黃。湯或全大補。病虧培養
自豐隆。匡翁經驗親傳授。莫存疑信仍空懸。