

溫病全謨附
溫病
窮言

黃岩許璠圃著

溫病全謨序言

溫病治法。古無專書。傷寒論太陽篇雖列風溫溫病之名。而未詳方治。後人無所依據。大抵引內經熱病皆傷寒之類之文。與難經傷寒有五之說。以為宜與傷寒同治。歷晉隋唐宋千有餘年。一轍相承。不敢稍變。迨劉河間出。以為溫熱與傷寒治法不同。秋涼隔散天水散與桂苓甘露飲等方。由是溫病一門稍開途徑。其後王安道著傷寒回朔集。始言溫病不得混稱傷寒。發明脈症之異致。以為治法當先清裏熱而佐以疏表。惜乎調高和寡。繼起無人。陶節菴雖有溫病與傷寒異治之論。而立方則不外潔古九味羌活湯一劑之加減。喻嘉言則以溫病為伏少陰言之成理。甚為治法守。庶附細辛等辛溫散之範圍。下此者。周禹載移其病於足少陽。陸九芝移其病於足陽明。

舒馳遠移其病於足太陰。秦皇^七則指為南方之病。雖各有片面之理由。猶
之扣槃捫蝨。不能無誤。惟葉天士力闢蚕叢。自成機杼。尚擇溫病與
傷寒異治之旨。以辛涼解表之法。力矯辛溫散之非。而薛生白及
陳平伯等繼之。各有發明。一時醫風為之丕變。其後吳鞠通私淑
葉氏。潛心探討。採取諸家之說。成溫病條辨乙書。於是溫熱治法。
蔚然大備。然鞠通之著條辨。原欲比擬仲景之傷寒。仲景以三
立論。鞠通以三焦名篇。處^三欲與仲景望衡對宇。其神以理法。渣
滓未消。故往傳會巧辨。而不自知其^也。相傳鞠通條辨成書時。求
正於金^指。章虛谷^達。虛谷為之鉤抉疑誤。
者數十事。鞠通不及更正。因而告歎者累日。後此醫家均奉^此為

枕中鴻寶未聞有駁正其誤者近始於瑤圃許翁之溫病全謨見之
瑤圃諱耀光為^{清江先生}名諸生壯年棄帖括究岐黃遂工活人之術與
夢神交者有年矣庚辰之秋夢^{診疾於}於^{東山周}其家與許翁^相一見
如舊相識翁蒼顏白髮貌清癯而聲^{清言}稱^{清言}清寒^{清言}暄甫畢以手編袖
裏方函卷相示云其家尚有溫病條辨^辨之件不意未及借閱而俞
年遽歸道山今夏復至^{東山}友人郎同福出溫病全謨謂夢曰此瑤
圃晚^年之書即溫病條辨^辨改編者其^謬留之際^謬夢^謬以是書尚
未刊布為憾且囑予請兄序之夢受而反覆披瀝見其就^通通
之書刪其誤而補其遺以風溫暑邪溫濕秋燥等門集成專卷而
以上中下三焦分之又復補列春溫瘟疫瘧毒冬溫各門詳其方治至

於寒濕痢症等證。均為難病。鞠通錄之者。其涉及於溫。惟恐其未
備也。許翁劑之者。以非溫熱本病。恐其誤也。此亦可見。是書界限
之嚴矣。其補正條辨之處。均確中肯綮。鞠通地下有知。應時知已。未
知虛谷當日之所鈎抉者。即許翁之所補正者。否耶。然不可得而知矣。
中華民國三十一年歲次癸未九月三日黃巖陳夢序於塵夢治療所

溫病全謨

耀光許瑤圃輯

凡例

一溫病條辨大都葉天士方法。陳平伯薛生白輩
不逮也。惜有是有否。存其是而去其否。乃成全
璧。

一首條尺膚熱三字。經言內傷前註已明削去。
一首條改桂枝湯辛溫為辛平微涼二法。庶不害事。
一白虎是陽明法。不得列于太陰。一概移列中焦。

一凡無閑緊要方法。一概從刪。免生煩擾。

一寒濕法見雜症門。與茲不類。悉刪去。

一瘡痢痘痺亦詳雜症內。不錄。惟瘡二方難割愛。

附溫瘡下。

一下附溫瘡秋燥春溫瘟疫瘟毒冬溫六種。以還
九條例。

一風溫係外感溫病。四時皆有。可通稱春溫。溫熱
冬溫。而實春有伏氣春溫。冬有少陰冬溫。故另

補下。

一 瘟疫瘟毒。雖采其要。大法已備。而春溫冬溫亦

簡而賅。

一 銀翹後之辛平微涼。最為要法。不得不補。

一 益胃清燥。護胃承氣。無非從增液。加減不錄。

一 下焦暑溫。伏暑中劑。去椒梅湯。以不足為法也。

一 春溫冬溫。瘟疫瘟毒。鞠通漫無分別。故分門補

列。

一大頭瘟法。采入瘟毒內。從其類也。

一猪膚湯本治伏氣。采入伏氣黃芩湯下。

一感冒一方。補列秋燥下。以燥為次涼。從其類也。

一疫方或入瘟毒。以疫盛成毒本同法。惟大頭瘟

一等不同。

一條下原註善者錄之。有所更易。不足取也。

一所更註解。在定治病大體。有所不明。合觀原註。

一疑難處力為剖明。議定着眼何處。最為要着。

一春溫瘟毒冬溫悉準古法。獨瘟疫詆達原敗毒而立加減通聖。本生平心得耳。

一溫病傳手不傳足。祇在上焦。病勢逆而變重。必由手太陰傳入手厥陰。最重則傳入少陰者不治。若傳中焦陽明。下焦肝腎。與傷寒同。皆足經矣。故曰順傳。惟上焦手太陰厥陰少陰之內傳。是由表入裡。由氣入血。病急而難治。傷寒所無也。故曰逆傳。不得從傷寒六經例。不得不分別。

三焦。

一或刪或補。殫生平識見所及其。是其否。俟有道
教正之。

溫病全謨目錄

風溫 是外感溫病

上焦 手太陰
中焦 陽明
下焦 肝腎

暑邪

上焦 改稱暑邪
中焦 暑溫伏暑
下焦 暑溫伏暑

濕溫

上焦
中焦
下焦

溫瘧



秋燥

春補列四種

春溫

即伏氣

瘟疫

瘟疫

冬溫

春溫
冬溫
病
勿
言

原书缺页

方用銀翹。芦竹。此經所謂風淫于內。治以辛涼。
佐以苦甘法也。無表勢不可用此。無熱象不可
用此。即頭不痛。不惡寒。必喜衣被。喜煖怕涼。身
不大熱。口似渴。喜熱飲。不喜涼飲。或汗不出。即
出無多。或兼咳嗽。知在手太陰。法當用此辛
而兼涼。若大熱大汗大渴。而無頭痛惡寒症。邪
歸中焦陽明。法在白虎。不可用辛。以白虎是陽
明清法。仲景定例也。無所謂辛也。故以白虎法。

移列中焦首。以非手太陰法。不得列上焦也。若
頭微痛。微惡寒。身熱口渴。自汗。尚難決為溫病
者。不如用章虛谷辛平方。不溫不涼。溫病可解。
風寒亦可解。倘只有微熱。料其為溫。不敢過涼
者。不如用雷少逸辛而微涼方。以薄荷等皆微
涼也。補列二方。萬無一失。

辛涼正治銀翹散方

分兩隨宜酌用

連翹、銀花、桔梗、生甘草、荊芥、薄荷、豆豉、牛蒡、竹

葉、芦根、胸膈悶加郁金、渴加花粉、項腫咽痛加
馬勃、元參、咳加杏仁、小便短加麥冬、知母、黃芩、
梔子、蚘去芥穗、豆豉、加白茅根、側柏炭、梔子炭、
章虛谷辛平方

薄荷、荆芥、紫蘇、杏仁、貝母、葱白、淡豆豉、
雷少逸辛而微涼方

薄荷、前胡、蟬退、豆豉、薑皮、牛蒡、
此外又有陳平伯韓善徵邵步青方。已足用不採。