

羣玉山房重校醫宗必讀卷之五

雲間李中梓士材父著

門人黃寅銀清伯父
姪孫李廷芳蘅伯父訂

傷寒

黃帝曰、熱病者、皆傷寒之類也。其死皆以六七日之間、其愈皆
 十日以上者、何也。冬寒之氣感而即病、各曰傷寒、不即病者、寒
 毒藏於肌膚、至春變為溫病、至夏變為暑病、
 岐伯對曰、巨陽者、諸陽之屬也。巨太也、太陽為六經之長、統
 其
 脈連於風府、故為諸陽主氣也。風府督脈穴、太陽經脈覆於人
 巔背之表、故主諸陽之氣、分人
 之傷於寒也、則為病熱、熱雖甚不死。寒邪束於肌表、則玄府閉
 寒散則熱退、其兩感於寒而病者、必不免於死、兩感者、陰陽俱
 故雖甚不死、其兩感於寒而病者、必不免於死、兩感者、陰陽俱
 太陽與少陰同病、則頭痛與口乾煩滿、陽明與太陰同病、則身
 熱譫言與腹滿不欲食、少陽與厥陽同病、則耳聾與襲縮而厥
 三陰三陽俱受病、水漿不傷寒一日、巨陽受之、故頭項痛、腰脊
 入昏、不知人、六日當死也。

傷寒

強、足太陽為三陽之表而脈連風府故傷寒者多從太陽始、二

日陽明受之陽明主肉其脈俠鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾

不得卧也胃不和則三日少陽受之少陽主膽其脈循脇絡於

耳故胸脇痛而耳聾邪傳少陽者三陽已盡將入太陽故為牛

屬少陽口苦咽乾脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱蓋三陽經

邪在陰則寒在陽則熱在半表半裏故寒熱俱見也

絡皆受其病而未入於藏者故可汗而已三陽為表屬府邪

曰太陰受之太陰脈布胃中絡於噎故腹滿而噎乾邪在三陽

則傳三陰自太陰始也仲景曰脈浮而緩手足自溫天於汗解

繫在太陰腹滿而吐食不下自利益甚腹自痛也五日少陰

受之少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴腎屬水而

故燥渴仲景曰少陰為六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於

病脈微細但欲寐也至厥陰而六經傳偏邪熱甚於陰分故煩滿

肝故煩滿而囊縮仲景曰厥陰為病氣上撞心中痛飢不欲

食食則吐蚘下之利不止按傷寒傳變先自三陽後入三陰

此常序也東垣曰太陽經病若渴者自入於本也名曰傳本

陽傳陽明者名巡經傳太陽傳少陽者名越經傳太陰傳少陰傳厥陰者名巡經
 者名表裏傳太陽傳太陰者名誤下傳太陰傳厥陰者名巡經
 得度傳陶節庵曰或自太陽始日傳一經六日至厥陰而愈
 者或不罷再傳者或間經傳者或傳二經而止者或始終只
 在一經者或越經而傳者或初入太陽不發熱便入少陰而成
 陰證者或真中陰經者有兩經或三經齊病不傳者為合病有
 一經先病未盡又過一經之傳者為併病有太陽陽明合病有
 太陽少陽合病有少陽陽明合病有三陽合病若三陽與三陰
 合病即三陰三陽五藏六府皆受病營衛不行五藏不通則死
 是兩感
 矣傳經已偏邪當漸解若過經而不解則深入於府府不解則
 深至一藏故五藏六府皆病邪盛於外則營衛不行氣竭於
 內則五藏不通所謂其死皆以六七日者如此
 寒傳足不傳手其說蓋出此篇而誕妄實甚夫人之氣血運行
 周身豈邪遇手經而有不入者哉寒之傷人必先皮毛皮毛者
 肺之合故外則寒邪鼻塞內則喘嗽短氣非傳肺乎舌胎昏亂
 非傳心與胞絡乎涕濁秘結非傳大腸乎膈閉非傳小腸乎痞
 滿上下不通非傳三焦乎且本文云五藏六府皆病豈手經不
 亦內乎然經言傳變不及手經者何也足之六經可其不兩感
 盡周身上下之脈絡而手經已在其內不必復言矣
 於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九
 日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故則思飲食十

一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而噤十二日厥陰病衰囊縱

少腹微下大氣皆去病日已矣所謂其愈皆十日以上者如此又有言傷寒以不服藥為中醫

者其說本於此不知經文為氣實者言也若正虛邪勝則帝曰死譬如人溺洪濤不為援手而聽其自渡全活者幾希矣

治之奈何岐伯曰治之各通其藏脉病日衰已矣其未滿三日

者可汗而已其滿三日者可泄而已各通者言各明經脉隨證施治也未滿三日其邪在

表汗之而愈滿三日者其邪在裏下之而愈然此特道其常耳

正理論云脉大浮數在表可汗脉實沉數在裏可下故曰數雖多有表證者必汗曰數雖少有裏證者必下第當以表裏為辨不可以日數拘也

愚按冬氣嚴寒萬類潛藏君子固密則不傷於寒固密者毋勞

爾形毋搖爾神形神並守偕行於閉蟄封藏之本者也一有不

謹而犯寒威則殺厲之毒乘於肌體冬月即發名正傷寒伏而

不發至春變溫至夏變熱變態不測殊可憂虞治之或差反掌

生殺自仲景以來名賢代起立言不患不詳患其多而惑也陶

節庵曰得其要領易於拾芥脈證與理而已求之多岐則支離
繁碎如涉海間津矣脈證者表裏陰陽虛實寒熱也理者知其
常通其變也多岐者蔓衍之方書也余有感於斯言約六法以
盡之曰汗吐下溫清補汗者治在表也而汗法有三一曰溫散
寒勝之時陰勝之藏陽氣不充則表不解雖身有大熱必用辛
溫一曰涼解炎熱熾盛表裏枯涸陰氣不營亦不能汗宜用辛
涼一曰平解病在陰陽之間既不可溫又不可涼但宜平用期
於解表而已吐者治其上也吐中有發散之意可去胸中之實
經曰在上者因而越之是也下者攻其裏也而下法有五痞滿
在氣燥實在血四證具者攻之宜峻也但見滿燥實者攻之稍
緩但見痞實者攻之更緩或行血畜或逐水停輕重緩急隨證
靈通也溫者溫其中也藏有寒邪不溫則死夫氣爲陽氣虛則

寒故溫卽是補又名救裏者以陽虛可危亟當救援也清者清其熱也有熱無結本非下證若不清之熱何由散下後餘邪亦宜清也補者救其虛也古人言之已詳今人畏而不用使傷寒犯虛者坐而待斃大可憾已如屢散而汗不解陰氣不能達也人知汗屬於陽升陽可以解表不知汗生於陰補陰可以發汗也又如內熱不解屢清而火不退陰不足也人知寒涼可以去熱不知壯水可以制火也又如正虛邪熾久而不痊補正則邪自除溫中則寒自散此必見衰微之陰脈者也傷寒論曰陰證得陽脈者生陽證得陰脈者死人皆奉其言未知繹其義夫正氣實者多見陽脈正氣虛者多見陰脈證之陽者假實也脈之陰者真虛也陳氏曰凡察陰證不論熱與不熱惟憑脈用藥至爲穩當不論浮沉大小但指下無力重按全無便是伏陰然則

沉小者人知爲陰脈不知浮大者亦有陰脈也是知傷寒雖具萬變虛實二字可以提綱正勝則愈邪勝則死正氣實者雖感大邪其病亦輕正氣虛者雖感微邪其病亦重氣實而病者攻之卽愈雖不服藥經盡卽安何足慮也所可慮者惟挾虛耳奈何庸淺之輩不察虛實但見發熱動手便攻虛而攻之無不死者且曰傷寒無補法謬之甚矣獨不觀仲景立三百九十七法而治虛寒者一百有奇垂一百一十三方而用人參桂附者八十有奇東垣丹溪節菴亦有補中益氣回陽返本溫經益元等湯未嘗不補也謂傷寒無補法可乎夫實者不藥可愈虛者非治弗痊能察其虛而補救者握傷寒之要矣何必求之多岐哉傷寒十六證傷寒者寒傷營血脈浮而緊頭痛發熱無汗惡寒傷風者風傷衛氣脈浮而緩頭痛發熱有汗惡風傷寒見

風者既傷於寒復感風邪惡寒不躁其脈浮緩 傷風見寒者

既傷於風復感寒邪惡風煩躁其脈浮緊 以上四證皆冬月即病者 溫病者

冬受寒邪來春乃發發熱頭疼不惡寒而渴脈浮數 溫瘧者

冬受寒邪復感春寒 風溫者冬受寒邪復感春風頭痛身熱

自汗身重喑嘿欲眠語言難出四肢不收尺寸俱浮 溫疫者

冬受寒邪復感春溫時行之氣 溫毒者冬受寒邪春令早熱

復感其邪 以上五證皆冬傷於寒而熱病者冬傷於寒至夏乃病發于春皆有溫之名也 熱病者冬傷於寒至夏乃

發頭疼身熱惡寒其脈洪盛 傷暑者暑語為邪自汗煩渴身

熱脈虛 傷濕者感受濕邪身重而痛自汗身不甚熱兩脰逆

冷四肢沉重胸腹滿悶 風濕者既受濕氣復感風邪肢體重

痛額汗脈浮 瘧者身熱足寒頭項強急面赤目赤口喙頭搖

角弓反張若先受風邪復感於寒無汗惡寒為剛瘧先受風邪

復感於濕惡風有汗爲柔痲

類傷寒五症一曰痰中脘停痰憎寒發熱自汗胸滿但頭不痛

項不强與傷寒異耳一曰食積胃中停食發熱頭痛但身不痛

氣口緊盛與傷寒異耳一曰虛煩氣血俱虛煩躁發熱但身不

痛頭不痛不惡寒不浮緊與傷寒異耳一曰脚氣足受寒濕頭

痛身熱肢節痛便閉嘔逆但脚痛或腫滿或枯細與傷寒異耳

一曰內癰脉浮數當發熱而惡寒若有痛處飲食如常畜積有

膿也胸中痛而欬脉數咽乾不渴濁唾腥臭肺癰也小腹重按

之痛便數如淋汗出惡寒身皮甲錯腹皮腫急脉滑而數腸癰

也胃脘痛手不可近胃脉細人迎盛者胃脘癰也以人迎盛而

誤認傷寒禁其飲食必死

表證發熱惡寒惡風頭痛身痛腰脊強目痛鼻乾不眠胸脇痛

耳聾寒熱嘔脈浮而大或緊或緩有汗脈浮緩無力表虛也無汗脈浮緊表實也

裏證不惡寒反惡熱掌心腋下汗出腹中鞭滿大便不通腹痛

腹鳴自利小便如常譫語潮熱咽乾口渴舌乾煩滿囊縮而厥

唇青舌卷脈沉細或沉實腹鳴自利不渴唇青舌卷無熱惡寒下利清穀身痛脈沉微裏虛也腹中

硬大便閉譫語潮熱腹中不惡寒反惡熱譫語掌心脇下有汗咽燥腹滿裏實也表裏俱見屬半表半裏表裏俱無不可

汗下小柴胡湯隨證加減

陰證身靜氣短少息目不了了鼻中呼不出吸不入水漿不入

二便不禁面如刀割色青黑或喜向壁卧閉目不欲見人鼻氣

自冷唇口不紅或白或青或紫手足冷指甲青紫小便白或淡

黃大便不實手按重無大熱若陰重者冷透手也陰毒者腎

本虛寒或傷冷物或感寒邪或汗吐下後變成陰毒頭痛腹中

絞痛眼睛痛身體倦怠而不甚熱四肢逆冷額上手背有冷汗

恍惚身痛、如被杖、虛汗不止、鄭聲嘔逆、六脈沉微、或尺衰寸盛、五日可治、六七日不可治。陰證似陽者、煩躁面赤、身熱咽痛、煩渴、脈浮、微手足冷、大便洩、小便清、昏沉多眠、又有身熱反欲得衣、口不渴、指甲黑、此陰盛於內、真陽失守也。

陽證、身動氣高而喘、目睛了了、呼吸能往能來、口鼻氣熱、面赤唇紅、口乾舌燥、譫語能飲涼水、身輕如常、小便赤、大便閉、手足溫、指甲紅。陽毒者、邪熱深重、失汗失下、或誤服熱藥、熱毒散漫、舌卷焦黑、鼻中如烟煤、咽喉痛甚、身面錦斑、狂言直走、踰垣上屋、登高而歌、弃衣而走、脈洪大滑促、五日可治、六七日不可

治。或昏噤、咬牙、見鬼神、吐膿血、藥入即吐。陽證似陰者、手足冷、大便閉、小便赤、煩悶、昏迷不眠、身寒卻不欲衣、口渴、指甲紅、脈沉滑、或四肢厥冷、

陰厥、脈沉弱、指甲青而冷、陽厥、脈沉滑、指甲紅而溫、此陽極於內、真陰失守也。

六經證治足太陽膀胱此經從頭頂貫腰脊故頭痛惡寒發熱
 脊強然風與寒常相因寒則傷營惡寒頭痛脉浮緊而無汗用
 麻黃湯開發腠理以散寒得汗而愈風則傷衛惡風頭痛脉浮
 緩而有汗用桂枝湯充塞腠理以散風止汗而愈若夫風寒兼
 受營衛俱傷用大青龍湯此三湯者冬月天寒腠密非辛温不
 能發散故宜用也若春温夏熱之證皆用羌活伸和湯辛涼解
 之傳至陽明則目痛鼻乾不眠以葛根湯升麻湯治之此經有
 在經在
府之別如目痛鼻乾徵惡寒身熱脉浮洪病在經也潮熱自汗
 譫語發渴大便閉揭去衣被手揚足擲發斑發黃狂亂惡熱脉
 沉數病在府也
 傳至少陽則寒熱而嘔胸脇痛口苦耳聾此為半表
 半裏之經表證多者小柴胡湯裏證急者大柴胡湯過此不已
 則傳陽明之府表證悉罷名為入裏惡熱譫語口燥咽乾不大
 便脉沉實如痞滿燥實四證皆具三焦俱傷宜大承氣湯但見

痞燥實三證邪在中焦宜調胃承氣湯不用枳樸恐傷上焦之
氣也但見痞實二證邪在上焦宜小承氣湯不用芒硝恐傷下
焦之血也小腹急大便黑小便不利如狂喜忘畜血證也宜桃
仁承氣湯傳至三陰四肢厥冷腸痛吐瀉口唾冷涎畏寒戰慄
面如刀割引衣踰臥脈見遲軟急宜溫之輕者理中湯重者四
逆湯或初病起不發熱便見寒證者名爲真中陰經亦以二湯
主之以上各經治法一見表證卽與汗之一見裏證卽與下之
一見虛寒卽與溫補但當以脈證爲據不可以日數爲拘也
可汗頭痛項強皮節腰背俱強身疼拘急惡寒發熱無汗脈浮
數或浮緊皆可汗若汗後不解仍發熱脈浮須再汗之
不可汗無表證者不可汗脈沉不可汗尺脈遲不可汗
脈微弱者雖惡寒不可汗咽中閉塞者不可汗諸動氣者

不可汗、淋家不可汗、亡血虛家不可汗、厥者不可汗、

汗家不可重汗、太陽與少陽併病、頭項強痛、或眩、胃心下痞、

不可汗、脈弦細、頭痛而熱、屬少陽、不可汗、昔范雲患傷寒時、武帝有九錫之命、

謂徐文伯曰、可速愈乎、文伯曰、甚易、但元氣不足、恐二年後不復起耳、雲曰、朝聞道夕死可矣、况二年乎、遂以蒸法取汗而愈、

後二年果卒、虛者其可輕汗或

可吐、病在膈上者可吐、汗下後虛煩懊懣者可吐、

不可吐、脈虛不可吐、厥逆者不可吐、膈上寒、乾嘔、宜溫、不宜吐、

可下、汗後不解、邪傳胃府可下、潮熱腹痛、脈實可下、陽明

多汗、譫語、有燥糞可下、潮熱手足腋下汗出、譫語者可下、

吐後腹滿可下、凡臍腹硬或痛不可按者可下、下後不解、

臍腹硬痛可再下、結胸脈不浮可下、少陰病下利清水、其

色青者、心下必痛、口乾者可下、太陽證熱結膀胱、小便不利、

小腹急結其人如狂者血畜也可下。陽明證其人喜忘大便
黑必有闕血可下。陽明無汗小便不利心中懊憹必發黃可下。
不可下表未解者不可下。腹脹可按而減者不可下。諸虛
者不可下。陽微者不可下。咽中閉塞者不可下。諸動氣
者不可下。脈弱者不可下。脈浮大者不可下。小便清白
者不可下。陽明病面赤心下雖鞭滿不可下。
用火法以火燒地布桃葉柏葉亦可設席置病人於上卽汗出。或
醋炒香附熱熨胸背卽汗。或置火於牀下。或艾炙。
用水法傷寒思飲水爲欲愈若不與則不愈若恣飲則水停宜
以新汲水少與之待再思再與。熱甚者以青布浸新汲水中
置病人胸前熱則易之甚者置病人於水中或浸手足或漱口
若表未解及陰證似陽者忌之。

發熱翁翁而熱者表也。羌活沖和湯蒸蒸而熱者裏也。輕者大柴胡湯重者承氣

湯半表半裏者表裏俱熱而輕於純在裏也。小柴胡湯至於三陰發

熱則有腹痛肢冷脈沉下利為異。四逆湯潮熱屬陽明一日一發

日晡而作陽明內實也大便鞭者。承氣湯表未罷者。小柴胡湯煩熱兼

渴者。竹葉石膏湯心煩不眠。酸棗仁湯煩而心悸。小建中湯煩而悶者。梔子豉湯熱

者。白虎湯寒者。附子湯

惡寒。不見風亦惡寒身發熱惡寒者陽也。羌活沖和湯無熱惡寒者

陰也。雖熱不欲去衣被下證悉具微惡寒者表未解也先解表而後攻裏

下後不解發熱而渴惡寒。白虎湯惡寒而嘔心下痞者。五苓散汗後

惡寒虛也。芍藥附子甘草湯背惡寒表未解也。葛根湯背惡寒而潮熱。柴胡

加桂口渴心煩背微惡寒。白虎加人參湯背惡寒潮熱腹滿。小承氣湯少陰

病口中和背惡寒。附子湯汗後不解反背惡寒者虛也。芍藥甘草附子湯