

煩躁

萬煩者擾擾而煩躁者憤躁之躁合而言之煩躁皆熱也析而分之煩陽也熱之輕者躁陰也熱之甚者難知集曰火入於肺煩也火入於腎躁也瘡疹煩躁須宜忌之若吐利厥逆腹脹喘促而煩躁者昏不知人譫妄狂擾而煩躁者謂之悶亂皆不治之證凡痘瘡出不快發不透靨不齊有煩躁者此有二證如面黃大便色黑煩躁喘渴或如狂或喜忘腹脹或痛此爲有瘀血在裏也宜當歸丸痘便或四順清涼飲發熱竝加桃仁泥紅花甚者桃仁承氣湯主之失血

犀磨汁飲之亦可若津液不足虛煩不得卧者活
酸棗仁湯此證多因脾胃氣虛或服尅伐之劑所致
但當調補中氣爲善

藹如肺熱而煩者坐卧不安審於何時若初發熱便

煩者此毒火內鬱人參白虎湯發熱加梔子仁主之

若瘡發見猶煩者此毒伏於內未盡出也消毒飲見

形奪命丹起發合而服之若瘡出盡又已起發猶煩

者此內熱也牛黃清心丸主之如腎熱而躁者必

曾自利輕則陳氏木香散瀉甚則陳氏異攻散見形

主之如揚手擲足欲去衣被者此熱甚於表也羌

如便血下黑糞而又睡不醒心為血之主睡不醒則

心之神昏矣玄參地黃湯

失血

加木通麥門冬若無

面黃屎黑如狂喜忘之證只大便不通煩躁腹脹者

此有燥屎也此却真狂譫妄以三黃丸四順清涼飲

俱發熱

三乙承氣湯當歸丸膽導法

俱便

看病輕重擇

而用之如偏執不可下之說以致陷伏而死者醫之

咎也

薛東垣云火入於心則煩入於腎則躁皆心

火為之蓋火旺則金燥水虧故心腎合而為躁宜用

梔子豆豉湯凡痘瘡盛作之時必令心火有所導引

苟或毒氣出而未盡遂生煩躁以生黑豆煎湯或生

乾薑炒各
參分

右水煎溫服兒大倍之

梔子豆豉湯

山梔肆箇

豆豉半兩

右水二盞先煮梔子一盞內豆豉煎至七分去滓

溫服得快吐即止

黃連解毒湯 治發瘰熱甚心煩不得眠

黃連

黃芩

黃檗

山梔各等分

右每服四錢水二鍾煎五分溫服 若瘰毒甚者

活湯主之瀉青丸去大黃加甘草 如神識昏迷反

覆顛倒者此熱甚於裏也導赤散 心牛黃清心丸合

而治之 吐利不食而煩躁者正氣虛也陳氏木香

散主之 如晝日煩躁夜則安靜者此陽盛於晝至

夜則陽氣退而安靜也人參白虎湯加梔子仁主之

如晝日明了夜則煩躁者此陽陷入於陰夜則陰

盛陰陽交爭故煩躁也四物湯加梔子仁主之

活人酸棗仁湯 治痘疹虛煩驚悸不得眠

酸棗仁 炒 甘草 炙 知母 炒

白茯苓 麥門冬 去心 川芎

人參

蟬蛻

白芍藥

木通

赤茯苓

甘草

紫草茸

右每服三四錢水煎

人參竹葉湯

治虛煩不得寐

或兼自汗

人參

竹葉

甘草

各貳錢

半夏

貳錢伍分

小麥

麥門冬

各壹錢伍分

右每服二三錢薑二片粳米一

撮水煎服

加青黛壹錢調入湯內服之

凡脉弦數內外熱

甚譫語者合小柴胡湯主之

若脉洪數內外熱

甚舌燥煩渴者合化癍湯主之

牛黃清心丸

黃連

伍錢生

黃芩

山梔仁

各叁錢

鬱金

貳錢

辰砂

壹錢半

牛黃

貳分半

共研細末臘雪調麪糊丸如黍米大每服七八丸

燈心湯送下

人參蟬蛻散

治小便不利痘瘡不發煩躁作渴咬

牙喘滿

譫妄

譫多言也。妄虛妄也。譫妄者，妄有聞見而語言無倫也。皆邪氣熾盛，正氣虛弱，神識不清之所致。夫言爲心聲，心熱則多言，睡中呢喃者，熱之微也；寤而語言差謬，熱則甚矣。亦有胃熱而譫語者，大便秘數日不更衣，方是。薛陳文宿先生云：痘紫色頂陷，心煩狂躁，氣喘妄語，或如見鬼神，內熱便秘者，宜用龍腦膏子豬尾膏，如無內熱，大便不實，不可輕服。竊謂前證多因初起熱盛之時，失於解利所致。亦有因痘毒未盡，有因胃經有熱，有因肺胃有熱，有因心脾有熱。

式無類
三
途
薑
一
乳
麝
米
一
蠟
水
煎
類

半夏
瀉
銓

小

麥門冬

人參

御製

甘澤各瘧

人參竹葉湯
白朮散
小兒驚風
四乘自來水

白芷 川芎 三 四 銓 水 煎 糊 丸 如 黍 米 大 每 服 七 八 丸

卷之四

木虱
赤芍
甘草

卷之五

白藥

十餘劑或云當先降火邪而後補元氣乃服芩連
硝之類汗吐不止而歿

初

初發熱便妄有所見聞妄言如見鬼狀此爲惡候蓋
毒攻於裏心志昏惑神識不清而然況小兒神氣怯
弱鬼魅易侵又厲鬼常乘疫氣而行乘人之虛而症
之故凡痘疹妄見妄聞妄言如見鬼者不可治也須
審發於何臟如目直視手尋衣領亂捻物此發於肝
爲亡魂悶亂喘促手插眉目鼻面此發於肺爲亡魄
上竄咬牙多叫哭驚悸或不能言此發於心爲喪神
困睡手足痠痿不思飲食此發於脾爲失意目無精

煩躁痘裂出血便血衄血尿黑痕亦詳見各證大凡
作渴發熱手足指冷或大便秘結者內有熱也切不可
禁其飲水觀張子和述水中兒事良可驗矣蓋熱
極故得水而生也 一小兒痘疹狂喘熱渴飲冷痰
涎不利先君用十六味清膈飲犀角地黃湯而痊

一小兒出痘發狂作渴飲冷此 焦熱熾也用黃連
解毒湯芹菜汁而止又用紫草

餅三日色黑倒靨用紫草散湯 止又用人參白朮散

血瘰 一小兒痘愈後時發一 兼喘發過面色黃白

手足並冷此脾胃虛弱也余 補中八珍二湯各三

安神丸

黃連

當歸身

麥門冬

白茯神

甘草

朱砂

龍腦

貳分

右為末湯浸蒸餅和獾豬心血搗勻丸如黍米大
每服十丸燈心湯下

梔子仁湯

煩躁譫語驚狂發癎

梔子仁

黃芩

石膏

各貳錢

知母

杏仁

各壹錢半

大青

柴胡

豆豉

赤芍藥

各壹錢

光畏明欲墜下而縮身此發於腎爲失志故曰真藏
見者不治 或發熱時無此證因大便秘結却有之
此內熱也先以宣風散發熱解利其熱後以導赤散
心送下牛黃清心丸驚或粉紅丸驚以鎮其神病已
者可治連作不已者勿治 如胃中有燥屎三五日
未更衣者宜滌腸解毒宜四順清涼飲三黃丸俱發熱
主之 如初發熱狂亂大便秘自調者五苓散加辰砂
主之大便秘者輕則三黃丸甚則承氣湯主之
如起發成漿欲靨之時忽然神昏譫語者此由瘡本
稠密精血外耗不能養神宜養血瀉火安神丸主之

驚搖

錢瘡疹搖由風火相勝也惟癰疹能作搖疹爲脾所生脾虛而肝旺乘之木來勝土熱氣相擊動於心神心喜爲熱神氣不安因搖成癰癰子爲心所生心生熱熱則生風風屬於肝二藏相搏風火相爭故發搖也治之當瀉心肝補其母枯萸湯主之

方見驚

海藏

云諸痛癢瘡皆屬於心火無論虛實皆從心火上說脾虛則肝乘之肝與心火相合故用枯萸湯若脾土實火旺逆乘而成癰者此實邪也便結者瀉青丸便軟者瀉青湯亦當以脉別之

翁經曰諸風掉眩皆

升麻 捌分

甘草 伍分

右水煎服

如昏不知人語言無倫者死經曰衣被不歛言語不
避親疎者神明之亂也故不可治 如初發熱便妄
有聞見狀如見鬼而恐怖者不治此證自始至終皆
不可有乃神志損喪軀殼徒存不過引日而已

黃連 半斤

熱狂亂大便自調者五苓散加辰砂

白芍藥 者輕用

甘草

各半

則承米

粳米

黃連

藥欲屬之

當歸

良神昏譫

麥門冬

安睡外不能養神宜養血瀉火安神

者亦屬於肝而治法專理脾土何也蓋由平日或吐或瀉脾土虛弱不能當肝木所尅此非肝木之本病也治法風須溫補脾土爲主而肝木自寧譬如土薄而上有大木不能乘載故無風而自動栽培者當厚填其土使根深本固而自無風邪之害也痘後有此證者亦由氣血虛極使然也必爲難治

瘡疹論挾

熱吐瀉不可投燥藥傷寒身熱不可投涼藥瘡疹發搐不可投驚藥此皆外同而內異蓋瘡疹出於心驚搐亦出於心也瘡疹本熱熱則動心此理之自然夫心火獨盛於上肺金受火尅而不能制伏肝木熱則

屬肝木然痘出之始雖有四藏心實主之心火熱盛肺金受尅不能制伏肝木熱則生風風火相搏神氣不安故發驚搐醫者當辨痘疹驚搐不可遽投涼心之藥苟不審而槩以驚藥治之則心寒而肌斂毒氣內陷痘何由而出也治法當平肝木利小便爲切要瀉肝則風去利小便則心熱退風熱既定則痘隨出而驚搐自愈矣然痘先驚者多吉痘後驚者多凶何也痘未出之先熱蘊於內故作驚搐痘出驚止而內無疑滯故吉痘出之後氣血虛弱復感風寒熱毒反滯又毋敢輕易發散清利故凶然有非痘證而慢驚