

丹溪金匱鈎玄

丹溪先生金匱鉤玄目錄

卷第一

中風

六鬱

癰

寒

傷寒

暑

注夏

暑風

濕

內傷

火

傷風

發斑

疹

溫病

瘧

咳嗽

痰

喘

哮

痢

禁口痢

泄瀉

脾泄

霍亂

乾霍亂

嘔吐

惡心

翻胃

傷食

痞

噯氣

吞酸

嘈雜

五疸

消渴泄瀉

水腫

鼓脹

自汗

盜汗

吃逆

頭風

頭痛

頭眩

眩暈

眉痛

耳聾

卷第二

心痛

腰疼

脇痛

腹痛

痛風

勞瘵

咳血

嘔血

咯血

衄血

溺血

下血

腸風

夢遺

精滑

濁

淋

小便不通

關格

小便不禁

癰

健忘

怔忡

驚悸

瘰

血塊

吐蟲

癥瘕

疔

腳氣

痿

發熱

陽虛惡寒

手心熱

手淋

手木

厥

面寒面熱

喉痺

纏喉風

咽喉生瘡

口瘡

酒查鼻

肺癰

肺痿

天庖瘡

漏瘡

痔瘡

腸癰

結核

脫肛

卷第三

婦人科

經水

血崩

帶下赤白

白帶并痛風

子嗣

胎前

胎動

惡阻

求胎

安胎

胎漏

子腫

難產

催生方

產後

血暈

補虛

消血塊

泄

惡露不盡

中風

發熱惡寒

小兒科

吐瀉黃疸

急慢驚風

疳病

痘瘡

腹脹

夜啼

口糜

脫囊

脫肛

木舌

癰疹

咯紅

喫泥

痢疾食積

解顱

虬蟲

口噤

風痰

癰頭

赤瘤

鼻赤

中風

大率主血虛有痰以治痰為先或虛痰火與濕

有死血留滯者外中於風者亦有中氣者當從

痰治順氣化痰若口開手撒眼合遺尿吐沫而

視猴如鼯睡肉脫筋痛者皆不治

半身不遂大率多痰在左屬死血無血在右屬痰

有熱氣虛

丹溪先生金匱鈞玄目錄

金匱鈞玄

目錄

三

同

丹溪先生金匱鉤玄卷第一

門人戴元禮錄

新安吳勉學校正

中風

大率主血虛有痰以治痰爲先或虛挾火與濕亦有死血留滯者外中於風者亦有中氣者當從痰治順氣化痰若口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡肉脫筋痛者皆不治

半身不遂大率多痰在左屬死血無血在右屬痰有熱氣虛

病若在左者四物湯等加桃仁紅花竹瀝薑汁在

右者二陳湯四君子等加竹瀝薑汁

痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆當吐

吐法輕用瓜蒂鰕汁皂角重用藜蘆半錢或三分
加麝香灌入鼻內或口內吐痰出一吐不已再
吐之亦有虛而不可吐者

氣虛卒倒參芪補之

氣虛有痰濃參湯合竹瀝薑汁

血虛宜四物湯俱用薑汁炒恐泥痰再加竹瀝薑
汁入內服能食者去竹瀝加荆瀝

又法以猪牙皂角白礬等分爲末薑湯調下名稱

涎散

血虛者。四物湯補之。

挾痰者。亦用薑汁竹瀝。

脉訣內言。諸不治證見。則不可治。筋枯者不治。舉

動則筋痛者。是筋枯。以其無血滋潤故也。

治痰氣實能食。用荆瀝。

氣虛少食。用竹瀝。

此二味。用開經絡行血氣。入四物湯中。必用薑

汁助之。

肥白人多濕。少用附子。烏頭行經。

初昏倒急。搯人中至醒。然後用去痰藥。二陳湯。四

物。四君子等湯。加減用。

六鬱

戴云鬱者結聚而不得發越也。當升者不得升。當降者不得降。當變化者不得變化也。此爲傳化失常。六鬱之病見矣。氣鬱者。胃脇痛。脉沉澁濕。鬱者。周身走痛。或關節痛。遇陰寒則發。脉沉細。痰鬱者。動則卽喘。寸口脉沉滑。熱鬱者。瞀小便赤。脉沉數。血鬱者。四肢無力。能食便紅。脉沉食鬱者。噯酸腹飽。不能食。人迎脉平和。氣口脉緊盛者。是也。

氣血中和。萬病不生。一有怫鬱。諸病生焉。

氣鬱

香附子

蒼朮

川芎

濕

蒼朮

川芎

白芷

痰

海石

香附

南星

瓜蒌

熱

青黛

香附

蒼朮

川芎

梔子

血

桃仁

紅花

青黛

川芎

香附

食

蒼朮

香附

鹹沙

醋炒

山查

神麴

炒

春加芎

夏加苦參

秋冬加吳茱萸

越鞠丸

解諸鬱

又名芎朮丸

蒼朮

香附

撫芎

神麴

梔子等分爲

末水丸如菉豆大

癰

凡鬱皆在中焦以蒼米撫芎開提其氣以升之假如食在氣上提其氣則食自降餘皆倣此

大風病是受得天地間殺物之氣古人謂之癘風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以通天散取惡物陳蟲於穀道中出取出雖有道路之異然皆不外乎陽明一經治此證者須知此意看其疥瘡與瘡上先見者上體多者在上自下先見者下體多者在下也上下同得者在上復

在下也。陽明胃經與大腸無物不受。此風之入人也。氣受之則在上多。血受之則在下多。血氣俱受之者。上下俱多也。自非醫者神手。病者鐵心。罕有免此。夫從上從下。以漸而來者。皆可治。人見其病勢之緩多。忽之。雖按法施治病已痊。可若不能忌口絕色。皆不免再發。發則終於不能救也。余曾治五人。中間惟一婦人不再發。以其貧甚而且寡。無物可喫也。餘四人三四年後皆再發。孫真人云。吾嘗治四五十人。終無一人免於死。非真人不能治。蓋無一人能守禁忌耳。此婦人本病藥外。又服百

餘貼加減四物湯半年之上。方得經行十分安愈。
治法 在上者醉仙散。在下者通天再造散。後用通
神散及三稜鍼於委中出血。但不能忌口。絕房者。
不治之也。

醉仙散

胡麻仁

牛蒡子

蔓荊子

枸杞子

各半兩
為粗末

同炒
紫色

白蒺藜

苦參

瓜蒌根

防風

各半兩

右八味為細末。每一兩半入輕粉三錢。拌勻。大
一錢。空心日午臨睡各一服。淡茶調下。五七日間。

必於齒縫中出臭涎水。渾身覺痛昏悶如醉。利下惡臭屎爲度量。大小虛實加減與之。證候重而急者。須以再造散下之。候補養得還。復與此藥。喫須斷鹽醬醋諸般魚肉椒料果子燒炙等物。止可淡粥及淡煮熟時菜食之。茄尚不可食。惟有烏梢蛇菜花蛇。可以淡酒煮熟食之。以時藥在。

再造散

鬱金

半兩
生用

大黃

一兩
飽

皂角刺

一兩黑者
大者

白牽牛

頭末六錢半炒半生用之

右爲末。五錢。臨夜冷酒調下。以淨桶伺候泄出蟲。

如蟲口黑色乃是多年蟲口如赤色是近者三數日又進一服直候無蟲卽絕根也

寒 主平溫散

有卒中天地之寒氣有口傷生冷之物

戴云此傷寒謂身受肅殺之氣口食冰水瓜果冷物之類病者必脉沉細手足冷息微身倦雖身熱亦不渴倦言語或遇熱病誤用此法輕者至重重者至死凡脉數者或飲水者或煩燥動搖者皆是熱病寒熱二證若水火也不可得而同治誤卽殺人學者慎之