

訂補明醫指掌卷之二

仁和雲洲皇甫中編輯

長洲念山邵從臾校正

男 繩山邵達叅補

真中風一

歌府中風邪顯六經面加五色表之形若還中藏多
便阻絕症臨之命必傾半身不遂喎斜口此是風
邪中仕經有表汗之須續命六經加減認教真須
知在裏洩便秘實者尤當三化行原無表裏秦芫
治大要清心靜養神

論經云風爲百病之長也善行而數變或爲寒中或

訂補明醫指掌卷之二

仁和雲洲皇甫中編輯

長洲念山邵從臾校正

男 繩山邵達叅補

真中風一

歌府中風邪顯六經面加五色表之形若還中藏多
便阻絕症臨之命必傾半身不遂喎斜口此是風
邪中仕經有表汗之須續命六經加減認教真須
知在裏洩便秘實者尤當三化行原無表裏秦芄
治大要清心靜養神

論經云風爲百病之長也善行而數變或爲寒中或

爲熱中或爲寒熱或爲偏枯或爲癘風皆爲風也
其變莫測然八方之風邪中人則有中府中藏中
經脈之分所以別其邪之淺深也中府者有表症
面加五色脈浮弦而惡風寒拘急不仁現六經形
証治宜汗之亦不可過汗損其衛氣中藏者內閉
九竅故昏緩失音鼻塞耳聾眼瞤大小便秘故可
下之亦不可過下損其榮血中經脈者外無六經
形症內無便溺阻隔故治之在經無表裏症不可
汗下宜靜勝其燥是養血也大秦羌湯其有癱痺
癱瘓偏枯痛痒頑麻中痰中氣似風而非風也故
另立類中風條以別之

脉中風浮吉滑兼痰氣其或沉滑勿以風治或浮或沉而微而虛扶元治痰風未可踈浮遲者吉急疾者殂

○中府

中府者廢肢節審其六經形症用加減續命湯初中先須理氣烏藥順氣散對星香散若兼中藏大便秘三化湯失音舌強大秦芫湯痰涎盛者希涎散竹瀝湯荆瀝湯

加減續命湯

麻黃去竹

人參去芦

黃芩去腐

川芎

右咬咀生薑三片水二盞煎至一盞通日服達按

芍藥酒炒

甘炒炙

杏仁去皮尖麩炒

防己去皮

桂枝淨炒

防風去芦各一小

附子

炮去皮
臍五分

古人以此方混治中風未詳其証蓋麻黃杏仁麻
黃湯也仲景以之治太陽症之傷寒桂枝芍藥桂
枝湯也仲景以之治太陽証之中風如此言之則
中風而有頭痛身熱脊强者皆在所必用也人參
甘炒四君子之二也局方用之以補氣芍藥川芎
四物湯之二也局方用之以養血如此言之則中
風而有氣虛血虛者皆在所必用也風淫末疾故
佐以防風濕淫腹疾故佐以防己陰淫寒疾故佐

以附子陽淫熱疾故佐以黃芩蓋疾不單來雜按而
而至故其用藥亦兼該也如治中風不審六經之
形症加減雖治與不治無異也宜以此湯隨症加
減治之如左

○如中風無汗惡寒 麻黃續命湯主之

依本方 麻黃 杏仁 防風各加一倍

宜針至陰出血 穴在足小指外側 崑崙舉蹻穴在

跟後跟骨針透太谿

如中風有汗惡風 桂枝續命湯主之

依本方 桂枝 芍藥 杏仁各加一倍

宜針風府 穴在頂後入髮一寸針入三分禁灸

已上二症皆太陽經中風也

○如中風有汗身熱不惡寒 白虎續命湯主之

依本方加石膏知母各二錢甘艸再加一倍

○如中風有汗身熱不惡風 葛根續命湯主之

依本方加葛根 桂枝 黃芩再加一倍

宜針陷谷 穴在足大指次指本節後陷中針八五分 去陽明之賊

兼刺厲兌 穴在足 瀉陽明之實

已上二症皆陽明經中風也

○如中風無汗身涼 附子續命湯主之

依本方 附子加一倍 乾薑加一倍

甘艸加二倍

宜針隱白

穴在足大指內爪甲角

去太陰之賊

此太陰經中風也

○如中風有汗無熱

桂附續命湯主之

依本方

桂枝

附子

甘草各加一倍

宜針太谿穴

在足內踝後跟骨上陷中斜透崑崙

此少陰經中風也

○如中風六經混淆繫之於少陽厥陰或肢節攣痛

或麻木不仁

宜羌活連翹續命湯主之

依本方如羌活連翹也

少陽之經絕骨

穴在外踝上三寸灸五壯

灸以引其熱

厥陰之井大敦

穴在足大指甲聚毛間

刺以通其經

烏藥順氣散

烏藥

陳皮 各二

麻黃 去節

川芎

枳殼

去穢炒

白芷

桔梗 各一

僵蠶

絲炒去

乾薑

炮五

甘草

炙三

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎溫服達按本方

以順氣名者蓋遍身麻痺表氣不順也故治以麻

黃川芎言語蹇澀裏氣不順也故治以烏藥陳皮

枳殼口眼歪斜面部之氣不順也故治以白芷僵

蠶喉中氣急甘炒可緩肺氣上逆桔梗可下痰之

爲物寒則結滯熱則流通佐以乾薑行其滯也此

治標之劑也然必邪實初病之人方可用

中風一身俱麻加人參白朮當歸川芎麥門冬○
久患左癱右瘓去麻黃加天麻防風羌活半夏
尾木香當歸○口眼喎斜加生薑○虛汗去麻黃
加黃芪○中風面目十指俱麻乃氣虛也補中桂
氣湯加木香香附羌活防風烏藥

對星香散

治中風體肥痰盛口不渴者此方主之

牛膽

南星

木香

右咬咀每服四錢生薑十片水一大盞煎七分溫

服按本方用南星燥痰之品也曰體肥曰痰甚

曰不渴則宜燥也可知矣故以南星主之而必人

牛膽者制其燥也佐以木香利痰氣也

星香湯南星此治中風有神

○中藏

中藏無別病大便秘者用三化湯老弱之人以滋潤湯代之若口開眼合撒手遺尿汗出如油搖頭直視面赤如裝聲如鼾睡脉急大實者皆不可治不省人事用通頂散或半夏末吹鼻中取嚏如無嚏者死疫涎盛用稀涎散或蝦汁吐之疫多有熱荆瀝湯

三化湯 治中藏者以此通其滯調以十全四物

大黃

枳實

厚朴

羌活

右咬咀等分每服一兩水煎服

滋潤湯

治風中在藏大便秘結

當歸

生地黃

枳殼去穢

厚朴去皮

檳榔

大黃

火麻仁

杏仁去皮

羌活

七分

紅花

各一分

石剉水煎空心溫服

通頂散

治病入初中風昏憤不省人事口噤不能

開者急用之

藜蘆

甘艸生

川芎

細辛

人參

各一分

石膏

五分

右爲末吹鼻中一字就提起頭頂心髮立甦有嚏

者可治無嚏者不可治

稀涎散

治風忽然如醉形體昏悶四肢不收涎

潮搐搦目吐涎便醒

明參

牛生半帖

皂角

匹條去黑皮炙

每服三錢溫水調灌風痰自出連按本方治中風
暴仆痰涎壅塞者蓋濁邪在上風盛氣壅而然也
經曰病發而不足標而本之先治其標後治其本
故不與疏風補虛而先吐其涎白礬之味鹹苦鹹
能軟堅苦能去濕皂角之味辛鹹辛能利竅鹹能
去汚名之曰稀涎固奪門之兵也師曰凡吐中風
之痰使咽喉疎通能進湯液便止若攻盡其痰則
無液以養筋反令人攣急偏枯此大戒也

荆瀝湯

方見類中風內

○中經脉

無表裏症口眼喎斜半身

也大秦羌湯汗吐下後

黃清心丸疫涎盛竹瀝湯

汗吐之血虛四物湯吞活絡丹

大秦羌湯 治中風手足不能運動舌強不能言風

邪散見不拘一經者此方主之

秦羌 去芦

石膏 各三兩 生用

甘炒

川芎

當歸 酒炒

羌活 去芦

獨活

防風

黃芩 酒炒

白芍藥 酒炒

白芷

白朮

生地黄 酒洗

熟地黄

白茯苓 去皮 各二兩

細辛 五不

每服一兩水煎陰雨濕勝時加生薑七片春夏加知母七分心下痞加枳實一錢煎服○按中風虛邪也許學士云留而不去其病則實故用驅風養血之劑以秦艽爲君者攻一身之風也以石膏爲臣者去胸中之火也羌活散太陽百節之風疼防風爲諸風藥中之軍卒三陽數變之風邪責之細辛三陰內淫之風濕責之苓朮去厥陰經之風則有川芎去陽明經之風則有白芷風熱干乎氣清以黃芩風熱干乎血涼以生地獨活療風濕在足少陰甘艸緩風邪上逆予肺用歸芍熟地者所以

養血于疎風之後一以濟風藥之燥一使手得

而能握足得血而能步也

牛黃清心丸 方見癰

竹瀝湯 方見類中風條下

瓜蒂散 方見疫症

四物湯 方見血症

注疼痛脚下鈞痛腿臂間忽一兩點痛並宜服之

南星炮

川烏炮

草烏炮

地龍 各六兩

沒藥 另研各三兩三不

乳香 各三兩三不

右爲末酒糊丸如梧子大每服二一九空心酒下

荊芥湯亦可



增補省風湯

治中風口眼喎僻痰涎壅盛者主之

半夏

一不薑製

防風

一不

全蝎

二不

去翅足

胆星

甘草炙

生白附

生川烏

木香

各五分不見火

活絡丹

治中風口眼喎斜半身不遂及諸風痺手足拳攣筋脉不舒皆風邪濕毒流滯經絡渾身走

以省風名者省減其風之謂也蓋風壅其痰于

面部則口眼喎僻塞于胸中則痰涎壅盛是方也

防風白附全蝎川烏可以活經絡之風痰而正口

眼膽星半夏甘草木香可以療胸次之風痰而開



北京中医药大学图书馆版权所有