

新刊西學集成

三



新刊醫學集成卷之三

後學 義鳥 傳滋 續註

○內傷第七

王節齋云東垣以飲食勞倦所傷為內傷不足之病謂因傷脾失其運化而致人病者皆謂之病。蓋脾為生者脾胃為本必賴飲食資養若調養失宜勞役過傷失其運化則脾胃氣虛不能升達降下陰分而為內熱非有飲食停積不化鬱發為熱用助中益氣等藥若飲食停積不化鬱發為熱乃是不足之中微之有餘此為飲食所傷宜消導之文或先因勞役而後傷於飲食或先傷於飲食而後犯房勞此皆不足之中兼之有餘須於數者之間審察明白可也

脉法

大而無力為內傷氣口大於人迎重者至二倍

三倍或右關損弱其則隱而不見惟內顯脾脉大數



微緩時一代者是

用溪云東垣內外傷辨甚詳

按東垣論人迎脈大於氣口為外傷氣口脈大於人

迎為內傷外傷則寒熱辨作而無間內傷則寒熱間作而不齊外傷惡寒雖近烈火不能除內傷惡寒得就溫暖則解外傷惡風乃不禁一切風寒內傷惡風惟惡夫寒少賊風外傷左頸在鼻鼻氣不利而壅或有力內傷者不熱內傷症顯在口故口不知味而腹中不和外傷無此外傷則邪氣有餘故發言壯厲而且尤輕而後重內傷則元氣不足故言懶怯且先重而後輕外傷手背無手心不熱內傷則手心熱手背不熱東垣辨法大要如此有內傷而無外感有外感而無內傷者以此辨之則別然東垣云若內傷外感兼病而相合者則其脈證必並見而難辨尤宜細必求之若顯內症多者則是內傷重而外感輕宜以補養為先若顯外症多者則外感重而內傷輕宜以發散為急此東垣未之及也因贅其畧學者詳之

世之病此者為多但有挾痰者有挾外邪者有熱鬱於

內而發者皆以補元氣為主看所而兼用藥如
痰者補中益氣加牛夏以薑汁竹瀝傳送氣虛熱甚
者少加附子以行參芪之功

內傷發班因胃氣虛甚是火遊行於外亦有痰者火則
補而降之痰熱則微汗以散之切不可下

內傷煩躁因血少不能潤理宜養陰煩躁不得眠者六
一散加牛黃似傷寒煩躁不絕聲汗後復熱脈細數
五七日不睡補中益氣倍人參用竹葉同煎甚者加
麥門冬五味知母似傷寒至五七日汗後煩躁吃水
者補中益氣加附子似傷寒三戰後勞乏煩躁昏倦

四君子加當歸黃芪知母麥門冬五味子甚香脉細
數無序三更後吃水至天明此乃元氣虛加竹瀝大
劑服之。有舌黑燥大便滑泄食在大腸煩燥夜不
安宜防風當歸飲子下之。內傷病退後燥渴不解
者有餘熱在肺參苓甘草少加薑汁冷服虛者用人
參湯

丹溪治一人因齋素飢寒作勞發熱惡寒醫與小訖胡
湯自汗神昏脉大如指似有力與人参黃芪熟附灸
甘草大劑服之一日汗小二日熱減能視聽加蒼朮
與二貼再得汗熱除乃云蒼朮作小劑服漸安。一



少年九月發熱頭疼妄語大渴一服與小訛胡十餘
貼熱愈甚予診視其形肥脈數大左甚以參朮為君
茯苓芍藥黃芪為佐附子一片為使與二貼不愈或
謂不當用附子予曰虛甚誤投寒藥而脈左大於右
事急矣若非附子參朮焉能有速効并一貼乃去附
子作大劑與五十貼大汗而愈。一少年因勞倦大
熱而渴恣飲泉水次日熱退言視謬妄腹脹轉則不
食戰掉脈瀦而大右為甚急灸氣海三十壯用白朮
黃芪各二錢附子五分與十貼不效又增發熱而渴
但少進稀粥予曰此氣欲利而血未應也於前方去



附子加川歸以和血有熱加人參一錢半與三十貼
安。一肥白人壯年因勞倦成病秋間大發熱已服
小其胡八貼矣。二手脉洪數而實觀其形色知其脉
本不實以厥涼藥所致因與溫補藥黃芪附子湯
飲三貼因心微汗而解脉亦稍軟繼以黃芪白朮湯
脉漸小而愈蓋肥人虛勞多氣虛也。一老人饑寒
作勞患頭疼惡寒骨節疼無汗妄語自服參蘘飲取
汗脉洪數而左甚此胃虛作勞陽明雖受寒氣不可
攻擊當大補其虛俟胃氣充實必自汗而解以參芪
歸朮陳皮炙甘草每貼加附子一八服五貼諸證悉

解但口乾熱未退乃去附子加芍藥漸思食汗出熱
退。一男子素嗜酒因感寒倦怠不思食半月後大
發熱惡寒遍身痛脉浮大按之豁然左為甚此極虛
受寒以人參為君散芪芍藥歸身為臣蒼朮陳皮通
草乳葛為佐大劑與之五貼大汗而愈

補中益氣湯 東垣

白朮

人參 上

黃芪

上勞倦熱甚者更加之

當歸

中

升麻

下

柴胡

下

甘草

炙中

陳皮

中

右劉永煎

一方雜著

治勞苦用力過多預服數貼防後發熱

黃芪

錢半 炙一分

甘草

七

五味

二十

人參

麥門冬



陳皮

白木各一錢

其者加附子四分

薑棗水煎

一方

治勞心思慮損傷精神頭眩目昏心虛氣短驚悸煩熱

人參

當歸

麥門冬

白芍藥

酸棗仁

茯神各一錢

五味

山柰

炒

生地

甘草

陳皮

川芎

薑水煎

當歸補血湯

治肌熱燥熱困渴引飲目赤面紅晝夜

不息脉洪大而虛重按全無經曰脉虛血虛又云血

虛發熱證象白虎惟脉不長實為異耳如誤服白虎

湯必死此病得之亂因勞役

黃芪

當歸酒洗

右剉作

貼水

二盞煎至

一盞去楂溫服心

○傷飲食第七

脈法

上部有脈下部無脈為食塞胃中宜吐之才口

洪大按之反澁人亦微而澁或寸口緊如轉索左右

無常或滑而數者下之或浮而滑凡脈沉病若傷寒

者宿酒宜下短疾而滑酒病滑而細傷飲氣口緊盛或

浮滑而疾皆傷飲食關沉而滑為食不消

丹溪云傷食必惡食氣口脈必緊盛胸膈必痞塞亦有

頭痛發熱者但身不痛經曰飲食自倍腸胃乃傷蓋傷之則運化遲滯故食而

飲而東垣云飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺病則咳滿水泄重為蓄積食者



物也有形之血氣因而飽食筋脈橫解腸胃為疴若
飲食停滯不化而發熱者氣口脈必緊盛或右關短
而滑也必惡食或噫氣作酸或惡聞食氣或欲吐不
吐或惡心或短氣痞塞或胃口作疼或下按之則痛
此皆食停之候如停食而又感寒者則入迎氣口俱
大也外證頭疼身寒拘急中脘痞悶或嘔吐或瀉者
宜霍香正氣散或人參養胃湯加香附砂仁之類若
因肉食如山查米麪加神曲麥芽生冷肉食果子之
類加草果砂仁枳實青皮傷酒食加葛根紫蘇砂仁
烏梅枳實若陷寒甚熱者用此二方若已發熱無汗
必須先解其外以十味芎蘇散汗之身體發熱無汗
者人參羌活湯加葛根白芍薑以汗之然後消其
食也如食在胃上未入於胃者可吐之如不可吐則
消導之消食下入胃變化消弱外証已解乃可下也
宜二物亭桂湯熱者人參胡湯加厚朴下之治訣
食傷寒不可先攻其食且先發散寒邪次與消導尤
宜先其所傷之物分其寒熱輕重而施治如初得上
部有脈下部無脈或人當吐不吐者死且瓜蒂散經
則內消宿食神曲是也重則下之氣是也寒則瀉
之半夏乾薑三姜又水是也熱則下之大黃黃連枳



實牙是...
清其... 則... 土苓半夏... 須多... 其頃... 重則... 當

惡食者... 有物... 宜導痰... 補脾... 二陳加白朮川芎

聞食氣即嘔二陳加砂仁青皮... 憂抑傷脾不思飲

食炒黃連酒芍藥香附加青朮丸末薑汁浸炒餅丸

越鞠丸治食鬱
方見

保和丸治食積虛者以補脾藥下之

山查肉二兩半夏二兩神曲炒茯苓各一兩蘿蔔子

陳皮連翹各半為末神曲糊丸加白朮二兩

食不消須用枳實神曲若壯實以黃連枳實消導之弱



者以白朮陳皮山查神曲麥芽補而消之

食後感寒宿食不消用丁香砂仁華澄以溫之

肝溪治一婦因宿食上腹大痛連及兩脇以香附末湯

調探吐而愈。一人好酒每早嘔吐必瓜蒌貝母炒

山梔石膏煨香附南星薑製山查神曲各一两枳實

薑黃羅蔔子連剋石礮各半两升麻二錢半為米薑

汁浸炊餅丸白湯下又見。一人因吃麪發熱身痛

咳嗽有痰以蒼朮一錢半陳皮一錢羌活茯苓黃芩

川芎甘草各三分薑水煎

抱一翁治一人啖馬肉過多腹脹服六黃巴豆益甚脉

寸口促而二尺將絕曰胃有新邪其脈促宜引之上
達今反奪之誤矣急以涌劑飲之置掌中座使人環
旋頃吐宿食仍以神芎丸服之遂愈

治食自死六畜中毒栢末酒下方寸匕未散再服

附方

加減枳朮丸

東垣

白朮

二兩

枳實

夫炒黃
色一兩

已上二味本方

神曲麥芽

心疲悶
加之

木香檳榔青皮

滯氣
加之

大黃黃芩黃

連濕熱物

連翹熱
加之

茯苓澤瀉

濕痞悶
加之

梔子

病後食
加之

半夏白礬

豆粉
加之

草豆蔻三稜義朮

生冷
加之

乾薑



傷水宿砂丁香心胃痛人參傷胃羅蔔子除濕

為末荷葉煨飯丸菜豆湯下六七十丸又見脾胃門可參看

傷西瓜冷水羊乳寒濕之物宜白朮二錢川烏五防風

炙甘草各錢丁香筒

傷羊乳肉麪濕熱之物白朮苓連各錢一大黃錢二炙甘草五分

白芍藥一錢腹痛之枳實痞悶加厚朴腹脹加枳殼胃中不利加

陳皮乾薑內寒加茯苓渴加蒼朮腹中窄狹加巴豆冷物加

損即凡治傷之輕飲食不化心腹彭脹

木香各錢二檳榔各錢二陳皮八錢黑丑頭身四錢

不為末醋糊丸桐子大薑湯下二十丸



黃九 治傷之重脇肋胷脹

雄黃一兩 巴豆半兩 生用 右九服法同心痛門

急九 治傷寒冷之物及療心腹卒暴百病大便秘

大黃 乾薑 巴豆去油各等分

右為末煉蜜丸如小豆大每服三九

神佑九 治留飲懸飲方見欬門

寬中進食九 又名寬中喜食無厭九 滋形氣喜飲食

麥芽一兩 半夏 猪苓各七錢 草豆仁 神曲炒

枳實各五錢 陳皮 白朮 白茯苓 澤瀉

宿破各一錢 乾生薑 甘草 人參 青皮各一錢



木香分五 右末炊餅九梧桐子大米湯下三五十丸

枳實導滯丸 治傷濕熱之物不化而作痞滿悶亂

澤瀉錢二 大黃兩一 枳實 神曲各半兩 黃芩 茯苓

黃連 白朮各三錢 右末炊餅九碗巨大湯下七八

或問世俗用枳實導滯丸治一切飲食所傷牛良藥
子曰此方乃東垣所製惟可治濕熱之物所傷而作
痞悶故用黃芩黃連以清其熱茯苓澤瀉以行其濕
枳實消痞滿化宿食白朮補脾行濕大黃導滯攻下
又能去熱物之傷故用得効何世醫不論所傷物之
寒熱燥濕病之輕重緩急悉皆用之誤傷寒物又救
哉學者詳之

暑八 夏至日後
病熱為暑 附暑風

脉虛身熱得之傷暑脉浮自汗火動而
發故也 或浮大

法

