

卷之三

七

舒參產舒之華嚴山莖如芥菜葉如胡蘿蔔二三月間開細白花  
冬至後發苗夏至後葉萎既萎則根堅可采然雜藜藿中白晝  
難覓惟參之所在夜必有光上人覘光所在立標以識其處翌  
日掘之刮去粗皮水煮晒乾製法每參一兩用甘草五兩麥冬  
一錢煎出濃汁濾去渣將參入汁內浸透晒乾復浸汁內汁盡  
為度收貯存用愈久愈佳若製後更加人乳蒸浸則真參乳膏  
也其性峻補氣分立治一切虛羸沉寒痼冷得桂附則補命門  
得苓朮則補脾氣得秦艸加皮則強筋骨煎丸浸酒俱有遼參  
之功臨產催生痘症起漿陰虛久瘧間二日一發經年不愈諸  
症雖遼參猶不逮其神速也但味辛和火未退者不可驟服力  
厚惟虛寒無火素宜桂附之人服之則有殊效少年暴病或虛

而火甚亦不可服是以微遜遼參耳初康熙間邑人許世五少  
患弱症服參數兩姑能起其家饒參賤故能繼久之久貴家貧  
遂狼狽不支一日有遼道人過其家見而叩之許具以告道人  
曰舒自有參何必遼東也率其家人入此山采得修治任意煎  
服遂病脫體年至八十不異少年因此盛行於世按華嚴山與  
潛桐壤實鍾天桂龍脈之秀氣故此參功效神異如此

休寧汪 昂訥菴編輯 男汪 端其兩較

陰陽氣血多少歌

氣多血盛是陽明多血巨陽同厥陰血少氣多少陰臟少陽還與

太陰經

十二經脉歌

升外陰肺中焦下絡大腸胃口上膈屬肺系肺系橫從腋下

時正腹處各絡

手少陰心經

胃上腕即胃門

即喉嚨

大指內起處為

手少陰心經行心與心已脉下肘循臂骨上廉入寸口上魚際

手少陰心經行心與心已脉下肘循臂骨上廉入寸口上魚際

手少陰心經行心與心已脉下肘循臂骨上廉入寸口上魚際

手少陰心經行心與心已脉下肘循臂骨上廉入寸口上魚際

肺經多氣而少血是動則為嘔滿膨膨肺脹趺蹶痛兩手

肺經多氣而少血是動則為嘔滿膨膨肺脹趺蹶痛兩手

肺經多氣而少血是動則為嘔滿膨膨肺脹趺蹶痛兩手

肺經多氣而少血是動則為嘔滿膨膨肺脹趺蹶痛兩手

痛為厥或掌中熱痛腎痛是氣有餘小便數欠或汗出氣虛



身痛 母病及子 肝虛

亦痛 溺色變少氣不足以報息

手陽明經大腸脉次指內側起商陽循指上廉出合谷兩骨兩筋

中經循臂八肘行臑外肩隅前廉柱骨傍會此下入缺盆

絡肺下膈屬大腸支從缺盆上及頸斜貫兩頰下齒當挾口入

中左右上挾鼻孔盡迎香而終

大腸車盛氣亦盛是動齒痛頸示腫是主津液病所生目黃口

乾熱動喉痺痛在肩前臑大指次指痛不用

足陽明胃鼻頰起下循鼻外入上齒環唇俠口交承漿頤後大迎

頰車耳前髮際至額顙大循喉嚨缺盆入下膈屬胃絡脾

直者下乳俠臍中支起胃口循腹裏下析直合氣街逢逆曲脾

關下膝膕循脛足跗中指通支從中指入大指厲兌之穴經盡

聲心惕陽閉戶塞牖破獨處甚則登高棄衣走責響腹脹為肝

厥王瘡溫淫陽明發多汗汗出執刃口喝唇舌腫喉痺腹水腫膺乳

膝膺股伏兔肝外足跗上皆痛氣盛熱狂身以前有餘消穀溺

黃甚不足身以前皆寒胃中寒而腹脹壅

大陰脾起足大指循指內側白肉際過核骨後內踝前上腓循脛

膝股裏腹內前廉入腹甲屬脾絡胃上膈通俠咽連舌散舌下

支從胃注心

脾經血少而氣旺是動則病舌本強食則嘔胃脘痛心善

意而腹脹得後與氣快然衰脾病身重不能搖疲泄水閉及黃

疸煩心心痛食難消強立股膝內多腫不能臥用胃不和

手少陰心起心經下膈直絡小腸支腋咽繫目系直心系

上肺下循膈後出太陰心主之後行下肘循臂抵掌後

銳骨之端小指停

心經少血而多氣是動咽乾心痛應目赤痛渴飲臂膈內

痛掌熱

手太陽經小腸脉小指之端起少澤循手上腕出踝中上臂骨出

肘內側兩筋之間膈後廉出肩解而繞肩脾交肩脊上入缺盆

直絡心循道咽下膈抵胃屬小腸支從缺盆上頸頰至目銳

皆入耳中支者別頰復上頰抵鼻至目內眦絡顴交足太陽

接嗌痛頰腫頰難回肩似拔分膈似折耳聾目黃腫頰是所

生病為主液頸頰肩膈肘臂痛此經少氣而多血

足太陽經膀胱脉目內眦上額交巔支額從巔入耳角直都從巔

支者入耳中支者別頰復上頰抵鼻至目內眦絡顴交足太陽

腰膝疎 本經穴在外側亦內陰  
踝循京骨小指外側至陰全

脊痛腰背痛

膀胱少氣 多中頭痛脊痛腰折目似脫身項似拔脰如結

合喘如裂痔瘡狂癲疾並生翳眦目黃而淚出顛項背腰尻脰

喘病若動時皆痛徹

足腎經脈屬少陰斜從小指趨足心出于然骨循內踝入跟上端

脰內尋上股後廉直貫脊屬腎下絡膀胱際直者從腎貫肝膈

入肺挾舌循喉嚨支者從肺絡心主注于胸交手厥陰

腎經多氣少血是動病飢不欲食咳唾有血喝喝喘目眩心

懸悸起振善恐如人將捕之因腫舌乾口熱上氣心痛

煩黃疸腸癖脊股後廉內痛嗜臥足下熱痛切

手厥陰經心主標心包下膈絡三焦起自胸中支出脇下腋三寸



上厥腕

少陰

循膈內筋太陰少陰中間走入肘下臂兩筋起行掌中從中指指出中筋

支從小指次指交手小指高之成指交三焦

肘臂學急脈平腫甚則支滿在胸脇中脘之膈大動而赤目黃笑不談

心經少氣原多血是動則病手心熱此主脉所生病者掌熱心

煩心痛

手少陽經三焦脉起手小指次指間循腕出臂之兩骨貫肘循膈

外上肩交出足少陽之後入缺盆布膺中傳散絡心包兩下膈

循屬三焦表裏聯支從臆中缺盆出上項出耳上角顛以屈下

頰而至頰支從耳後入耳出走耳前交頰至目銳眥外角膽經

連

三焦少血多氣耳聾嗌腫及喉痺氣所生病汗出頰腫痛

目銳眥耳後肩膈肘臂外皆痛廢及小次指

少陽相火

氣分三焦也

氣分三焦也

火為汗

無名指關冲穴

手少陽

外上肩

兩乳中間

缺盆上

過膈經客主人

外角

支別銳皆下大迎合手少陽抵于頰下加頰車下頸復合缺

盆下胸膈絡肝屬膽春其循脇裏向氣街繞毛除入脾厭中

橫直自從缺盆下腋循胸季脇過章門下合脾厭解陽外出膝

外廉外輔緣下抵絕骨出外踝循跗入小次指間支者別跗入

大指循指岐骨出其端

膽經多氣而少血是動口苦善太息心脇疼痛轉側難足熱面

塵體無澤頭痛領痛銳脊痛缺盆腫痛亦腫脇馬力俠癭頸腋

生汗出振寒多瘡疾胸脇脾膝脛絕骨外踝皆痛及諸節

足厥陰肝脉肝終大指之端毛際叢循足跗上上內踝出太陰後

入脛中循股入毛繞陰器上抵小腹俠胃通屬肝絡膽上貫膈

布手脇肋循喉嚨上入頤頤連目系出頤會督項巔逢支者復

支別銳皆下大迎合手少陽抵于頰下加頰車下頸復合缺

盆下胸膈絡肝屬膽春其循脇裏向氣街繞毛除入脾厭中

橫直自從缺盆下腋循胸季脇過章門下合脾厭解陽外出膝

外廉外輔緣下抵絕骨出外踝循跗入小次指間支者別跗入

大指循指岐骨出其端

膽經多氣而少血是動口苦善太息心脇疼痛轉側難足熱面

塵體無澤頭痛領痛銳脊痛缺盆腫痛亦腫脇馬力俠癭頸腋

官肺經

木

木魁主

肝虛

肝火

脈於小腹陰器  
脈絡喉嚨

五

行中極穴

臍下三寸穴

各于承泣

臍下四寸六分中極任脈起于其下二陰之交會陰之穴任由會陰而行腹督由會陰而行背

八目是

順手

差

任脉當臍中而上衝脈俠臍旁而上

白

衝為血海

This micrograph shows a cross-section of a biological specimen, possibly a plant stem or root. The central part of the image displays a vascular cylinder, which is a cluster of specialized cells responsible for the transport of water and nutrients. Surrounding this central cylinder is the cortex, composed of various types of cells, including parenchyma and sclerenchyma. The outermost layer visible is the epidermis, which serves as a protective barrier. The overall structure is circular, and the cells are arranged in distinct layers and patterns, characteristic of plant tissue anatomy.

出願

教名衛

10

膝後曲處

1

—



下  
湧泉

2

1



一

1

大陰足瀕此之端即窮滿

15

卷一

10



下項循肩仍俠脊抵腰終腎衛男莖下纂亦與女子頸又從少  
女上  
腹貫臍中貫心入喉頤及唇上繫目下中央際此為並任亦同  
此督脈脈而行者

衝大抵三脉同一本靈素言之每錯綜  
大率以行身前者為督行身前者為任從中起者為衝

督病少腹衝心痛不得前衝衝病及其在女子為不孕嗟乾遺  
此督脈為病同于衝脈者

溺及痔瘕任病男病女瘕帶衝病裏急氣逆冲  
此督脈為病同于衝脈者

躄乃少陰之別脉起于然骨至内踝直上陰股入陰間上循胸入  
此督脈為病同于衝脈者

缺盆出人迎前入頰背合于太陽陽驕和此皆靈素說奇經  
此督脈為病同于衝脈者

帶及二維未說破  
此督脈為病同于衝脈者

醫學指南總訣一首

不讀本草焉知藥性專泥藥性決不識病假若識病未必得法識  
病得法中工之甲能窮素問病受何氣便知用藥當擇何味不



誦十二經絡開口動手便錯不通五運六氣檢遍方書何記經  
絡明認得標運氣明認得本求得標只取本治千人無一損

二陳湯茯苓半陳甘清氣化痰久嗽安膈上不寬加枳桔火旺生痰

用黃芩好堪

參朮加名六君子健脾胃和胃無如此中脘寒痰去參香砂配  
用皆能止

飲食過飧不克消麴麥山查厚朴標再加枳實黃芩炒何愁體

弱胃脾嬌

咳嗽生痰分冷熱熱用苓連並枳桔寒痰枳縮配原方化氣寬

中痰自減

風寒外感嗽何辜二陳枳桔與前胡乾葛桑杏能清肺東垣以

此號參蘇

火升痰起人頭暈酒炒黃芩荊芥應甚者天麻白芥防服後管

教無此症

老痰上閉耳應聾蘇子藹蒲花粉同青皮桔梗兼葱白氣透痰消聽自聰

吐酸吐苦根須識酸苦相殊火屬一黃連姜炒與黃芩不勞分外求端的

痰厥之症勢最急多用硃砂並滑石不瘥還加軟石膏急服令人病自失

痰若裹食胸不寬多用青皮山查肉若是人虛多氣弱更加白朮人參足

二陳半夏性本燥血虛煩渴皆不要四物湯中不必加貝母代之真奪效

火鬱胸中老痰結滯在喉間咯不絕且姜香附結連翹少佐玄明痰自滅

痰在經絡及四肢姜汁還兼竹瀝施腸胃有痰須枳實腸間白芥可除之

溫膽湯加竹茹實寧神豁痰爲第一若加枳實與南星湯號導痰能利膈

去草陳皮四七湯加瀉厚朴與生姜散鬱消痰兼理氣孕生惡阻用之良

嘔吐皆因胃火炎脉來洪數嘔連綿急用此方加枳實竹茹姜汁炒黃連若還藥餌難吞下檳榔些少木香煎

五六日來嘔不休心中脹悶手難探多加壳朴苓連芍便秘硝



黃一服瘳

嘈雜暖氣一般看胸中積熱與停痰石膏香附各連並二陳加減有何難

悶脹吞酸與吐酸二陳加入炒萊連水停心下名曰飲枳朮諸苓小便寬以上二陳加減法休將浪與外人傳

平胃散因病加減法

平胃陳倉朴草陳健脾燥濕用調停腹胸飽悶兼傷食膈噎吞酸皆可行

飲食自信脾胃傷香砂枳實木香當食積麦芽神曲炒肉積山查草果良

生合入藥如序帶乾姜更人青兵是陽國島海建乃良區土海