

明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈隱評

海甯許樹辛水訂
蔣光燾實叻校

流注論第三十二

夫流者行也乃氣血之壯自無停息之機注者住也因氣血之衰是有凝滯之患綱案流注者其毒流走而實注也此解似非其形漫腫

無頭皮色不變無論穴道隨處可生凡得此者多生於體虛之人勤勞之輩不慎調變夏秋露臥縱意取涼

熱體當風圖身快爽或中風邪發散未盡或慾後陰虛外寒所侵又或惱怒傷肝鬱結傷脾榮氣不從逆於

肉裏又或跌打損傷瘀血凝滯或產後惡露未盡流宿經絡皆成斯疾既成之後當分表裏寒熱虛實邪止

新久而治之初因風寒所中表證發散未盡者人參敗毒散散之房慾之後體虛寒氣外侵者五積散加附

子溫之附子徐勒勞傷鬱怒思慮傷脾而成者歸脾湯加香附青皮散之跌撲傷損瘀血凝滯而成者復元活血

湯逐之產後惡露未盡流注經絡而成者木香流氣飲導之此皆初起將成治法一服至三四服皆可外俱

用琥珀膏敷貼其中亦有可消者十中五六如服前藥不得內消者法當大養氣血徐曰尤當消痰培助脾胃溫暖

經絡通行關節木香流氣飲十全大補湯俱加熟附子香附熟附子徐勒培助根本如此則未成者消已成者潰

已潰者斂終無殘敗破漏不斂之證如有膿宜急開之患者又當慎起居戒七情遠寒就溫庶可保全若誤

用寒涼剋伐內消等藥終至不救者多矣

徐曰流注有虛癰實癰兩種 又曰流注一證由風寒入臟所致膜在皮中旁通四達初無定處所以隨處

作患此真脈絡之病故古人製大活絡丹以治之其餘煎丸皆非正治蘇州一小兒甫九歲患流注肩背腰

脇十餘處百端醫治無效予曰此惟大活絡丹能愈服至三十餘丸未破者消已破者收口更服補氣血之

藥而愈此條從潤羅醫案采入

流注看法

初起漫腫皮色光亮微熱微疼筋骨不牽強者順已成身體微熱飲食有味疼痛有時腫生紅色者順已潰膿稠而黃腫消痛止身體輕便起坐如常者順潰後內肉易生膿水易止精神易復膿口易合者順初起身體發熱脈細而數皮色微腫痛徹筋骨者險已成飲食少思口乾作渴身體疼痛四肢沉重者險已潰膿水清稀腫仍不消虛熱不退疼痛不減者逆潰後膿穢不止肌膚瘦削飲食不殮發熱皮粗者死

徐曰看法亦與諸証同

流注治法

初起風寒表散未盡而復腫痛者再宜和解之表邪已盡而後復生流注者宜清熱消腫行散氣血暴怒所傷抑鬱所致胸膈痞悶中氣不舒宜順氣寬中腫硬已成而不得內消者宜和氣血更兼補助脾胃跌撲閃肭瘀血凝滯爲患者宜調和氣血通行經絡寒邪所襲筋攣骨痛及遍身疼痛者溫經絡行氣血產後敗血流注關節致生腫痛者當散敗瘀養氣血潰後膿水不止而形衰食少者宜滋氣血峻補脾胃

徐曰亦與諸証同

流注治驗

一男子風寒表散未盡兩腮腫痛微熱不退用小柴胡湯加川芎天花粉

天花粉徐勒

桔梗連翹二服熱頓退又以

二陳湯加桔梗黃芩牛蒡子連翹四服十日而安

徐曰此乃風痰非流注也

一男子勞傷受寒背生三腫皮色不變寒熱交作至夜尤甚先以萬靈丹洗浴發汗寒熱頓退惟腫硬不消以琥珀膏敷之三次腫消痛止漸平

徐曰此亦風痰所聚

一婦人因怒脇下結腫將近半年方痛此肝氣鬱結之証用木香流氣飲四服其腫漸紅蓋病久必欲作膿不

內消又以十全補湯靈補加木香香附青皮十餘用酒調膏又以木方力身身東三月其服之消消可上
多此元氣已經虧損所致服人參養榮湯加熟附子此味月餘膿始稠少本方倍參耆歸尤兩月而愈

一男子元氣素虛因暴怒臍生腫塊疼痛牽強寒熱往來飲食日減以補中益氣湯此五字徐勒加香附貝母十餘服寒熱漸止又服益氣養榮湯月餘而腫潰間服八珍湯外用香附餅日灸二次徐勒脾胃健而安

婦人項間乳上各腫一塊將近一年漸大而痛診之脈細數而無力此思慮過傷之證用歸脾湯加桔梗香附十餘服腫漸高以琥珀膏敷之色漸紅欬其作膿以十全大補湯加桔梗貝母服之半月膿熟鍼之頭腐

一男子平素怯弱腰後微腫一塊飲食少思口乾發熱此腎傷也治當朝以附桂八味丸以上七字徐勒午用人參養榮湯扶植根本為要彼以口乾發熱為內有火徐勒既有此證欲投清涼之劑解之徐勒其死亦不以余辭不治

彼請內科治之以退熱為主正合其意投藥三劑腹痛作瀉又以猪苓澤瀉厚朴此三味徐勒泄氣等藥投之大熱發作形體更變復請余治余曰死期速矣因虛致病法當滋補况腫在腰間內腎受傷口乾作渴腎水

枯竭發熱不退陰虛血少今以有餘之藥而療不足之證豈有不死者哉又半月而死

徐曰以上所載五案皆係痰毒並非流注之病流注者纏綿不已或五或七或九愈者愈發者發變態萬端若初生一兩個旋即消潰皆非真流注也

調和榮衛湯調和榮衛湯膏獨活甘草香大茴赤芍白芷併烏藥牛膝紅花兼陳皮治流注初氣血凝聚結腫不散已成未成並服

川芎 當歸 陳皮 獨活各一錢赤芍 白芷 烏藥 大茴香 黃耆各八分 甘草 紅花各五分牛膝下部加 水二茶鍾煎八分入酒一杯量病上下服

徐曰通治之方但少痰藥 桐案大茴香一味徐勒批曰此味不解

木香流氣飲木香流氣飲芍歸蘇枳實防風實治流注瘰癧及鬱結為腫或血氣凝滯遍身走注作痛或心胸痞

悶咽噎不利脅腹膨脹嘔吐不食上氣喘急咳嗽盛或四肢面目浮腫者

川芎

當歸

紫蘇

桔梗

青皮

陳皮

烏藥

黃耆

枳實

茯苓

防風

半夏

白芍各一錢甘草節

大腹皮

木香

檳榔

澤瀉

枳殼各五分

牛膝

下部加一錢

水三茶鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

徐曰此流注方藥味太雜宜擇用 梔案青皮烏藥大腹皮木香檳榔徐圖

六鬱湯

六鬱湯內用川芎 半夏陳耆香附同 甘肅者北砂仁等 溫痰流注即時通

治諸鬱結腫及左右二搭相串濕痰流注等證

川芎

半夏

茯苓

香附

陳皮

山梔各一錢蒼朮

砂仁

甘草各五分

水二

鍾薑三片煎服

附子八物湯

附子八物湯芍 甘草肉桂當歸等 熟地人參朮茯苓 木香薑棗效如神

治房慾後陰虛受寒致生腫塊又或偏身腿脚疼痛不能步履

川芎

白芍

熟地

人參

白朮

茯苓

當歸

附子各一錢肉桂五分木香

甘草各三分

水二茶鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

徐曰此通治虛寒之方非流注之方凡立方總當兼顧本症一二不可全不服應

瘡科流氣飲

瘡科流氣飲芍 防風枳殼香烏藥 白芷人參厚朴隨

治流注及一切鬱怒凝滯氣血作腫疼痛或胸膈痞悶或風寒濕

毒搏於經絡結成腫塊者

當歸

甘草

紫蘇

人參

白芍

官桂

黃耆

防風

枳殼

烏藥

桔梗

厚朴各七分檳榔

木香

川芎

白芷各五分

水二茶鍾煎八分食前服

徐曰此亦流注通治之方與前同

通經導滯湯

通經導滯湯香附 赤芍芍歸熟地隨 陳丹枳蘇甘草節 牛膝紅花獨活宜

治婦人產後敗血流注經絡結成腫塊疼痛者

香附

赤芍

川芎

當歸

熟地

陳皮

紫蘇

牡丹皮

紅花

牛膝

枳殼各一錢甘草節 獨活各五分 水二茶鍾煎八分入酒一小杯食前服

徐曰亦與前方相同皆出

香附餅 香附餅用香附末酒和調成患上安

患處熱熨斗熨藥上未成者自消已成者自潰風寒濕毒宜薑汁作餅

徐曰外治良法

醒脾湯 醒脾湯中參朮香

煩不安神氣不清

白朮 黃耆

黃連 木香

徐曰即歸脾湯意

調中大成湯 調中大成湯朮附

白朮 茯苓

砂仁 遠志

徐曰此病後調養方

黃耆六一湯 黃耆六一湯參草

黃耆 甘草

散血葛根湯 散血葛根湯半夏

乾葛 半夏

蘇葉 香附

黃連酸棗地骨皮 木香香附龍眼宜

治懷抱鬱結思慮傷脾致脾氣不行逆於肉裏乃生壅腫疼痛不眠心

人參 茯神各一錢酸棗仁 地骨皮 遠志各七分柴胡

香附各五分龍眼肉七個 水二茶鍾薑三片棗三枚煎八分不拘時服

歸身 白芍

陳皮 山藥

肉桂各八分 水二茶鍾煨薑三片棗二枚煎八分食遠服

甘草各五分附子

治流注潰後膿水清稀飲食減少不能生肌收斂

治流注潰後膿水出多口乾作渴煩躁不甯

水二茶鍾煎八分食遠服

治跌撲損傷瘀血凝滯結成流注身發寒熱者

防風 羌活 升麻 桔梗各八分白芷 甘草 細辛

紅花各六分 水二茶鍾葱白三枚薑三片煎八分不拘時服

徐曰如果敗血當更加血分藥此方尚未到

先天大造丸先天大造丸歸地參等藥製黃治風寒濕毒襲於經絡初起皮色不變漫腫無頭或陰虛外寒侵

入初起筋骨疼痛日久遂腫潰後膿水清稀久而不愈漸成漏証者

紫河車一具酒煮搗膏熟地黃四兩酒煮搗膏歸身 茯苓 人參 枸杞 兔絲子 肉蓯蓉酒洗搗膏黃精

白朮 何首烏去皮用黑豆同煮搗膏川牛膝 骨碎補去自微炒仙茅浸去赤汁煮熱去皮搗膏各二兩川巴戟去骨破故紙炒遠志各一兩

木香 青鹽各五錢丁香三錢黑棗肉二兩 右爲細末煉蜜丸如桐子大每服七十丸空心溫酒送下此

方非獨流注成漏者可用又補一切氣血虛羸勞傷內損及男婦久無嗣息並有奇功

徐曰此通治補藥病後調養法 又曰此虛人潰後補藥初起禁用

琥珀膏琥珀膏中用大黃同森搗稠敷患處提毒之法此爲良治一切皮色不變漫腫無頭氣血凝滯結成流毒毋論身體上下年月

新久但未成膿者

大黃二兩鬱金 南星 白芷各二兩 共爲細末用大蒜頭去殼搗爛入上藥再搗稠入酒一二匙

調勻偏敷腫上紙蓋或即熱痛或不痛俱待藥乾便效次日又有起泡又有不起泡者如有起泡挑去泡中

黃水膏貼之自效

徐曰此弔毒法亦有必當用之法 又曰此提毒之法毒淺者自消凡一切無頭腫痛之證俱效 梔案予

所製消核膏流注初起貼之可消

附錄大活絡丹 治一切中風癱瘓痿痺厥厥拘攣疼痛癱疽流注跌撲損傷小兒驚癇婦人停經

白花蛇 烏梢蛇 威靈仙 兩頭尖俱酒浸草烏 天麻煨全蝎去毒首烏黑豆水浸板炙麻黃

貫仲 炙草 羌活 官桂 霍香 烏藥 黃連 熟地 大黃 蘇木 沉香各二兩細辛 赤芍 沒藥去油丁香 乳香去油鹽蠶 天南星 姜製青皮 骨碎補

白蓮

安息香酒熬黑附子製

黃芩

香附酒浸焙元參白朮各一兩防風二兩半高根

虎脰骨

當歸各一兩血竭七錢地龍炙

犀角

麝香

松脂各五錢牛黃

片腦各一兩人參三兩

右藥各研稱准

合和再研蜜丸如桂圓核大金屬爲衣陳酒送下須用白臘爲匣收藏以免泄氣

徐曰頑痰惡風熱毒瘀血入於經絡非此不能透達乃治肢體大證必備之藥他書活絡丹祇用地龍乳香

等四五味乃治藝聖人實邪之方不可用

流注應用方

十全大補湯

人參養榮湯

補中益氣湯

歸脾湯

益氣養榮湯

八珍湯

俱見錢氏門

萬靈丹

見腫門

小柴胡湯

二陳湯

俱見腫門

乳癰乳巖論第三十三

夫乳病者乳房爲陽明胃經所司乳頭爲厥陰肝經所屬乳子之母不能調養以致胃汁濁而壅滯爲膿又有

憂鬱傷肝肝氣滯而結腫初起必煩渴嘔吐寒熱交作腫痛甚者宜牛蒡子湯主之厚味飲食暴怒肝火妄

動結腫者宜橘葉散散之又憂鬱傷肝思慮傷脾積想在心所願不得致經絡痞澀聚結成核初如豆大漸

若圍棋子半年一年二載三載不疼不癢漸漸而大始生疼痛痛則無解日後腫如堆栗或如覆碗紫色氣

穢漸漸潰爛深者如巖穴凸者若泛蓮疼痛連心出血則臭其時五臟俱衰四大不救名曰乳巖凡犯此者

百人必百死知覺若早姑用清肝解鬱湯或益氣養榮湯患者再加清心靜養無罣礙服藥調理尙可苟

延歲月若中年已後無夫之婦得此其死尤速故曰夫乃婦之天也惟初生核時急用艾灸核頂待次日起

泡挑破用拔針針入四分

此句徐勣此曰必更腫此法斷不可用

用冰蠟散條挿入核內

此四字徐勣

糊紙封蓋至十三日其核自落用

玉紅膏生肌斂口再當保養庶不再發又男子乳癰與婦人微異女損肝胃男損肝腎蓋怒火房慾過度以

致肝虛血燥腎虛氣怯血脉不得上行肝筋無以榮養遂結腫痛治當八珍湯加山梔牡丹皮

八珍湯徐勣

口乾

作渴者加減八味丸

八味丸味勦

腎氣素虛者腎氣丸已潰作膿者十全大補湯懷孕之婦乳疾曰內吹因胎氣

旺而上衝致陽明乳房作腫宜石膏散清之

此句徐勦批曰不可用毒

亦可消散遲則遷延日久將產出膿乳汁亦從膿發

流出其口難完有此者純用補託生肌其口亦易完矣

徐曰乳病有數種種種各別須知之

又曰乳腫不同俱係陽明結氣結聚各有專方一槩時藥皆有損無

益也

乳癰乳巖看法

初起紅赤腫痛身微寒熱無頭眩無口乾微疼者順已成掀腫發熱疼痛有時一囊結腫不侵別處者輕已潰膿黃而稠腫消疼痛漸止四邊作癢生肌者順潰後膿水自止腫痛自消新肉易生膿口易合者順初起一乳通腫本痛不紅寒熱心煩嘔吐不食者逆已成不熱不紅堅硬如石口乾不眠胸痞食少者逆已潰無膿正頭腐爛腫勢愈高痛勢愈盛流血者死潰後肉色紫黑痛苦連心魄氣日深形體日削者死

徐曰乳癰與乳巖各有看法此乃乳癰看法也

乳癰乳巖治法

初起發熱惡寒頭眩體倦六脈浮數邪在表宜散之發熱無寒惡心嘔吐口乾作渴胸膈不利者宜清之變鬱傷肝思慮傷脾結腫堅硬微痛者宜疎肝行氣已成掀腫發熱疼痛有時已欲作膿者宜託裏消毒膿已成而脹痛者宜急開之脾胃虛弱宜更兼補託潰而不斂膿水清稀腫不消疼不止宜大補氣血結核不知疼痛久而漸大破後惟流污水宜養血清肝

徐曰此亦是乳癰治法乳巖無治法不過使之遷延歲月不致痛苦惡具而已

乳癰乳巖治驗

一婦人因怒左乳腫痛寒熱交作服人參敗毒散一劑

人參敗毒散徐勦批曰不切

表證已退又用牛薢子湯二服腫消潤安

此真氣雖弱而邪火尚未有餘如用藥合理尙堪調治先用逍遙散加香附貝母十餘服而咳嗽漸止寒熱間作又用八珍湯加香附牡丹皮柴胡遠志十餘服身熱去其八九又服益氣養榮湯加青皮木香兩月餘胸膈得利噯氣得舒飲食漸進肌膚漸澤外腫以阿魏化瘡膏貼之半年餘而消

一婦人右乳疼痛腫如覆碗診之脈數有力此有餘證欲作膿也用託裏消毒散數服而脹痛針之出膿碗許又用十全大補湯加香附十餘服而安

徐曰此是乳癰實證如乳子之時有此乃是外吹也

一婦人暴怒左乳結腫疼痛自服仙方活命飲二劑疼痛稍止結腫不消仍服清涼敗毒之劑清涼二字徐勸腫痛更作形體日弱診之脈浮數而無力此真氣虛邪氣實非補不可用益氣養榮湯四五服其腫始高寒熱亦退又十餘服而膿潰兼服十全大補湯兩月而痊此證非純補豈能得愈純補二字徐勸此曰外證無純補

一男子年過五旬因妻喪子不成立憂鬱傷肝左乳結腫半年痛甚作腐肝脈弦數先用小柴胡湯加青皮山梔遠志貝母數服而肝脈稍平又用八珍湯仍加前藥十餘服其腫漸腐爲膿更服益氣養榮湯庶保收斂彼爲內醫所惑謂鬱怒傷肝肝經有火不必用補更服降火流氣寬中等劑致食少便秘發熱作渴復請予治肝脈復弦口乾作渴邪火內淫飲食減少脾土受傷便秘發熱陰血竭而爲燥爲熱以上俱內損證也辭不治後月餘果死

徐曰此卽男子乳巖本屬難治

一婦人左乳結核三年方覺腫痛診之脈緊數而有力此陽有餘而陰不足也况結腫如石皮肉紫色不澤乃眞乳巖證辭不治又一婦左乳結腫或小或太或軟或硬俱不作痛至半年餘腫如覆碗堅硬木痛近乳頭纍纍徧生疙塔時痛時癢診之脈弦而數腫色慘黑不澤此氣血已死亦辭不治又一婦已潰腫如泛蓮流

血不禁亦辭之後果俱死

徐曰此段所述皆真乳巖無愈理 梔案予所製消核膏凡乳核初起無內證貼之無不消者但除根甚難耳因循不治變為乳巖則難治乳巖潰後宜貼陽和解凝膏近見刻本經驗良方載以鴉片灰作搽藥亦有得愈者附記於此 又案全生集乳巖治法初起用厚黃丸每服三錢酒送十服全愈或以陽和湯加土貝五錢煎服數日可消倘誤以膏貼藥敷梔案貼余清核膏無定主日漸腫大內作一抽之痛已覺遲治倘皮色變異難以挽回勉以陽和膏日服或以厚黃丸日服或二藥每日早晚輪服服至目潰而痛者外用大蟾六隻分作三日每日早晚取蟾破腹連維蟾身刺孔貼於患口內服千金託裏散方見瘰癧門註中三日後接服厚黃丸可救十中三四潰後不痛而瘡極者無一毫挽回大忌開刀開則翻花最慘蓋無一活男女皆有此證

乳癰主治方

牛蒡子湯

牛蒡子湯瓜蒌仁黃連連翹紫花粉

銀花山梔甘草陳青皮牛蒡皂角針

治乳癰結腫疼痛毋論新久但未成膿者

陳皮

牛蒡子

山梔

金銀花

甘草

瓜蒌仁

黃芩

天花粉

皂角

角針各二錢柴胡

青皮各五分

水二茶鍾煎八分入酒一杯和勻食遠服

徐曰此乳證通治方

梔案瓜蒌仁青徐圈

橘葉散

橘葉散內用柴陳石骨連翹一錢等

川芎山梔青皮亭

橘葉甘片草五分

治婦人有乳

甚者惡心嘔吐

皂角

倦怠面色萎黃飲食減少

陳皮 白芍

川芎 當歸

生地

半夏

香附各八分青皮

遠志

茯神

貝母 蘇葉

桔梗各六分甘草

山梔

木通各四分

水二茶鍾薑三片煎八分食遠服

徐曰與前法重

鹿角散 鹿角散用角三寸炭火煨之令微紅研服三錢酒調下

乳癰新起散無蹤

治乳癰新起結腫疼痛憎寒發熱但未成者俱效鹿角尖三寸用炭火

煨稍紅存性碾末每服三錢食後熱酒一茶鍾調服甚者再用一服必消

徐曰此單方

回乳四物湯 回乳四物湯四物加上麥芽能散乳

當歸 白芍 熟地 錢各二兩炒

治產婦無兒喫乳致乳汁腫脹堅硬疼痛難忍

川芎

當歸

白芍

熟地

錢各二兩炒

水二茶鍾煎八分食遠服用脚布束緊兩乳以手

按揉其腫自然消散甚者再用一服

徐曰此治乳脹消乳之法宜再加猪苓澤瀉茯苓等以利其水 梔案熟地徐改生地麥芽一味徐圈

灸乳腫妙方

灸乳腫痛方法高 憊怒勞傷氣不調將碗覆於患上灸 諸般腫痛寂然消

治氣惱勞傷或寒熱不調乳內忽生腫痛用碗一隻內用粗燈草

四根十字排勻碗內燈草頭各露寸許再用平山粗紙裁成一寸五分闊紙條用水濕根貼蓋碗內燈草上

紙與碗口相齊將碗覆於腫乳上留燈草頭在外將艾大圓於碗足底內點火灸之艾盡再添灸至碗口流

出水氣內痛覺止方住甚者次日再灸一次必消

保安萬靈丹

見靈 癰門

治乳癰初起發熱惡寒頭眩肢體作痛者

益氣養榮湯

見靈 癰門

治鬱怒傷肝七情內結以致乳中生核不疼不癢日久方痛甚者胸膈不利吞酸嘔吐頭

目昏眩四肢倦怠或已破潰膿水清稀不能收斂飲食減少口淡無味自汗盜汗肢體羸瘦者

治乳使用方

治乳痛公英最良 酒煎熱服即眠床 慈湯一盞僅微汗 痛腫全消身便康

治乳癰初起腫痛未成膿者用蒲公英春秋間開黃花似菊者取

連根帶葉二兩搗爛用好酒半斤同煎數沸存渣敷腫上其酒熱服被蓋睡一時許再用連鬚葱白湯一茶鍾催之得微汗而散此方鄉村偏僻無藥之所用之極妙亦且簡便

徐曰此單方

下乳天漿散

下乳天漿四物同王不留行併山甲

茯苓花粉麥門冬漏蘆甘草與木通

治乳母元氣虛弱乳汁微少或生兒日久乳少

川芎

當歸

白芍

熟地

茯苓

天花粉

甘草

王不留行 炒麥門冬

漏蘆

穿山甲炒

通草各一錢

梳梳其乳房其汁如泉湧而來

用健豬前蹄一隻煮爛取汁二碗同藥煎至碗半二次頓熱食遠服之以熱水

徐曰此催乳法

桐案王不留行漏蘆穿山甲通草及健豬前蹄徐俱圈

木香餅

木香餅用生地黃氣滯腫寒併悶

用之一製自無殊

治一切氣滯結腫成核或痛或閃肉風寒所傷

木香

五錢

生地黃

一兩

右木香爲末同地黃和勻量患處大小作餅貼上以熱熨斗熨之堅硬木痛者間

日熨之

徐曰外治良法

乳癰應用方

十全大補湯

八珍湯

見續

逍遙散

冰蠟散

小柴胡湯

見續

托裏消毒散

見腫

阿魏化痞膏

見瘰

附骨疽論第三十四

附骨風

夫附骨疽者乃陰寒入骨之病也人之氣血壯實雖遇寒冷而邪不入骨凡入者皆由體虛之人夏秋露臥寒濕內襲或房慾之後蓋覆單薄寒氣乘虛入裏遂成斯疾初起則寒熱交作稍似風邪隨後臀腿筋骨作痛不熱不紅疼至徹骨甚者曲伸不能轉側日久陰變爲陽寒化爲熱熱甚而腐肉爲膿此疽已成也凡治此證初起寒熱作痛時便用五積散加牛膝紅花發汗散寒通行經絡或萬靈丹發汗亦可次以大小防風湯行

經活血滲濕補虛又有生於尻髀部位漫腫作疼者此非真骨節宜內托羌活湯腿內近膝股漫腫木痛者內托

耆朮湯腿外側者內托酒煎湯初起通用人參敗毒散人參徐勒加木瓜牛膝蘇木紅花虛者十全大補湯加羌

活防己牛膝已成欲作膿者附子八珍湯膿成脹痛者即針之膿稠而黃體實者十全大補湯膿清色白體

虛者保元大成湯食少體倦者香砂六君子湯脾虛寒熱者補中益氣湯以此調理可也又有風濕相乘之

證初起寒熱交作次傳腿腫作痛其形光亮微紅發熱按之如泥不即起者宜當歸拈痛湯或茯苓佐經湯

間服萬靈丹和之以上之證皆由元氣不足中來不可誤用損脾泄氣敗毒等藥外禁寒涼等法如候用之

必致氣血冰凝內肉瘀腐日久化為污水敗膿流而不禁終死又有房慾勞傷寒熱互變氣血乖違經脈橫

解受病日深以成斯疾者徐曰此濕毒之證其患大腸漸漸腫如冬瓜上過膀胱下至足底牽連漫腫皮色不紅日久

潰膿色白腥穢腫仍不消痛仍不減元氣日衰身體縮小唇舌乾焦二便枯秘諸藥不效飲食不進終為不

治又有鶴膝風乃是三陰虧損之證徐曰又初起寒熱交作時亦宜五積散加牛膝紅花或萬靈丹發汗俱

可如汗後腫痛仍不消滅此陰寒深伏以大大防風湯溫暖經絡重者兼灸膝眼二穴敷以琥珀膏亦可漸漸

取效如以上之法俱不效者終成癰疾不必強藥消之只宜先天大造丸史國公藥酒終年常服亦可轉重

就輕徐圖步履也

附骨疽看法

初起身微寒熱飲食如常結腫微紅疼不附骨者順已成舉動自便結腫成囊疼痛有時膿易成者吉已潰膿

稠腫消痛減身體輕便睡穩不熱者吉潰後元氣易復飲食易進內肉易實膿水易乾者吉初起身發寒熱漫

腫色白肢體牽強疼痛附骨者險已成舉動不便通腿漫腫不熱不紅不作膿者險已潰膿水清稀氣穢腥臭

膿痛不消形體日削者死潰後脾胃虛弱飲食無味口渴不止唇白皮枯者死

徐曰看法亦與諸證同

附骨疽治法

初起發熱惡寒身體拘急腿脚腫痛脈浮緊者散之已成腿脚腫痛皮色不變上下通腫者散寒溫經絡寒熱作腫色白光亮按之如泥不起者宜健脾滲濕身體無熱惡寒脈遲而滿腿腫不熱者養血溫經絡暑中三陰脈洪而數腿脚掀腫口乾便燥者宜下之已潰膿水清稀飲食減少形體消瘦者補中健脾胃潰後腫痛不減膿水不止虛熱不退者溫中養氣血愈後筋骨牽強屈伸不便者宜滋養氣血通利關節

徐曰亦與諸證同法

附骨疽治驗

一男子中寒發散未盡大腿腫痛脈浮數而無力此風寒未盡內虛故也用五積散去麻黃加牛膝二服疼痛稍減又用內託黃耆酒煎湯四服全腫俱消惟腿外側結腫一塊不退此瘀血凝滯欲作膿也用託裏藥候膿熟針之更服十全大補湯而斂

徐曰此腿癰也非骨疽

一男子勞碌遇寒每發腿痛發則寒熱嘔吐胸痞不食此因氣惱飲食不節脾胃受傷故不能運化痰滯中皖濕熱動而下注爲脚氣投以開結導引丸二服行去停痰又用半夏佐經湯數服嘔止膈利更服附子六物湯數劑消而不發

徐曰此寒濕也

一老人年六旬過慾腎虛致筋蟬痺縮脚膝無力不能步履外貼追風逐濕膏內服三因勝驗丸而愈

一男子右腿腫痛兩月餘余曰腫成已久何不開之彼曰二老醫同治俱稱內消無膿再請二老決之俱曰無膿但病者昏沈不醒命在危篤余強開之出膿盈許以獨參湯連進二服而甦後以十全大補湯調理百日外而安

徐曰此亦腿癰

一男子房事後受陰寒大腿無形作痛至夜尤甚不能步履醫以散寒除濕消痰止痛藥治之其疼益增余診其脈細澀而無力此氣血不足寒氣所乘之故投以^二防風湯^二劑疼痛頓減又四劑而痊
徐曰此亦寒濕

一男子暑月慾後當風睡臥寒氣襲於左腿遂致腫痛寒熱交作胸痞不食以保安萬靈丹葱湯化服洗浴發汗以散骨髓寒毒後以^二防風湯^二去羌活加紅花破故紙溫腎經通行經絡腫痛漸消血脈漸和又以^三因勝駿丸^三間服調理兩月而愈
徐曰此外感風寒也

一監生慾後受寒致成腿痛余以暖腎氣溫經絡散寒邪藥治之彼以爲緩請內醫投表散之劑外邪散而內虛又以小柴胡湯等藥調理^{小柴胡}致虛熱發作口燥咽乾煩渴不已又以知母石膏湯清其上防風木瓜威靈仙等劑攻其下^{此三字}致病愈劇仍請余治其時患腿愈腫其形縮小^{補案既云愈腫又云縮小必有誤}余斷以必死此證

原屬腎經受寒非附子破故紙不能通達關節非羌活防風牛膝不能通行閉滯非人參白朮炙甘草不能使脾氣行達四肢非川芎當歸白芍熟地紅花不能養血活血凡病從虛而入者先補其虛後攻其病^{以上八字}
^{徐又批曰先補則邪何從而出}今此證不加溫補而發散解肌以正風寒有餘之法治之不死何待後果死

徐曰以上說證皆非附骨疽名實相背

附骨疽主治方

五積散^{五積考臨桂心}

惡寒頭痛者

^{若中麻陳芍茯苓白芷甘草共奏行}

治風寒濕毒客於經絡致筋攣骨痛成腰脚酸疼或徧身拘急或發熱

蒼朮二錢陳皮

枳殼

川芎

當歸

白芍各一錢麻黃

枳殼

桂心

乾薑

厚朴各六分 白芷 半夏 甘草 茯苓 各四分 水二茶鍾薑三片煎八分不拘時服頭痛惡寒

者加連翹蔥頭三根蓋汗為效下部加木瓜牛膝

徐曰此方雜亂不切

內託羌活湯 內託羌活黃柏桂枝連翹北陳雷防紅花甘草當歸尾通治下體用此方

治尻臀患癰堅硬腫痛兩尺脈緊數按之無力

羌活 黃柏 防風 歸尾 蒙本 肉桂各一錢黃耆一錢半連翹 甘草 蒼朮

陳皮各六分紅花五分 水酒各一茶鍾煎八分食前服

徐曰此下體通治之方

當歸拈痛湯 當歸拈痛湯二朮羌活防風澤瀉升麻茵陳草柏葛二參知母黃芩

治濕熱下注腿脚生瘡赤腫作痛或腰脚酸痛或下肢偏身重痛

或下部頑麻作癢或成血風

羌活 當歸 防風 茵陳 蒼朮各一錢苦參 升麻 白朮各七分葛根 甘草

黃芩 知母 澤瀉 猪苓 人參各五分黃柏三分 水二茶鍾煎八分食前服

徐曰此治濕毒之方可擇而用之

內託黃耆湯 內託黃耆湯黃柏當歸生地兼羌活柴胡肉桂木瓜同連翹一味還煎入

治濕熱腿內近膝股患癰或附骨癰初起腫痛此太陽厥陰之分

也脈細而弦按之洪緩有力

黃耆 連翹 羌活 肉桂 生地 黃柏 各五分 水酒各一

茶鍾煎一半空心服

徐曰與前法相近 相案木瓜羌活肉桂三味徐圍

內託酒煎湯 內託酒煎湯桂枝柴胡連翹黃柏葛甘草升麻牛蒡子水酒同煎治漏宜

治寒濕發於腿外側少陽經分患癰或附骨癰堅硬漫腫作痛或

流至足陽明經作腫

酒各一茶鍾煎一半食前服

徐曰意重前

茯苓佐經湯

茯苓佐經湯半夏二朮陳皮草葛根蜜香澤瀉柴胡等木瓜厚朴共姜行

治足少陽經為四氣所乘以致腰腿發熱疼頭痛目昏眩嘔吐不

食胸膈不利心煩熱悶等證

茯苓

陳皮

半夏

白朮

薤朮各一錢蜜香

澤瀉

甘草

葛根

柴胡

厚朴

木瓜各五分

水二茶鍾薑三片煎八分食前服

徐曰義重前方

附子六物

附子六物湯甘草桂枝白朮防己蒼加姜三片水煎服何慮太陰足腫疼

治四氣流注於足太陰經骨節煩痛四肢拘急自汗短氣小便不利

手足或時浮腫

附子

甘草各一錢防己

白朮

茯苓各八分桂枝五分

水二茶鍾薑三片煎八分食遠服

徐曰此治寒濕之方

麻黃佐經湯

麻黃佐經湯葛根羌活二防己朮桂辛甘草各減半更加姜桑枝如神

治風寒暑濕流注足太陽經腰足攣痺關節重痛憎寒發熱無汗

惡寒或自汗惡風頭痛等證

麻黃

葛根

羌活

防風

蒼朮

茯苓

防己各一錢桂心

細辛

甘草各五分

水二茶鍾薑三片煎二枚煎八分食前服

徐曰此亦治寒濕之方義重前 櫛案蒼朮桂心細辛徐圖

小續命湯

小續命湯芎白朮防風防己共人參附子麻黃桂枝芍姜汁甘草兼黃芩

治寒濕之氣中於三陽致身不熱所患煩疼或脚轉筋或腫或不腫

或膝腿頑痺或時緩縱不隨或偏身百節攣痛或小腸疝氣攻衝