

赤水玄珠全集

S25-6

1523

1部10

赤水玄珠第十九卷目錄

藥誤傷人 病人應死證 望色 聞聲 聞音 切脉 發汗止發汗 傷寒

可吐 傷寒不可吐 傷寒吐不出 探法 傷寒吐不住止法 傷寒不可下

小便不通燻法 胸膈不寬熨法 妊娠護胎法 傷寒不染病法 用藥寒

溫合宜論 妊娠傷寒禁忌藥 蒸臍法 熨臍法 中寒 傷寒合病 陰毒

傷寒 夾陰傷寒 寒疫 大頭傷寒 食積 中濕類傷寒 痰證類傷寒

瘀血類傷寒 嗽水不欲嚥 晝夜偏劇 心下滿 遺尿 大便自利 驚惕

呃逆 譫語 鄭聲 痞瘕不言 陰症似陽 冷結 虵厥 鬱冒不仁

肉瞶筋惕 肉苛 百合 瘰癧 循衣摸床 舌卷囊縮 瘥後發腫 瘥後

遺毒 瘥後發碗頭瘡 瘥後勞復 女勞復 瘥後陰陽易 瘥後虛弱 瘥

後昏沉 瘥後飲酒復劇 妊娠傷寒 產後傷寒 不可水 再三汗下熱不

退 四肢冷 附四肢沉重四肢不收 結陽 結陰 寒在皮膚熱在骨髓熱

在皮膚寒在骨髓 太陽傳經用藥 內傷似外感始為熱中病 內傷似外感

未傳寒中病 內傷似外感陽明中熱病 內傷似外感溫熱病 內傷似傷寒

房室傷風 房室傷寒 瘡瘍發熱類傷寒 赤膈傷寒 黃耳傷寒 解休

類傷寒 砂病類傷寒 搖頭 身痒 未交接而作易 病治 人迎氣口脉

衝陽脉 太谿脉 結脉 促脉 代脉

赤水玄珠第十九卷

藥誤傷人

新安生生子孫一奎善輯

凡應用小柴胡湯和解誤用承氣湯致身發黃者死中暑作熱病誤用燥劑者死腎虛受寒內逼浮陽之火泛上面赤煩躁身有微熱渴欲飲水不能咽入便閉或自利小水淡黃或嘔逆或氣短或鄭聲或咽痛狀似陽證醫見面赤煩渴便閉認作陽證誤投寒涼立死陰證身熱面赤足冷煩躁揭去衣被脉來數大無力不急用加減五積散冷服誤用涼藥者死傷寒汗多用利小便藥者死陽明病潮熱汗多小便因少若利之加喘渴者死濕病若發其汗使人耳聾不知痛處者死病人煩躁自覺甚熱他人以手按其肌膚殊無大熱此爲無根失守之火用涼藥者死病人應死證

頭重視身此天柱骨倒元氣已敗死大便濁氣極臭者死目精正圓者死卵縮入腹脉見離經者死瘥後小便澁有血名曰內外瘡皆黑醬不出膿者死少陰下利止頭眩時時自冒者死熱盛躁急不得汗出是陽脉極死舌上黑胎生芒刺刮不去易生者死夏月可治鼻衄自汗者死胃寒發呃丁香柿蒂良姜湯調服脉不出加胆汁合生脉散其脉又不出或暴出者皆死

望色

昔肥今瘦主痰大肉脫去主不治平人消瘦主脾熱眼眶黑主內有痰鼻色青主腹中痛苦冷者死鼻色微黑者有水氣鼻色黃主小便難鼻色白者屬氣虛鼻色赤者

屬肺熱鼻色鮮明者有留飲鼻孔乾燥者必衄血鼻色燥如煙煤者是陽毒熱極鼻孔冷滑色黑者是陰毒冷極鼻流濁涕者屬風熱鼻流清涕者是肺寒鼻孔癰脹者屬肺熱有風唇口焦紅者吉唇口焦黑者凶唇口俱腫赤者是熱極唇口俱青黑者是寒熱唇口舌胎斷紋者難治唇口燥裂者是脾熱唇青舌捲者死唇吻色青者死環口鰲黑者死口張氣直出者死齒燥無津液者是陽明熱極前板齒燥兼脉虛者是中暑齒如熱者難治耳色黑枯燥者是腎憊目赤唇焦舌黑者屬陽毒目熏黃色暗者屬濕毒目黃兼小便利大便秘小腹痛滿痛者屬畜血目瞑者將欲衄血目之白睛黃兼冷無熱不渴脉沉細者屬陰黃兩眦黃者病欲愈凡開目見人者屬陽閉目不欲見人者屬陰睛昏不識人目反上視睛小瞪目直視目邪視目睛正圓戴眼反折眼胞陷下此八者皆死證目睛微定暫時稍轉動者屬痰目中不了了睛不和不明白者此因邪熱結實在內不了了者謂見一半目不見一半目是也舌腫者難治舌出者死面顴頰赤在午後此虛火上升不可作傷寒治面赤脉數無力此伏陰病其證煩躁引飲虛陽上升面赤脉沉細此少陰病外熱內寒陰盛格陽宜溫誤用寒涼者死面赤脉弦數此少陽病宜小柴胡和解緣面赤赤乃陽氣怫鬱在表汗不徹之故宜發汗面部通赤色此陽明表證未解不可攻裏宜解肌面唇青是陰寒極面赤兼舌捲囊縮亦是陰寒面青兼小腹絞痛是夾陰傷寒面目身黃兼小水短澀是濕熱面目身黃兼小腹滿硬痛小便利是畜血傷寒面白爲無神或汗多或脫血所致面白人不宜大汗黑氣在魚尾相牽入太陽者死黑氣自人中入口者死黑氣自

入耳目鼻舌者死面黑人在傷寒內涉虛不宜參朮大補

聞聲

聲清聲濁

病邪在表其聲清而響嘔病邪入裏其聲濁而不嘔

聲輕聲重

病在陽分其聲前輕後重病在陰分其聲前重後輕

聲斷聲續

病邪表淺併有餘陽證其聲續病邪入深併內傷不足其聲斷

言壯言怯

外感陽病有餘出言壯厲則寒熱交作內傷陰證不足出言懶怯則寒

熱間作

嘆

嘆是心變動之聲

欠

腎主欠陰氣積下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠也

噫

噫是心變動之聲是胸中氣不交通寒氣客于胃厥逆從上下復出于胃故爲

噫

噦

噦是腎變動之聲有病發噦是傷風或傷熱無病發噦是陽氣和滿於心

吞

吞是脾變動之聲

呃

其聲皆從胃中至胸隘間而爲呃有胃中實熱失下者有胃中痰飲者有服寒

涼藥過多者有胃中虛冷者

咳

咳是肺變動之聲俗呼爲嗽肺爲邪干氣逆不下也有肺寒咳者有停食咳者

有邪在半表半裏咳者

唏

陰氣實陽氣虛陰氣速陽氣遲陰氣盛陽氣絕故爲唏

怒 怒是肝變動之聲

歌 歌是脾變動之聲

哭 哭是肺變動之聲

笑 笑是心變動之聲

太息 憂思則心系急急則氣約氣約則不利故太息以伸屈之

錯語 意錯言亂自知言錯邪氣尚輕自不知覺此熱甚正氣衰

呢喃 病邪入輕則睡中發此聲也

聲嘶 肺有風熱

聲啞 聲啞唇口見生瘡是狐惑病有風熱傷心肺而聲啞者少陰病咽中生瘡者

有瘡病口噤者有熱病三四日不得汗出者死

口噤 口噤難言見手足攣摘是風瘖口噤不言難治陽明病渴欲飲水口噤舌乾

白虎加人參湯咽乾不可汗

舌哽舌短舌強 病邪入深主難治

口噤咬牙 是風瘖

喉中有聲 喉中噦噦有聲者是痰也

卒然無音 寒氣客於厭會則厭不能發發不能下至其開闔不便故無音

聲如鼻鼾 聲如鼻鼾者難治

久病耳聾 屬氣虛

咽喉不得息 寸脈微浮或沉伏胸中痞鞭氣上衝此胸中有寒宜吐之

鼻息如鼾睡 屬風溫

耳聾兼脇痛 宜和解寒熱咽而口苦屬少陽

耳聾兼耳腫耳痛 是少陽風熱

問因

口苦口甜 口苦是胆熱口甜是肝熱

舌乾口燥 是胃家熱極

心下滿 因下早致滿爲痞氣手按拍之有聲又與此停水手按則散此虛氣手按

鞭痛此宿食

喜明喜暗 喜明屬陽元氣實喜暗屬陰元氣虛

睡向壁向外 向壁屬陰元氣虛向外屬陽元氣實

病起覺不舒快少情緒否有此證是夾氣傷寒

病起覺倦臥骨腿酸疼脇痛否有此證是勞力傷寒要知病在肝經問婦人乳頭縮

不縮

耳聾 耳聾邪氣入深難治或兼虛證有少陽證不可不知

切生死形狀六經六絕脈

雀啄連來三五啄屋漏半日一點落彈石鞭來尋即散搭指散亂眞解索魚翔似有亦似無鰾遊靜中跳一躍寄語醫家仔細看六脉一見休下藥

一動一止兩日死兩動一止四日通三動一止六日亡四動一止八日事五動一止只十日十動一止一年去春草生時即死期二十一動二年住清明節後始傾亡三十動一止三年次立秋節後病則危四十動一止四年住小麥一熟是死期五十一動一止五年試草枯水寒時死矣此爲太素脉玄秘

左右手脉俱急緊盛是夾食傷寒

右手脉來空虛左手脉來緊盛是勞力傷寒

左手脉來緊盛右手洪滑或寸脉沉身熱惡寒隱隱頭痛喘咳煩悶胸脇體痛是夾痰傷寒

左手脉來緊濇右手脉沉數心胸脇下小腹有痛處是血鬱內傷外感

鬼脉 得病之初便讖語或發狂六部無脉大指之下寸口之上有脉動者是

反關脉 如病人六部無脉便不可言其無要在掌後切看脉來動者是

傷寒不可發汗

口燥舌乾者口苦咽乾者咽喉痛者吐血下血者淋血者小便淋瀝者大便瀉利者內傷勞倦者尺脉微弱者房勞陰虛者夢遺泄精者風濕者濕溫者中暑者瘡漏者

傷寒發汗不出燻法

用發表藥汗不出將蘇葉燒湯以器盛之至於被內兩膝下燻之又法用姜朮綿裹周身擦之其汗自出此良法也

傷寒汗出不住止法

將病人髮披在水盆中足冷于外用炒麩皮糯米粉龍骨牡蠣煨爲末和勻周身撲之其汗自止此良法也

傷寒可吐

胸中懊惱者喉中有痰聲者胸滿鬱鬱微煩者中風寒痰涎擁塞者乾霍亂心腹刺痛欲死者傷寒三四日邪在胸中者脉大胸滿多痰者下利日數行寸日脉滑者寸口脉沉伏或浮滑有痰者

傷寒不可吐

病人元氣虛羸者房勞陰虛者勞倦內傷者胎產崩漏者寸脉虛細弱無力者經水適斷適來者少陽胆病者

傷寒吐 不出探法

用梔子豉湯大瓜蒂散不得吐隨用三山丸合解毒散煎服再不吐將鵝羽在喉中探吐

傷寒吐不住止法

用炒糯米一撮生姜自然汁少許水煎服凡嘔吐止者亦用此二味入各藥中同煎服嘔吐自止如胃實嘔吐不可用

傷寒不可下

六脉虛細者嘔吐者腹中時滿時減者不轉屎氣者少陽胆病者腹如雷鳴者陽明面冷赤色者咽中閉塞者血氣兩虛者內傷勞倦者陰虛勞倦者經水適斷適來者

胎前崩漏者小便清白者夾陰面赤者心下鞭者脉雖大無力者

傷寒小便不通燻法

一切小便不利先將麝香半夏填患人臍中上用葱白田螺各搗爛成餅封於臍上用布帶縛住良久下用皂夾燒煙燻入陰中其水竇自通婦人亦用皂夾煎湯洗玉戶立通

傷寒胸膈不寬熨法

一切寒結熱結水結食結痞結血結痰結支結大小結胸痞氣結者俱用生姜搗爛如泥去汁取粗炒熱絹包漸漸揉熨心胸脇下其滿痛豁然自愈如姜查冷再入姜汁再炒再熨揉之以愈爲效惟熱結用冷姜查揉之不可炒熱醫當慎之又有傷寒嘔血將解未盡或熱極及吐血不盡醫不知其證遂用涼藥之劑止住其嘔血留結於心胸之分故滿痛而成血結胸也用加味犀角地黃湯

妊娠傷寒護胎治

用井底泥青黛伏龍肝各爲末調勻塗於孕婦臍中二寸許如乾再塗上以保胎孕也

到傷寒家不染病法

凡入病家須避其邪氣不使染着爲上以雄黃末塗鼻孔行動從客位而入男子病穢氣出於口女子病穢氣出於陰門其相對坐立之間必須識其向背

用藥寒溫合宜論

如麻黃得桂枝則能發汗芍藥得桂枝則能止汗黃芪得白朮則止虛汗防風得羌活則治諸風蒼朮得羌活則止身痛柴胡得黃芩則寒附子得乾姜則熱羌活得川芎則止頭疼川芎得天麻則止頭眩乾姜得天花粉則止消渴石膏得知母則止渴香薷得扁豆則消暑黃芩得連翹則消毒桑皮得蘇子則止喘杏仁得五味則止嗽丁香得柿蒂乾姜則止呃乾姜得半夏則止嘔半夏得姜汁則回痰貝母得瓜蒌則開結痰桔梗得升麻開提血氣枳實得黃連則消心下痞枳殼得桔梗能使胸中寬知母黃栢得山梔則降火豆豉得山梔治懊憹辰砂得酸棗則安神白朮得黃芩則安胎陳皮得白朮則補脾人參得五味麥門則生腎水蒼朮得香附開鬱結厚朴得腹皮開膨脹草果得山查消肉積神麴得麥芽能消食烏梅得乾葛則消酒砂仁得枳殼則寬中木香得姜汁則散氣烏梅得香附則順氣芍藥得甘草治腹痛吳茱萸得良姜亦止腹痛乳香得沒藥大止諸痛芥子得青皮治脇痛黃芪得大附子則補陽知母黃栢得當歸則補陰當歸得生地則生血姜汁磨京墨則止血紅花得當歸則活血歸尾得桃仁則破血大黃得芒硝則潤下皂夾得麝香則通竅訶子得肉果則止瀉木香得檳榔治後重澤瀉得猪苓則能利水殭蠶得白朮則能收濕此用藥相得之大端也

妊娠傷寒禁忌藥

蛇斑水蛭及蟲蟲
三稜代赭芫花麝

烏頭附子配天雄
大戟蛇蛻黃雌雄

野葛水銀并巴豆
礞石芒硝牡丹桂

牛膝薏苡與蜈蚣
槐花牽牛皂角同

半夏南星與通草 瞿麥乾姜桃仁通 礪砂乾漆蟹甲爪 地胆芽根都不中

蒸臍法 用麝香半夏皂莢末一字填患者臍中後用生姜薄荷貼于臍上放大艾火于姜片上蒸二七壯灸關元氣海二十壯熱氣通於內逼於外陰自退而陽自復矣

熨臍法 用葱頭縛一把切去葉留白根切餅二寸許連縛四五餅先將麝香硫黃二字填於臍中放葱餅於臍上以熨斗盛火于餅上熨之餅爛再換餅再熨熱氣入腹以通陽氣如大小便不利以利則止

中寒

中寒寒邪卒時直中陰經即病如中太陰脾經用藿香正氣散合理中湯寒甚加附子如寒中少陰腎經用五積散加茱萸寒熱足冷加附子四逆湯寒熱手足甲唇皆青舌卷囊縮脉伏絕者用蒸臍法及大劑姜附溫之不然則死矣

傷寒合病

三陽若與三陰合病即是兩感所以三陰無併合例也大抵傷寒二陽經合病必用二陽經藥合治三陽經合病必用三陽經藥合治

陰毒傷寒

咽喉不利致毒氣攻心如傷寒時氣得病一二日便結成陰毒或服藥後三四日或十餘日變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下脹滿硬如石短氣不息嘔逆唇青面黑四體如冰身如被杖其脉沉細而疾或伏絕用陰毒甘草湯先

進一服如人行十里再進一服取汗出乃愈蓋陰毒之氣隨汗而出也五六日可治七日不可治如湯藥不受面唇指甲皆青黑色或時鄭聲舌卷囊縮煩躁冷汗不止腰背眼痛此皆陰寒毒氣入深急用蒸臍法如手足溫煖卽止知人事者生灌入生姜汁照前用藥不可與涼劑悞服必死

夾陰傷寒

陰極發躁用四逆湯合生脉散入辰砂細茶白蜜冷服陰利用四逆湯加人參茯苓肉桂肉果砂仁木通燈心升麻少許服之虛陽伏陰用加減五積散冷服藥服下隘冷體既消熱性乃發熱因寒用也

寒疫

寒疫四時皆有之若初起病頭疼發熱增寒拘急或吐逆惡心中脘痞滿或飲食停留不化或腹中作痛未發熱者宜藿香正氣散加減治之若已發熱者十味薊蘇散汗之若身體痛骨節疼發熱者羌活冲和湯加蘇葱主之若有汗不得再發汗宜加減冲和湯主之若邪熱不解傳入裏變證者宜從正傷寒條內治之

大頭傷寒

若先發於鼻額紅腫以至兩目盛腫而不開并額上面部皆赤而腫者此屬陽明也或壯熱氣喘口乾舌燥咽喉腫痛不利脉來數大者用普濟消毒飲主之內實熱盛者用通聖消毒飲若發於耳之上下前後并頭角紅腫此屬少陽也或肌熱日晡熱潮熱往來寒熱口苦咽乾目疼脇下滿宜小柴胡加天花粉羌活荊芥連翹芩連主

之若發於頭上并腦後項下及目後赤腫者此屬太陽也宜荊芥敗毒散主之若三陽俱受邪併於頭面耳目鼻者以普濟消毒散外用清涼救苦散敷之治法當先緩後急則邪伏也先緩者宜退熱消毒虛人兼扶元氣胃虛食少者宜助胃氣候其大便內熱甚以大黃下之拔其毒根此緩之法蓋此毒先腫於鼻額次腫於目又次腫於耳從耳至頭上絡後腦結塊則止不散必膿也普濟消毒飲如無板藍根用大青或青黛虛人脈弱加人參引至毒處加皂角刺胃弱食少加白朮橘紅如大便不通加酒浸大黃服後就臥使藥氣上行內熱用荊芥則毒散加酒炒黃芩熱盛加酒炒黃連口渴加天花粉凡頭面腫盛目不開鼻塞悶口乾舌燥內外有熱或咽喉腫痛不利或內實大便秘結脈洪數煩渴宜用通聖消毒散不消加牛蒡子玄參或生犀角水姜汁服凡時毒頭面赤腫咽喉隘堵寒水藥不受若臟腑素有積熱發爲腫毒疔瘡一切惡瘡紅腫並宜漏蘆湯大便實加大黃芒硝凡雷頭風頭面疔瘡腫痛增寒壯熱四肢拘急狀似傷寒用清震湯治咽喉腫病用綠雲散以細竹管吹人喉中病處

食積

身不痛惡食噯氣作嘔欲吐不出惡心短氣痞滿腹脹胃口痛按亦痛

中濕類傷寒

太陽病關節疼痛脈沉細者此名濕痺其人小便不利大便反快但常利小便凡濕病頭汗出背強欲得被覆向火胸滿小便不利舌上白胎者此丹田有熱胸中有寒

渴欲得水而不飲則口燥煩也若誤下則噦爲難治若下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死也

痰證類傷寒

如病人目睛微定暫時轉動目如炭煤昔肥今瘦喘嗽轉側半難臂痛皆痰證也痰在上部寸口脉浮滑痰在中部右關脉滑大痰在下部尺脉洪滑或痰飲發寒熱胸滿氣粗語出無論此夾痰如見崇用二陳湯加蘇子枳實芩連瓜蒌貝母桔梗山梔前胡姜汁調辰砂溫服

內傷瘀血證發熱狀類傷寒

或被踢打相撲閃肭一時不覺過至半日或一二三日而發者有至十數日半月一月而發者胸脇小腹滿痛手不可近者而發寒熱此有瘀血也或一時傷重就發寒熱瘀血上冲則昏迷不省如死之狀良久復甦輕則當歸導滯湯重則桃仁承氣湯加蘇木紅花牛膝桔梗姜汁量其元氣下其瘀血自愈

嗽水不欲嚥

嗽水不欲嚥者此屬陽明胃熱也欲飲不欲嚥是邪熱循經裏無熱也陽明氣血俱多熱逐血妄行作衄但欲嗽水不欲嚥口燥者用犀角地黃湯外無寒熱喜妄如狂小便自利大便秘色口燥舌乾但嗽水不欲嚥者此有瘀血結於下焦宜桃仁承氣湯下盡黑物則愈少陰證脉沉細手足冷或時煩燥渴嗽水不欲嚥者宜四逆湯下利厥逆無脉乾嘔煩渴嗽水不欲嚥下宜白通湯加猪胆汁入人尿煮之厥陰虺厥

煩燥吐衄口燥舌乾但欲凉水浸舌并口唇時不可離不欲嚥下宜理中湯加烏梅花椒主之大抵陰證發躁煩渴不能飲水或欲勉強飲下良久誠復吐出或飲水而嘔噦者皆內寒也宜四逆湯溫之蓋無根失守之火遊於咽隘之間假作燥渴則不能飲水也

晝夜偏劇

凡病晝靜夜劇者熱在血分宜四物湯加黃柏知母芩連山梔丹皮與柴胡主之若夜靜晝劇此熱在氣分宜小柴加山梔連母地骨主之

心下滿

傷寒心下滿者當心下高起滿硬者是也不經下後而滿者則有吐下之分若下後心滿者有結胸痞氣之別若發熱者以小柴胡加枳實姜炒黃連去黃芩治之若按之拍拍有聲而軟者此停水五苓散主之若按之硬痛者有宿食也輕則消導重則用承氣下之寒在胸中心下滿而煩飢不能食宜瓜蒂散吐之陽明病心下滿硬者不可下下之則利不止者死脉浮大有力心下硬有燥渴譫語大便秘實者此屬臟病宜攻之此言屬臟者宿屎在臟也故下之若食在胃口未入於胃未可下也大抵腹中滿心下滿胸中滿俱不可用甘草糖棗甘甜之物蓋甘能補氣填實故也外用姜擦法甚良

遺尿

遺尿者小便自出而不知也大抵熱盛神昏遺尿者可治若陰證下寒逆冷遺尿脉