



增輯傷寒類方目錄

卷三

瀉心湯類七方十一

白虎湯類八方三

五苓散類九方四

四逆湯類十方十一

理中湯類十一方九



生姜瀉心湯歌

汗餘痞證四。生姜。芩草。人參。三兩行。一兩。乾姜。棗。十二。一連。半夏。半升。量。按。太陽。為。寒。水。之。經。寒。水。之。氣。傷。於。外。者。可。從。汗。而。解。之。寒。水。之。氣。入。於。裏。者。不。能。從。汗。解。之。汗。出。解。後。而。所。現。之。證。俱。屬。水。氣。用。事。為。本。條。之。的。證。惟。心。下。痞。鞭。為。諸。瀉。心。法。統。共。之。證。陳。平。伯。云。君。生。姜。之。辛。溫。善。散。者。宣。洩。水。氣。復。以。乾。姜。參。草。之。甘。溫。守。中。者。培。養。中。州。然。後。以。芩。連。之。苦。寒。者。滌。熱。洩。痞。名。曰。生。姜。瀉。心。賴。以。瀉。心。下。之。痞。而。兼。

瀉心湯類七

生姜瀉心湯

生姜

四兩

甘草

炙

人參

黃芩

三各

兩

半夏

半升

黃連

乾姜

各一兩

大棗

十二枚

右八味以水一斗煮取六升去渣

煎取三升溫服一升日三服

擅補中散水之長也。倘無水氣。必不用半夏。生姜之辛散。不涉中虛。亦無取乾姜參草之補中。要知仲景瀉心湯有五。然除大黃黃連瀉心湯正治之外。皆隨證加減之方也。

傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞鞭。

乾噫。食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴下利。

者。生姜瀉心湯主之。

汗後而邪未盡。必有留飲在心下。其

症甚雜。而方中諸藥。一一對症。內中又有一藥治兩症者。亦有兩藥合治一症者。錯綜變化。攻補兼施。寒熱互用。皆本內經立諸方法。其藥性又有與神農本草所載無處不合。學者能於此等方講求其理。而推廣之。則操縱在我矣。○凡

甘草瀉心湯歌

下餘痞作腹雷鳴。甘四姜
芩三兩平。一兩黃連半升
夏棗枚十二。擘同煎。陳平
伯曰。心下痞本非可下之
實熱。但以妄下。胃虛客熱
內陷。上逆。心下耳。是以胃
氣愈虛。痞結愈甚。夫虛者
宜補。故用甘溫以補虛。客
者宜除。必藉苦寒以泄熱。
方中倍用甘草者。下利不
止。完穀不化。非此稟九土
之精者。不能和胃而緩中。
方名甘草瀉心。見泄熱之

瀉心諸法。皆已汗。
已下。已吐之餘疾。

甘草瀉心湯

二 卽生姜瀉心湯。去人
參。生姜。加甘草一兩。

甘草

四兩

黃芩

乾姜

各三兩

半夏

半升

黃連

一兩

大棗

十二枚

右六味。以水一斗。

煮取六升。去渣。再煎。取三升。溫服一升。

日三服。

品得補中之力。而其用始
神也。○此伊尹湯液所製
治狐惑蝕於上部則聾啞
者。方有人參三兩。

傷寒中風醫反下之。其人下利日數十

行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞鞭而滿。乾

嘔。心煩不得安。醫見心下痞。謂病不盡

復下之。其痞益甚。此非熱結。但以胃中

虛。兩次誤下。故用甘草以補胃而痞自

除。俗醫以甘草滿中。爲痞嘔禁用之

藥。蓋不知虛

實之義者也。客氣上逆。故使鞭也。甘草

半夏瀉心湯歌

三兩姜參炙草芩。一連痞
證嘔多尋。半升半夏棗十
二。去渣重煎。守古箴。按師
於此證。開口卽云傷寒五
六日。嘔而發熱。柴胡證俱
在者。五六日乃厥陰主氣
之期。厥陰之上。中見少陽。
太陽之氣。欲從少陽之樞。
以外出。醫者以他藥下之。
心下滿而鞭痛者。爲結胸。
但滿而不痛爲痞。痞者否
也。天氣不降。地氣不升之

瀉心湯主之。

半夏瀉心湯

三

半夏

半升

黃芩

乾姜

甘草

人參

各三兩

黃連

一兩

大棗

十二枚

右七味。

以水一斗。煮取六升。去渣。再煎。取三升。

溫服一升。日三服。

義也。芩連大苦以降天氣。姜棗人參辛甘以升地氣。所以轉否而為泰也。君以半夏者。因此證起於嘔。取半夏之降逆止嘔如神。亦即小柴胡湯去柴胡加黃連。以生姜易乾姜是也。古人治病不離其宗如此。

傷寒五六日。嘔而發熱者。柴胡湯症具。

而以他藥下之。柴胡證仍在者。復與柴

胡湯。此雖已下之。不為逆。必蒸蒸而振

卻發熱汗出而解。本症仍在。則即若心

滿而不痛者。此為痞。又指不痛二字。痞症尤的。柴胡

不中與之。宜半夏瀉心湯。以上三瀉心之藥。大半皆

大黃黃連瀉心湯歌

痞證分岐辨向趨。關浮心
痞按之濡。大黃二兩黃連
一。麻沸湯調病緩驅。按心
下痞。按之濡而不鞭。是內
陷之邪。與無形之氣。搏聚
而不散也。脈浮在關以上。
其勢甚高。是君火亢於上。
不能下交於陰也。此感上
焦君火之化。而為熱痞也。
方用大黃黃連。大苦大寒
以降之。火降而水自升。亦
所以轉否為泰法也。最妙

大黃黃連瀉心湯

四

本於柴胡湯。故其所治之症。多與柴
胡症相同。而加治虛治痞之藥耳。

大黃

二兩

黃連

一兩

右二味

以麻沸湯

二升漬之。須臾絞去渣。分溫再服。

此又
法之

最奇者。不取煎而取泡。欲其

輕揚清淡。以滌上焦之邪。

脈浮而緊。而復下之。緊反入裏。則作痞。

在不用煮而用漬。僅得其
無形之氣。不重其有形之
味。使氣味俱薄。能降而即
能升。所謂聖不可知之謂
神也。

緊脈爲陰。此所謂病發
於陰。下之作痞是也。按之自濡。但氣

痞耳。并無脇
下之水。心下痞按之濡。其關上浮

者。邪氣
甚高。大黃黃連瀉心湯主之。

傷寒大下後復發汗。再
誤。心下痞惡寒者。

表未解也。不可攻痞。當先解表。表解乃

可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜此湯。
詳見

附子瀉心湯歌

一枚附子瀉心湯。一兩連
芩二大黃。汗出惡寒。心下
痞。專煎輕瀆。要參詳。按心
下痞。是感少陰君火之本
熱也。復惡寒者。復呈太陽
寒水之本寒也。汗出者。太
陽本寒甚。而標陽太虛。而
欲外撒也。治傷寒以陽氣
為主。此際豈敢輕用苦寒。
然其痞不解。不得不取大
黃黃連黃芩之大苦大寒。
以解少陰之本熱。又恐亡

前桂枝
類中。

附子瀉心湯

五

大黃

二兩
酒浸

黃連

炒

黃芩

炒各
一兩

附子

一枚
去皮

別煮
取汁

右四味。切三味。以麻沸湯二升漬

之。須臾絞去渣。內附子汁。分溫再服。

此法

更精。附子用煎。三味用泡。扶陽欲其
熱而性重。開痞欲其生而性輕也。

陽在卽急取附子之太溫以溫太陽之標陽並行不悖分建奇功如此最妙在附子專煮扶陽欲其熟而性重三黃湯漬開痞欲其生而性輕也

黃連湯歌

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯

主之

此條不過二語而妙理無窮前條發汗之後惡寒則用桂枝此條汗

出惡寒則用附子蓋發汗之後汗已止而猶惡寒乃表邪未盡故先用桂枝以去表邪此惡寒而仍汗出則亡陽在卽故加入附子以回陽氣又彼先後分二方此併一方者何也蓋彼有表復有裏此則祇有裏病故有分有合也

黃連湯

六 卽半夏瀉心湯

去黃芩加桂枝

腹疼嘔吐。藉樞能。三兩參。甘夏半升。連桂乾姜各三兩。棗枚十二。妙層層。王晉三曰。此即小柴胡湯變法。以桂枝易柴胡。以黃連易黃芩。以乾姜易生姜。胸中熱嘔吐。腹中痛者。全因胃中有邪氣。阻遏陰陽升降之機。故用人參大棗乾姜半夏甘草。專和胃氣。使入胃之後。聽胃氣之上下敷布。交通陰陽。再桂枝宣發太陽之氣。載黃連從上焦陽分瀉熱。不使其深入太陰。有礙虛寒腹痛。

黃連 甘草 乾姜 桂枝 去

各三 人參 三兩 半夏 半升 大棗 十二枚 石

七味以水一斗。煮取六升。去渣溫服一

升。日三夜二服。

傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲

嘔吐者。黃連湯主之。諸瀉心之法。皆治心胃之間。寒熱不

調全屬裏症。此方以黃芩易桂枝。去瀉心之名。而曰黃連湯。乃表邪尚有一分未盡。胃中邪氣尚當外達。故加桂枝一味。以和表裏。則意無不到矣。

黃芩湯 七

黃芩 三兩

甘草 炙

芍藥 各二兩

大棗 十二

枚 右四味。以水一斗。煮取三升。去渣。溫

服一升。日再夜一服。

黃芩加半夏生薑湯歌

棗枚十二守成箴二兩芍
甘三兩芩利用本方嘔加
味姜三夏取半升斟按仲
景凡下利證俱不用芍藥
惟此方權用之以泄陷裏
之熱非定法也。張令韶
曰此治太陽與少陽合病
而下利與嘔也。合者彼此
合同非如併者之歸併於
此也。太陽主開少陽主樞
太陽不能從樞以外出而
反從樞以內陷故下利與
黃芩湯清陷裏之熱而達
太陽之氣於外若嘔者少
陽之樞欲從太陽之開以
上達也故加半夏生薑宣

黃芩加半夏生薑湯

黃芩 三兩
甘草 炙
芍藥 各二兩
半夏 半升

生薑 三兩
大棗 十二枚
右六味以水一斗

煮取三升去渣溫服一升日再夜一服

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯

若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之。下利即專



達其逆氣。以助太陽之開。

乾姜黃連人參湯歌

參連苦降藉姜開濟以人
參絕妙哉。四物平行各三
兩。諸凡拒格此方該。按傷
寒本自寒下者。以厥陰之
標陰在下也。醫復吐下之。
在下益寒。而反格熱於上。
以致食入即吐。方用乾姜
辛溫以救其寒。芩連苦寒
降之。且以堅之。然吐下之

於治利。不雜以風寒表藥。此亦急當救
裏之義。若嘔亦即兼以止嘔之藥。總之
見症施治。服藥後而本症愈。復見
他症。則仍見症施治。可推而知也。

乾姜黃連黃芩人參湯

九

乾姜

黃連

黃芩

人參

各三

兩

右四味。以水六升。煮取二升。去渣。分

溫再服。



後陰陽兩傷。胃氣索然。必藉人參以主之。俾胃氣如分金之爐。寒熱各不相礙也。方名以乾姜冠首者。取乾姜之溫。能除寒下。而辛烈之氣。又能開格而納食也。家君每與及門論此方。及甘草附子湯。謂古人不獨審病有法。用方有法。卽方名中藥品之前後。亦寓以法。善讀書者。當讀於無字處也。

旋復代赭湯歌

旋復代赭湯

十

傷寒本自寒下。本症。醫復吐下之。誤。寒格治。

更逆吐下。若食入口卽吐。乾姜黃連黃

芩人參湯主之。此屬厥陰條。寒格自用乾姜。吐下自用芩連。因

誤治而虛其正氣。則用人參分途而治。無所不包。又各不相礙。古方之所以入

化也。