

拾遺

閃腰、廣木香末、納鼻取嚏。又挫閃腰痛如錐刺者，瘀血也。懷牛膝五兩，脂蒲黃當歸各三錢，砂仁、川芎各一錢，水一大碗，煎至半碗，加陳酒兩碗，再煎三五滾，暢飲，以手摩痛處。待閃挫腰痛不能俯仰者，立直在前面，以細竹度至臍，即斷截竹，乃度背脊，用筆圈出灸之，隨年幾歲燒艾幾次，灸畢，自己一人私自藏好竹，勿令人知之。待腎虛腰痛，匾板栗子風乾，每早枕邊放七個，細細嚼吃。又猪羊腰子，杜仲水和酒煮食。又杜仲^{姜汁炒}破故紙各四兩，胡桃三十個，為末，姜汁鍊。



北京中醫藥大學圖書館版權所有

蜜為丸，鹽湯下一百立。待摩腰法：附子、火、烏頭、火、天南星、川椒、吳茱萸、丁香、樟腦、官桂、乾姜等分，紅靈丹一服為末，蜜丸，桂圓大，每日飯後生薑汁化開一丸。掌中摩兩腰，必令藥盡著實腰上，乃烘熟棉衣綑縛定腰。待蜈蚣上半截通腰以上水腫，下通下，炙研酒下。待

手 指臂掌甲

手掌煩熱

二

指頭寒

五

或但臂不遂者

二

拾遺

心虛手振、酒客手振、均難治。初起必強用力忍住之、
勿令振慣。（親）天蛇頭疔、文專用神燈照法。百五十八頁小字內
令作膿擠盡、搽升藥、貼清涼膏。雖指甲脫去、一月內必復生好。若信用刀針敷藥、必傷指成殘廢。甚者疔毒內陷而死。托盤疔治同。（親）鷺爪風、俗名油灰指甲。
熱燒酒浸軟、塗白鳳仙花根、一年弗經鐵器、脫下而愈。（待）臂痛、薑黃羌活獨活川芎當歸白朮甘草桑枝桂枝白芍等分、水和酒煎服。（待）



北京中醫藥大學圖書館版權所有

足 膝脛肘

獨足腫大 又脛冷 又脚腫如脫 肘腫按之沒指

言 膝脛拘急者 兩脛自冷 兩脛拘急 又

虛則兩脛攣 上氣脚縮



北京中醫藥大學圖書館版權所有

拾遺

夏秋間爛脚百廿三頁小字
腫大白礬二兩三尺下老泥浸水二三十碗加杉木
十數片煎水傾杉木桶內浸沒足踝留一半水勿下
火以備冷則添入上身圍大被令汗出又杉木節橘
皮大腹皮木瓜栝榔等分童便三升煎服又木瓜杉
木節研末酒調敷脰腫處若痛甚用針刺出血又赤
小豆煮鯉魚吃又服瓜蒂散又灸足三里穴
足筋弛縱不能步若服蒼朮黃柏牛膝等不效乃脾
弱也玉燭即姜蕤二兩為君杜仲狗脊當歸黃芪黨

參白朮懷牛膝各兩許、或加虎骨鹿筋水和酒各半煎膏服。待流注生足膝肘皮裏膜外似核而成串者、初起用葱炒熟熨之內服赤芍木通白芷首烏松壳苗香烏藥當歸甘草獨活等分、文加柴胡桂枝桑枝懷牛膝苡仁丝瓜絡乳香木瓜刺蒺藜九味同煎、又剛炭灰火硝白礬酒調塗、近葯店合芋芳丸子多服、令人吐血、慎用。親脚心下起水晶泡、乃濕熱出路、勿治之、擠破出黃水、自愈。親雞眼膏生白菓打爛入桐油熬枯、去渣取油、加雄黃少許、攤皮紙上、先將雞眼用熱水泡軟、乃貼、有紅絲拔出、又生葱汁亦可貼。待炭棗大棗去核貼、候棗爛、乃去之。待指甲縫成疽、陳皮煎湯浸透、甲肉自離、可剪去之、又細茶嚼爛敷。

之待右脚縮大腸癰左小腸苡仁附子敗醬散認又
甘草滑石多服又地榆半斤甘草二兩金銀花兩水
和酒各半煎空心服待縮脚痕一名附骨疽骨內痛
甚與縮脚腸癰自異耳有寒熱每生於腿上內雖痛
甚外皮色不變用白芥子艾絨紫蘇乳香煎洗渣炒
熱熨縛痛處內服桂枝附子白芍各錢半生甘草木
瓜各七分熟地懷牛膝各五錢乳香去油沒藥各二分水
和酒各半煎服自消待添小金蓮方細辛丁香等分
皮硝四兩浸兩足搗淨將上菊末研末先用開水泡
裏一次灑一次脚帶上亦多灑三日浸皮硝一次凡
百日包小兒不痛不生雞眼待上二藥末亦治凍瘡
痛待

手足

手足三部脉皆至

四

四肢微急

六

手足泯然汗

出者

晷

手足𦵏𦵏汗出

三

手足自温者

然

手

足反温

又

手足寒

半

手足煩𦵏

𦵏

手足盡𦵏者

允

手足躁擾

𦵏

手足厥者

三

手足冷

允

手

足厥冷

又

手足厥寒

三

手足厥逆

八三

手足逆冷

九五



北京中医药大学图书馆版权所有

合

手足厥冷無脉者九

四肢拘急醕

四肢六

重三

即重不勝醕

四肢苦重醕

四肢聶聶動

者醕

四肢煩痛六

四肢歷節痛醕

手足不仁

入言

時瘕癡醕

臂脚直醕

拾遺

四肢不舉名行痺脾實也甜瓜子一兩煎服待手足

破裂膏藥脂熔敷又時以紅棗肉擦之（待）

氣

以衛氣不共營氣諧和故爾三然以營氣不足又

當和胃氣廿客氣動膈十三其氣上衝者十二氣

從少腹上衝心者廿治其氣衝廿噫氣不除者



又

外氣怫鬱世

少氣氣逆欲吐醜

氣上衝胸醜

伏氣之病醜

動氣醜

咳而上氣醜

但氣痞

耳先

但苦少氣醜

胸中氣塞言

水氣病醜

拾遺

凡有肝胃氣者切忌吃糯米粉食點心菱肉麵筋親
肝胃氣方紅棗肉七枚陳皮生薑各三錢水煎服屢
見奇效待凡治肝氣及心滿仲景胸痺心痛短氣篇

氣血

三百廿六

方法甚效不可不讀親

血

衄乃解其

兼衄於

春至夏衄者太陽

詰吐血

病詰

血自下其

下血譫語者其必動其血金

必便血也

又便膿血者其

必圜血其

先便先血



南京中医药大学图书馆版权所有

訣

經水適來

三

名曰血崩

婦人有漏下

三

浴水赤

則尿血

拾遺

吐血或痰中牽紅用棉花指其血燒灰或自己清白
 小便或童便或陳酒化下除根親又雞蛋一个打一
 孔倒去黃及白只用空殼打鮮茅根去心將茅根裝
 滿在蛋殼內飯上蒸之殼中有清露甜如蜜隨孔呼
 吃照做七八个多做吃尤妙此文岳母周宜人所授

血

三首其



神方也。親下血小腸有寒也。薑歸六味湯主之。方見
十頁小字內。親又地榆去皮獨取上截梢自行炒成炭研
服止腸風血痢。下時漉漉有聲者。待諸惡瘡血出不
止寒水石細末摻之。待生漆燒灰化瘀血為水。待白
芍炙甘草同煎服。大補陰血舒筋急。親血氣痛如錐
刺五靈脂蒲黃各三錢研服一錢。名失笑散。親鼻血
若在傷寒名衄。俗名轉紅汗。聽其多出勿治之。若平
人用紙緊塞鼻孔。勿令多流為第一妙方。陳墨燈草
頭髮浸冷水血點大眼角。銅錢做枕頭。諸方均不若
也。親又出血過多面白急服黃芪黨參懷牛膝白芍
炙甘草等分。若惡熱加炒黑黃芩粉丹皮惡寒加炮
墨薑製附子。待。

精

精自出

又

男子亡血失精

又

精氣清冷

能

夢失精

歌

拾遺

男子常服濃薤棗湯治精氣清冷若能節慾便為

精

三百廿



北京中医药大学图书馆版权所有

種子神丹親大病後忽遺精乃餘邪盡去大吉之兆
勿胆怯亦勿服藥可服薑棗湯親素有遺精者當晚
眠早起勤於做事切忌貪睡第二覺若未娶妻及久
客者及早完姻同房為要蓋九竅宜通暢若信服國
璫藥久久成癆瘵親治遺精法臨臥並緊兩足直立
牀前吸氣三口使丹田之氣直上送至腦丸凡三次
吸氣九口乃脫襪以手足心互相摩擦左右各百遍
乃臥勿多覆兩足親據說荷葉研末酒服止遺精待

汗津液

熱熱微似有汗者二 其人熱熱汗出入

手足

然汗出者_兕發熱汗多者_兕喘而汗出者_土

汗出而渴_土發汗遂漏不止_六發汗過多_{廿三}

汗出多者_曲復極汗出者_{世二}目合則汗_又若自汗

出者_{百二}但頭汗出_{十五}陰不得有汗_又今頭汗出

