

唐千金類方

上海千項堂書局發行

嚴茹經著

後學三水黃恩榮幹南編述

三男 中醫藥學專門畢業  
東南醫科大學學士 悅君校對  
學生 廣州中醫藥實驗館專門畢業陳景山 覆校

大腸腑脉論第一

大腸腑虛實第二

肛門論第三

皮虛實第四

欬嗽第五

痰飲第六

九蟲第七

濕蟲附

大腸腑脉論第一

論大腸腑

論曰。大腸腑者。主肺也。竄柱中央。是其候也。肺合氣于大腸。大腸者。為行道傳瀉之腑也。號監倉掾。重二斤十二兩。長一丈二尺。廣六寸。當腑右回疊積。還反十二曲。貯水穀一斗二升。主十二時定血脈。和利精神。千金明堂外臺同難經云。長二丈一尺。大四寸。徑一寸之少半。十六曲。盛穀一升半。水七鼻。遂以長以候大腸。

肺應皮。皮厚者大腸厚。皮薄者大腸薄。皮緩腹裏大者。大腸緩而長。皮急者。大腸急而短。皮滑者。大腸直。皮肉不相離者。大腸結。

### 論大腸病

大腸脹者。腸鳴而痛。寒則泄食不化。

大腸有寒。驚瘡有熱。便腸垢。

大腸有宿食。寒慄發熱。有時如瘡狀。

肺前受病移于大腸。肺欬不已。欬則遺矢。便利。厥氣容于大腸。則夢田野。

扁鵲云。手太陰與陽明為表裏。大腸若病實則傷。熱熱則脹滿不通。口為生瘡。食下入腸。腸實而胃虛。食下胃。胃實而腸虛。所以實而不滿。乍實乍虛。乍來乍去。虛則傷寒。寒則腸中雷鳴泄青白之利。而發于氣水根在大腸。方在治水篇中。即第十二卷水腫門治大

腸水

大腸絕不治。何以知之。泄利無度。利絕則死。

### 論大腸經脉

手陽明之脈。起于大指次指之端外側。循指上廉出合谷兩骨之間。上入兩筋之中。循臂上廉。上入肘外廉。循臑外前廉上肩。出髃骨之前廉。上出柱骨之會。上下入缺盆。絡肺下膈。屬大腸。其支者。從缺盆直而上頸。貫頰。入下齒縫中。還出俠口。交人中。

乾。乾。亟。嘔。痺。肩。前。膿。痛。大。指。次。指。痛。不。用。氣。盛。有。餘。則。當。脈。所。過。者。熱。腫。虛。則。寒。慄。不。復。盛。者。則。人。迎。大。三。倍。於。寸。口。虛。者。則。人。迎。反。小。於。寸。口。也。

### 大腸經刺法

右手關前寸口陽絕者無大腸脉也苦少氣心下有水氣立秋節即欬

巢源大腸象  
金王于秋

刺手太陰在魚際間

右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如針刀所刺無休息時刺手陽明治陽在手腕中瀉之



试读结束，需要全本PDF请购买 [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

大腸虛實第二灸法七首 方二首

大腸實熱

右手寸口氣口以前脉陽實者。手陽明經也。病苦。腸滿善喘。熱面赤。陽明上於面身熱。喉咽中如核狀。太陽脈上頭名曰大腸實熱也。

生薑泄腸湯 治大腸實熱。腹脹不通。口為生瘡者。

生薑

橘皮

青竹茹

黃芩

梔子仁

白朮

各三兩

桂心

一兩

茯苓

芒消

各三兩

生地黃

十兩

大棗

十四枚

右十一味㕮咀以水七升煮取三升去滓下芒消分二服。

大腸主津所生病其氣有餘寒氣客之則熱熱則實腹不通口為生瘡。生薑泄腸湯。桂心生薑大棗散風寒。竹茹梔子黃芩泄腸熱重用生地滋燥火橘皮利水穀經本

白朮茯苓行津液而腸不通口為生瘡以除。

灸法

腸中臚脹不消。灸大腸輸四十九壯。

大腸有熱。腸鳴腹滿。俠脅痛。食不化。喘不能久立。巨虛上廉主之。

大腸虛冷

右手寸口氣口以前脉陽虛者。手陽明經也。病苦胸中喘。腸鳴虛歎。脅乾目急。善驚。上熱泄白寒。名曰大腸虛冷也。

黃連補肺湯 治大腸虛冷。痢下青白。腸中雷鳴相逐。

黃連

四兩

茯苓

芎藭各三

酸石榴皮五片

地榆

五兩

伏龍肝

雞子一枚

右六味咬咀

以水七升

煮取二升半

去滓下伏龍肝末

分三服

大腸主津所生病其氣不足寒氣客之則冷。冷則虛。痢下青白。腸中雷鳴相逐。黃連補肺湯。芎藭散血寒。黃連地榆解病毒。石榴皮伏龍肝固腸滑。茯苓行津液而痢下青白。腸中雷鳴亦除。

幹南按 大腸實熱用瀉虛冷用補此恒法也。千全於實熱却用生薑桂心於虛冷却用黃連地榆論者疑焉不知大腸合肺。肺熱蒸冷裏熱表寒泄腸之所以用薑桂也。大腸屬金。金衰木乘下寒上熱補腸之所以用連榆也。

灸法

腸中雷鳴相逐。痢下。灸承滿五十壯。穴在俠巨闕相去五寸。巨闕在心下一寸。灸之。灸巨闕兩邊各二寸半。

飲食不下。腹中雷鳴。大便不節。小便赤黃。陽經主之。

腹脹。腸鳴。氣上衝胸。不能久立。腹中痛。澀澀。冬日重。感於寒則泄。當腑而痛。腸胃間遊氣切痛。食不化。不嗜食。身腫。俠脇急。天樞主之。

腸中常鳴。時上衝心。灸腑中。

腸鳴而痛。溫留主之。



論曰。肛門者。主大行道。肺。大腸候也。號為通事令史。重十二兩。長一尺二寸。廣二寸。二分。應十二時。若臟<sub>腸</sub><sub>裏</sub>言傷熱。則肛門閉塞。大行不通。或腫縮入生瘡。若肺<sub>腸</sub>言傷寒。則肛門開大。行洞瀉。肛門凸出。良久乃入。熱則通之。寒則補之。虛實和平。依經調之。方在第二十四卷中。解毒並雜治

脫肛第六

幹南按。脫肛第六。內載肺熱。肛門熱閉塞。或腫縮銳通方。用白蜜煎令燥為丸。長六七寸。納肛門中。即竈導煎法。取潤利。大腸寒。肛門寒。洞泄或滯出。猪肝散用。猪肝合黃連阿膠烏梅。芎藭艾葉。即上黃連補肺湯法。取苦燥一則治塞。以通。通因塞用。一則治寒。以熱熱因寒。用大腸為肺出路。肛門又為肺大腸出路。實熱虛寒。治法妙用不同而同。可參祕旨。



論曰夫五臟六腑者。有寒內應骨髓外合皮毛膚肉。若病從外而生。沂然起毫則皮毛膚肉。絡脈不通。內陰陽不關而外格。強急不若病從內而發。則骨髓疼痛。然後肉爛脰破。毛直論。見內經皮部其病源皮之虛實由肺不可不詳之也。皮虛者多熱。凡皮虛實之應。主於肺大腸。之虛實然病發於皮毛。而實應於臟腑。陰虛生內熱故熱則應臟陽虛生外寒故寒則應腑。

葫蘆蒸湯 治皮虛主大腸病寒氣關格。

葫蘆根葉切三 葛蒲葉切二 桃葉皮枝切三

細糠一斗

秫米三升

右五味以水一石五斗煮取米熟為度。大盆器貯之於盆上作小竹牀子罩盆。人身坐牀中四面周迴。將簾幕障風。身上以衣被蓋覆。若氣急時。開孔對中泄氣。取通身接汗。可得兩食久許。如此三日蒸還溫藥足汗用之。若盆裏不過熱。盆下安炭火。非但治寒。但是皮膚一切勞冷。悉皆治之。

肺病多作皮寒。熱肺與大腸合。寒則應腑。大腸受之。大腸病寒氣關格。內關外格。絡脈不通。皮膚勞冷。葫蘆蒸湯。葫蘆葛蒲治風寒濕痺。桃葉皮枝行皮膚滯血。重以細糠之通腸胃滑肌膚。秫米之治寒熱利大腸。利大腸者肺之穀。別錄治寒熱。千金肺瘡方用之。煮汁蒸汗。由皮毛透入。

腠理大腸病去。而寒氣鬪格自除。

梔子煎 治皮實主肺病熱氣

梔子仁

枳實

大青

杏仁

柴胡

芒硝各二兩

生地黃

淡竹葉

切各一升

生玄參

五兩

石膏八兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升去滓下芒硝分為三服。

肺病多作皮寒。熱肺與大腸合。熱則應。臟肺受之。肺病熱氣怫鬱。皮膚厚實。梔子煎。梔子大青石膏清肺火。生地玄參滋肺液。柴胡竹葉杏仁疏肺表。枳實芒硝通肺裏。由陽胃達出。皮毛肺病除。而熱氣怫鬱自解。

論曰。經云五臟六腑皆令欬。肺居外而近上。合於皮毛。皮毛喜受邪。故肺獨易為欬也。邪客於肺。則寒熱。上氣喘。汗出。欬動肩背。喉鳴。其則唾血。肺欬經久。不已傳入大腸。其狀欬則遺糞。腎欬者。其狀引腰背痛。甚則欬涎。腎欬經久。不已傳入膀胱。其狀欬則遺尿。肝欬者。其狀左脅痛。甚者不得轉側。肝欬經久。不已傳入膽。其狀欬則清苦。汁出心欬者。其狀引心痛。喉中介介如梗。甚者喉痺咽腫。心欬經久。不已傳入小腸。其狀欬則失氣。脾欬者。其狀右脇痛。陰引肩背。甚者不得動。動則欬劇。經久。不已傳入胃。其狀欬而嘔。嘔甚則長蟲出。久欬不已。三焦受之。三焦欬之狀。欬而腹滿。不能食飲。以上言五臟之欬。傳於六腑。自裏而表。由陰而陽。此皆聚於胃。關於肺。使人多涕唾而面浮腫。氣逆也。若順時。有風寒冷。人觸冒解脫。傷皮毛間。肺與大腸皆合皮毛。入臟腑。為欬上氣如此也。有非時。忽然暴寒。傷皮膚。中與肺合。則咳嗽上氣。或胸脇急痛。欬唾有血者。是其熱得非時之寒。暴薄之。不得漸散。伏結深。喜肺癰也。因欬而服溫藥。欬尤劇。反壯熱吐膿血。汗出惡寒。是也。天有非時。於寒而感者。急看四時方也。

問曰。欬病有十。何謂也。師曰。有風欬。有寒欬。有肢欬。有肝欬。有心欬。有脾欬。有腎欬。有膽欬。有厥陰欬。問曰。十欬之證。以何為異。師曰。欲語。因欬言不得音。謂之風欬。飲冷食寒。因之而欬。謂之寒欬。心下堅滿。欬則肢痛。其脉。應數反遲。陽氣不達於四肢

謂之肢。欬。欬則引脇下痛。謂之肝。欬。欬而唾血。引手少陰。謂之心。欬。欬而涎出。續續不止。引小腹。謂之脾。欬。欬引頸項而垂涎沫。謂之肺。欬。欬則耳無所聞。引腰并臍中。謂之腎。欬。欬而引頭痛口苦。謂之膽。欬。欬而引舌本。謂之厥陰。欬。風欬者邪在表。不下之寒。欬。肢。欬。肝。欬。刺足太衝。心。欬。刺手神門。脾。欬。刺足太白。肺。欬。刺手太泉。腎。欬。刺足太谿。膽。欬。刺足陽陵泉。厥陰。欬。刺手太陵。

夫久。欬。為。瘡。音税。腫病。欬而時發。熱脉在九菽者。一作卒弦。難經。脈有輕重。初持脉。如三菽之重。與血脉相得者。心部也。如九菽之重。與肌肉相得者。脾部也。如六菽於上。非虛也。此為胸中寒實。痰熱鬱所致也。當吐之。夫。欬。家。其。脉。弦。為有欲行吐藥。當相人强弱。而取無熱。乃可吐耳。強可吐。弱不可吐。夫。欬。家。其。脉。弦。虛屬裏。氣屬表。名曰有表無裏。上氣數者。死謂其人形損故也。脉大而散。散者為氣實而血虛。刺足太白。肺。欬。刺手太泉。腎。欬。

欬家。其人脉弦。為有水。可與十棗湯下之。方見下。

不能卧出者。陰不受邪故也。留飲欬者。其人欬不得卧。引項上痛。欬者。如小兒掣縱狀。夫酒客欬者。必致吐血。此坐久極飲過度所致也。其脉沉者。為內虛不可發汗。久欬數歲。其脉弱者可治。實大數者死。其脉虛者必善冒。其人本有支飲。在胸中故也。治屬飲家。上氣汗出而欬。屬飲家。欬而小便利。若失溺。為內虛不可發汗。汗出即厥逆冷。夫病吐血。喘欬上氣。其脉數有熱。不得卧者死。寒家。欬而上氣。其脉數者死。謂其人形損故也。脉大而散。散者為氣實而血虛。

其脉浮大脫不治加痢竭尤甚上氣躁而喘者屬肺腸欲作風水實發汗愈  
幹南按本論明謂肺合皮毛皮毛喜受邪獨易為欬經久不已乃傳大腸然則  
此條欬嗽與下痰飲均應入肺臟顧乃附於大腸何也予讀素問通評虛實論  
五臟不平六腑閉塞所生二語以臟病而歸本於腑即以肺病而歸本於大腸治  
欬治肺法易知治欬治大腸法難識夫六腑以通為補大腸氣閉塞致肺臟不  
平而欬嗽與痰飲生焉千金欬嗽及下痰飲諸方開肺即以開腸潤肺即以潤  
腸開潤二法即通法治欬嗽以此治痰飲以此即以治肺者治大腸亦以此不  
但以諸方中間用大黃巴豆為大腸欬大腸痰飲正治法也思邈於肺臟不列  
欬嗽痰飲而附入大腸其有微意歟

欬逆外閉方十一首

麻黃散 主上氣嗽

麻黃半斤杏仁百枚甘草三兩桂心一兩

右四味治下篩別研杏仁如脂納藥末和合臨氣上時服一方寸匕食久氣  
未下更服一方寸匕日三匕氣發便服即止一方去桂心甘草

大腸主津所生病下流所歸水氣易停上襲於肺皮毛外閉上氣而欬巢源肺氣有氣此為邪搏於氣壅不得宣發是為有餘也麻黃散重用麻黃佐桂心甘草本經甘草治寒熱邪氣開表邪杏仁降

肺氣傷寒無汗而喘。麻黃湯治法為散。氣發便服。而上氣嗽自除。

杏仁煎 治冷嗽。上氣鼻中不利。

杏仁五合

五味子

款冬花各三

紫菀二兩

甘草四兩

乾薑二兩

桂心二兩

麻黃一斤

右八味以水一斗煮麻黃取四升治末納諸藥又納膠餽半斤白蜜一斤合納汁中攪令相得煎如餽先食服如半棗日三服不知加之以知為度。

大腸主津所生病下流所歸水氣易停上襲於肺皮毛外閉冷嗽上氣鼻中不利杏仁煎重用麻黃杏仁佐桂心甘草開表邪生薑易乾薑祛冷嗽紫菀款冬合五味子止欬逆膠餽白蜜補肺津而冷嗽上氣鼻中不利自除亦汗法。

幹南按千金七竅病多用辛潤之藥此方及下欬逆內燥杏仁煎通聲膏均同此者。

射干麻黃湯 款逆上氣喉中如水雞聲。

射干

紫菀

款冬花各三

麻黃

生薑各四

細辛三兩

半夏

五味子各半升

大棗七枚

右九味咬咀以東流水一斗二升先煮麻黃去上沫納藥煮取二升去滓分三服日三。

三服。