

五補經固真湯

白葵花

研爛四分

橘皮

五分

藁朮

郁李仁

柴胡

甘草

炙各一錢

乾薑

細末

人參

各二錢

右咬咀水煎空心溫服少壯早飯後服之

治心腹疼痛赤白帶下面色萎黃四肢羸弱以卷栢丸或當歸

煎丸主之

方卷栢丸

卷栢

醋炙一兩

黃芪

熟地黃

各一兩五錢

鹿茸

赤石脂

煨紅醋淬七次

白石脂

川芎

代赭石

艾葉

桑寄生

鱉甲

當歸

地榆

木香

龍骨

乾薑

各七錢五分

右件依法製度為末酒煮糯米粉糊為丸如梧桐子大每服

七十丸空心米湯送下。

方當歸煎丸

當歸

赤芍藥

牡蠣

阿膠

熟地黃

地榆

白芍藥

續斷

各等分

右件依法製度爲末。醋煮麴糊爲丸。如梧桐子大。每服五十丸。溫酒米湯任下。

病癰疽白帶下。疰脚氣腰已下。如在冰雪。以火焙重衣蓋上。猶寒冷之極。面白如枯魚。肌肉如刀刮。小便不止。與白帶長流不禁。目青如菜。晝夜無所見。身重如山。腿膝枯細。大便難。口不能言。食不下。心下痞結。懊懣。口垢背寒。嘔噦不止。行步欹側。不能安地。虛之甚極。以酒煮當歸丸主之。

方酒煮當歸丸

茴香 五錢

黑附子

良薑

柴胡 各二錢

當歸

等好酒 兩以上四味剉如豆大用升煮至酒盡焙乾

甘草

各一錢

丁香

各五分

木香

升麻

各一錢

黃鹽

全蝎

各三錢

玄胡索

四錢

右件依法製度共為末酒煮糊為丸如梧桐子大每服五六

十丸空心用淡醋湯送下

〔治〕五種帶下腰腹疼痛以大溫經湯主之

方見本卷前

〔治〕夏月帶下脫漏不止以升陽調經湯主之

方見本卷前

〔治〕赤白帶與痢同法以胃風湯主之

方見四卷內

○諸積

諸積其狀不同感病稍異痞者在腹內近臍左右有一條筋脉急痛入者如臂小者如指若弦之狀癰者為僻側在兩肋之間

有時而痛此皆陰陽不和經絡否隔飲食停滯氣不宣通邪冷之氣搏結不散而成故得冷則作寒痛也。瘕者在腹內或腸胃之間與臟氣結搏其牢強推之不移有血食二種食瘕者月候來時多食生冷之物脾胃氣虛不能消化結聚成塊日漸生長血瘕者血氣勞傷月水往來經絡否滯惡血停瘀結聚所生積年不散瘕者假也其結聚浮假而痛推移乃動其發則腹痛逆氣上行乃胞中絕傷惡血不散久則結成或飲食不節寒溫不調或由胞胎生產月水往來血脉精氣不和之所生也。腹痛交滿胸脇腰背相引四肢疼痛月事不調如懷胎之狀邪氣甚盛令人恍惚夜多異夢寒熱往來四肢不舉陰中生氣甚者害於小便小腹重痛或淋瀝面色黃黑則不復有子其候有黃瘕青瘕燥瘕脂瘕狐瘕蛇瘕鱉瘕血瘕八種也千金外臺言之備詳

疝者內為臟腑氣弱外為風冷入腹與血相結所生主乎肝經故腹中勁急脉亦弦急也痞者其氣痞逆不宣暢也得冷則痛面無顏色四肢瘦弱其諸積為患若入於子臟則使無子人於胞絡則月事不通也。

〔病〕弦癖冷氣及心腹痛不可忍以麝香丸主之。

〔方〕麝香丸

麝香

五錢另研

五靈脂

阿膠

麪裹煨熟去麪

桃仁

京三稜

各七錢五分

元花

醋炒

檳榔

各一兩

蓬朮

桂心

沒藥

另研

木香

另研

當歸

各五錢

右件依法製為末和勻以軟米飯杵爛為丸如梧桐子大每

服十丸淡醋湯空心送下。

〔病〕血瘕腹中有塊攻刺小腹痛引腰背調順氣血並以琥珀丸

或聚寶丹主之。

〔方〕琥珀丸

琥珀

另研

白芍藥

川烏

牛膝

鱉甲

蓬朮

當歸

厚朴

木香

澤蘭葉

官桂

各五錢

麝香

五分

右件依法製度酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服七十九空
心溫酒米飲任下

〔方〕聚寶丹

沒藥

琥珀

各二錢

辰砂

五分

乳香

五分

當歸

二錢

麝香

二分

右件修合各另爲末和勻滴水爲丸每兩作十五丸溫酒空
心磨下

如難產及產後敗血衝心惡露未盡並入童便少許不拘時服。

〔治〕諸積復中疼痛肌體倦瘦以葱白散王之治疝瘕効速。方見本卷

前款

〔治〕瘀血成積腹疼不已以桂枝桃仁湯主之。方見本卷前

〔治〕疝瘕久不消令人黃瘦羸弱兩脇妨悶心腹疼痛以乾漆散

治之。

〔方〕乾漆散

乾漆 木香 芫花 赤芍藥 桂心

當歸 琥珀 川芎各二錢 大黃炒

桃仁另研各四錢 牛膝三錢二分 麝香一錢

右件修製為細末每服一錢溫酒調下漸去其積。

治血癥血積以桃仁丸下去異物。後以調理氣血藥補之。

方桃仁丸

桃仁

大黃

朴硝

各一兩

蜜蟲

五錢

右件依法製度各另爲末。先以醕醋二升半。銀石器內。慢火煎取半炷香。下大黃桃仁蜜蟲三味。不住手攪。欲下手丸得。方入朴硝。不住手攪。良久出之。丸如梧桐子大。前一日本喫晚飯。五更初服五丸。溫酒送下。待去如赤豈汁。或如鷄肝鰕鮓衣狀爲度。未下再服。如畧見鮮血來卽止。

病月經不調。結成血積。腹疼堅硬。以增損四物湯若有氣。加木香。虛弱減積木。加白朮。

方增味四物湯

當歸

一錢

三稜

八分

川芎

白芍藥

各一錢

官桂

五分

熟地 錢 生薑 五片 蓬朮 八分 乾漆 五分

右咬咀。水煎熟。食前溫服。

病瘕痞及惡血氣攻心腹疼痛。面無顏色。以川山甲散主之。

方川山甲散

川山甲

熬甲

赤芍藥

大黃

炒

乾漆

桂心

各一兩

川芎

芫花

當歸

各五錢

麝香

二錢五分

右件。修製為細末。每服一錢。溫酒空心調下。

治血瘕疼痛。以瑞金散治之。

方瑞金散

薑黃

一錢

牡丹皮

蓬朮

紅花

當歸

川芎

赤芍藥

桂心

玄胡索

各一錢

右咬咀。用水二鍾。酒一分。空心煎服。

治血癥心腹疼痛以牡丹皮之劑。

牡丹皮散

牡丹皮

桂心

玄胡索

當歸

各一錢蓬大

赤芍藥

牛膝

各二錢

荆三稜

一錢五分

右咬咀用水二分酒一分煎服。

治月經不通達臍寒痼其脉沉緊此由寒氣客於血室結積為

氣所衝以小溫經湯。

小溫經湯

當歸

人參

川芎

牛膝

赤芍藥

牡丹皮

蓬朮

各七分

官桂

甘草

各五分

右咬咀水煎熟食前溫服。

治月水不調腹中痞癖寒熱盜汗以人參荊芥散主之。

方見本

治疝氣疼痛。腹中如弦。筋脉勁急。以蟠葱散主之。

方見本卷

治下部癰氣。或奔上疼痛。以五苓散加川練子木香茴香主之。

方見三卷內。

治疝癰疼痛。升上嘔吐。湯水不納。以五苓散治之。

方見三卷內

○胎前

夫胎孕者。父精母血。因感而會。精之施也。血能攝之。精成其子。

此萬物資始於乾元也。血成其胞。此萬物資生於坤元也。數勝

其血。則陽爲之主。受氣於左。子宮而爲男形。精不勝血。則陰爲

之主。受氣於右。子宮而爲女形。陽施陰化。胎孕乃成。血氣虛損。

不足榮養。其胎自墮。或勞怒傷情。內大便動。亦能墮胎。推原其

本。皆因於熱。火能消物。造化自然。病源乃謂。風冷傷於子臟而

墮。此未得病情者也。東垣先生。令濃煎白朮湯。調黃芩末服者。

正此意也。因而思之。墮於內熱而虛者。於理爲多。曰熱。曰虛。當分輕重。好生之士。幸毋輕視。經曰。陰搏陽別。謂之有子。旣成胎孕。又有難產者。往往見於鬱悶。安佚之人。富貴奉養之家。若貧賤辛苦者。無有也。保養者宜舒其氣。勿爲妄動。若孕婦臨月。必預置熟炭。釀醋乾漆。備分娩之後。去血過多。氣并血逆而上。必作昏愊。名曰血暈。當用乾漆投炭火中。烟起。以醋洒。放在產婦鼻邊熏之。其氣入內。血從而下。則得甦。兼服血竭等散。有未足月。自爲跌撲。或誤服傷胎之藥。致墮之時。去血過多。過崩中。月水。或金瘡吐衄等過極而暈者。此法亦良。凡妊娠有疾。非比無胎之人。誤觸無妨。臨症之際。留心慎焉。

○脉症並陳

脉經曰。婦人三部脉沉。以手按之無絕者。孕子也。

脉滑疾重以手按之散者胎已三月也重手按之不散但疾而為滑者五月也妊娠四月脉左疾為男右疾為女俱疾為生二男又云右手沉實為男右手浮大為女右左俱沉實生二男左右俱浮大生二女又云婦人尺脉左偏大為男右偏大為女婦人懷妊離經而浮設腹痛引腰疼者欲生也。

凡婦人欲生者其脉離經半夜覺日中即生。

〔因〕妊妊惡阻惡聞食氣痰逆嘔吐以半夏茯苓湯若因傷食嘔吐腐氣以枳縮二陳湯治之。方見三卷內。

〔方〕半夏茯苓湯

半夏

赤茯苓

各一錢五分

熟地黄一錢 桔梗

白芍藥

川芎

各五分

旋覆花

橘紅

人參 各一錢

甘草 四分

生薑 五片

右咬咀水煎熟食前溫服。

病妊娘惡阻吐逆酸水惡聞食氣多臥少起以旋覆半夏湯。

方旋覆半夏湯

旋覆花

人參

赤茯苓

當歸 各一錢 川芎

半夏

各八分

細辛

五分

乾生薑

甘草 各四分

橘皮

去白一錢五分

生薑 五片

右咬咀水煎熟食前服。

病妊娘煩熱頭疼煩悶胎氣不安吐逆不食以安胎白朮散主

之。

方安胎白朮散

白朮

橘紅

人參 各一錢

前胡

川芎

麥冬

赤茯苓

各七分

甘草

半夏

各五分

右咬咀。用生薑五片。竹茹一團。水煎。食前服。

病經候不行。無病似病。脉滑大。而六脉俱勻。或尺中不絕。乃是孕婦之脉也。精神如故。惡聞食氣。或但嗜一物。或大吐。或吐清水。此名惡阻。切勿作寒病治之。以人參橘皮湯。或保生湯主之。

人參橘皮湯

人參

白朮

麥門冬

各一錢

橘皮

一錢五分

甘草

厚朴

各四分

竹茹

一團

右咬咀。用生薑五片。水煎。食前服。

方保生湯

人參

白朮

各一錢

甘草

五分

橘紅

一錢二分

香附子

烏藥

各七分

如惡心嘔吐加丁香

三分

右咬咀用生薑五片水煎食遠溫服。

〔病〕妊娠寒熱頭疼。噤噤不欲食。脇下痛。嘔逆痰氣。以黃龍湯主

之

方見本卷前。

〔治〕胎氣不和嘔吐氣升。以縮砂仁火焙為細末。每服一錢。紫蘇

湯或艾煎湯調不拘時服。

〔治〕妊娠心驚胆怯終日煩悶。名曰子煩。以竹葉湯。

〔方〕竹葉湯

白茯苓

二錢

防風

麥門冬

黃芩

各一錢

石咬咀用竹葉十片水煎食遠溫服。

〔病〕胎氣不和。奏上心服脹滿疼痛。乃懷胎近上謂之子懸。以紫

蘇飲治之。

方紫蘇飲

紫蘇

人參

陳皮

當歸

大腹皮

川芎

白芍藥

各一錢

甘草

一錢半炙

如氣逆胸膈不寬加縮砂仁七粒炒研碎

右咬咀用生薑五片葱白二莖水煎食前服

病妊娠臨月因發風瘧忽悶憤不識人事吐逆眩倒小醒復發

名曰子癇以葛根湯主之

方見五卷內

病妊娠中風頭項強直筋脉掣急言語蹇澁痰涎不消或時發

搐不省人事亦名子癇以羚羊角散治之

方羚羊角散

羚羊角

獨活

酸棗仁

五加皮

防風

當歸

川芎

茯神

各七分

杏仁

木香