

中華民國二十年八月初版

版權
所有
翻印
必究

分售處

紹城大街

育越
新州
書書
局局

上海

大東書局
千頃堂
中醫書局
世界書局
文瑞樓
各大書局

總發行所

上海
六也堂書藥局

印刷者

上海
六也堂書藥局

校勘者

紹興
何佗
幼廉

新增者

紹興
何炳元
廉臣

原著者

日本
丹波元堅
芭庭

每册定價大洋
中紙
洋紙

四角
八角

傷寒廣要

(每部六本)



新增傷寒廣要勘誤表

傳略頁 行 正 誤

二 二 宜民 宣氏

又 十四 紕繆 批繆

緒言 一 四 要 要

書目 二 十三 盧 盧

又 十九 搏 搏

三 廿二 辨 辦

卷一 四 十四 裏 裏

十一 二 已 已

卷二 四 廿四 幹 幹

七 廿 胎 胎

卷三 十七 十五 尿 尿

廿三 末 落 落

卷四 一 八 憎 增

卷四 頁

七

八

又

十

十一

十二

三

四

六

又

八

九

十四

行

一

二

廿一

六

十七

廿三

十一

十

十二

十九

廿一

十四

十六

正

要

鹿

篩

醒

篩

鼓

但

母

血

結

躁

湯

熨

誤

要

鹿

節

魁

節

鼓

俱

毋

皿

給

燥

服

慰



南京中醫藥大學圖書館藏

新會傷寒廣要勘誤表

一

六也堂書藥局印行

卷五頁十五行正誤

卷六頁十二行雖難

卷七頁十一行躁燥

卷八頁十四行太痺

又十五行中中

又十八行中中

又十四行綿痺

又十六行錦痺

又十七行兒

又十八行

又十九行

又二十行

又二十一行

又二十二行

卷九頁十六行正誤

卷十頁十七行

卷十一頁十八行

卷十二頁十九行

卷十三頁二十行

卷十四頁二十一行

卷十五頁二十二行

卷十六頁二十三行

卷十七頁二十四行

卷十八頁二十五行

卷十九頁二十六行

卷二十頁二十七行

卷二十一頁二十八行

卷二十二頁二十九行

校勘者謹識

幼廉按校對之事。似易實難。錯字及遺落。或至
擺倒置。在所不免。爰作勘悞表。閱者諒之。



新增傷寒廣要卷第十

日本東都漢醫大家丹波元堅菑庭甫撰述

紹興中西醫協會監察委員長何廉臣新增

協會常務委員兼文牘員男幼廉校勘

餘證

餘熱

傷寒病後熱不除候。此謂病已間。五藏尙虛。客邪未散。真氣不復。故旦暮猶有餘熱如瘧狀。此非真實。但客熱也。集源

夫傷寒後。氣血未實。藏府尙虛。餘毒之氣猶存。淹延時日不差。肌體羸瘦。肢節痠痛。壯熱憎寒。心煩盜汗。上氣欬嗽。嘔逆痰涎。飲食不消。腹中癰塊。口乾舌澀。毛折骨痿。面色青黃。氣力乏弱。此皆由虛損致成夾勞也。聖惠

夫大病新瘥後。血氣虛弱。餘熱未盡。古人所謂如大水浸牆。水退則牆蘇。不可犯之。但宜安臥守靜。以養其氣。設或早起動勞。則血氣沸騰而發熱也。要蘊傷寒汗下後。餘熱未除。或失於調攝。食不為肌。欬嗽寒熱。吐血衄血。纏綿日久。狀似癆瘵。此皆元氣既虛。邪氣着而不散。例用黃連解毒湯。加柴胡枳積。其效如神。不效。然後用八物湯。兼犀角。小柴胡。前胡。石膏等。隨證加減。無有不愈者。切不可純用補劑。亦不可誤認為虛損。勞怯。輕用杜仲。山茱萸。破故紙等溫補之藥也。傷寒綱目

竹葉湯。治發汗後。表裏虛煩。不可攻者。但當與此方。千金○案即竹葉石膏湯。虛煩蓋是虛熱。非煩躁之煩。

若傷寒得汗後。病解虛羸。微熱不去。可行竹葉石膏湯。人活

審知是邪熱未解。雖經汗下。却不可畏虛而養病。宜竹葉石膏湯。要訣

竹葉湯。治傷寒大病後。心虛煩悶。內熱不解。

竹葉 麥門冬去 人參 茯苓去 小麥炒 半夏湯泡七次。各一兩。

甘草炙。半兩。

右咬咀。每服四錢。水一盞半。薑五片。煎至八分。去滓溫服。不拘時候。治產後虛渴。少氣。此濟生○方。今去大棗。

張文仲療傷寒八九日不差。名爲敗傷寒。諸藥不能消者方。

鼈甲炙。

蜀升麻

前胡

烏梅

枳實炙。

犀角屑

黃芩各兩。

甘草一兩。炙。

生地黃八合。

右九味。切。以水七升。煮取二升半。分五服。日三服。夜二服。出支臺太。

忌海藻。菘菜。莧菜。蕪荑。備急方同。外臺。

聖惠治壞傷寒。經十日已來未解。熱在胃膈。煩悶不止。鼈甲散。於本方。去前胡。加柴胡。甘草半兩。餘各一兩。每服五錢。以水一大盞。煎至五分。去滓。入生地黃汁半合。更煎一兩沸。不計時候。分溫二服。

治傷寒餘熱不退。發歇煩躁。胸膈氣滯。不思飲食。宜服柴胡散方。

柴胡三分。

川大黃三分。

枳殼三分。

鼈甲三分。

檳榔三分。

人參三分。

木香三分。



子芩_{分三} 赤芍藥_{分三} 赤茯苓_{分三} 犀角屑_{分三} 桑根白皮_{兩一} 甘草_{兩半}

右件藥。搗篩爲散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。不計

時候溫服。_{聖惠}

治傷寒後夾勞。骨節煩疼。時有寒熱。欬嗽。頭目疼痛。宜服柴胡散方。

柴胡_{兩一} 貝母_{兩一} 知母_{兩一} 人參_{兩一} 赤芍藥_{兩一} 石膏_{兩一} 黃芩_{分三}

杏仁_{兩一} 白朮_{兩半} 梔子_{兩半} 鼈甲_{兩一}

右件藥。搗篩爲散。每服五錢。以水一大盞。入生薑半分。煎至五分。去滓。不計

時候溫服。_{聖惠}

治傷寒後夾勞。煩熱。四肢疼痛。不欲飲食。宜服犀角散方。

犀角屑_{分三} 赤茯苓_{分三} 枳殼_{分三} 柴胡_{兩半} 白朮_{分三} 鼈甲_{兩半}

知母_{兩半} 赤芍藥_{分三} 甘草_{兩半}

右件藥。搗篩爲散。每服五錢。以水一大盞。入生薑半分。煎至五分。不計時候



溫服。聖惠

治熱病後虛勞煩熱。四肢疼痛。小便赤黃。不欲飲食。宜服柴胡散方。

柴胡兩一

生乾地黃兩一

黃連兩一

地骨皮兩一

枳殼分一

赤茯苓分一

知母兩半

鼈甲分三

甘草兩半

右件藥。搗篩爲散。每服五錢。以水一大盞。煎至五分。去滓。不計時候溫服。聖惠

又治時氣餘熱不退。發作有時。蕪蕪根散。於本方。去地黃。黃連。甘草。加蕪蕪

根。水煎。去滓。入生地黃汁半合。更煎一兩沸。溫服。

治熱病後虛勞。盜汗口苦。不得睡臥。四肢煩痛。舌乾卷澀。宜服人參散方。

人參兩一

麥門冬兩半一

赤芍藥兩一

柴胡兩一

白茯苓兩一

牡蠣兩一

黃耆兩一

甘草兩半

鼈甲兩一

右件藥。搗羅爲散。每服四錢。以水一中盞。煎至六分。去滓。不計時候溫服。聖惠

治傷寒後。煩熱憎寒。口苦不思飲食。日漸羸瘦。羚羊角湯方。

羚羊角鎊

此胡苗去

鼈甲去錯欄醋炙

人參各三分

知母

淡竹

黃耆

赤茯苓皮去黑

甘草炙。各半兩。

天門冬去心。焙。一兩。

右一十味。細剉如麻豆。每服五錢匕。水一盞半。煎至八分。去滓。食後溫服。日二。聖濟

治傷寒過經。潮熱不解。或時作寒如瘧狀。此胡。鼈甲湯方。

此胡苗去

鼈甲去錯欄醋炙

赤茯苓去黑皮。各一兩。

黃芩心去黑

知母焙

桑根白皮剉。各三分。

甘草炙。半兩。

右七味。麤搗篩。每服五錢匕。水一盞半。生薑半分。拍碎。煎至七分。去滓。溫服。不拘時。聖濟○此先君子加用黃連。最效。聖惠治傷寒後肺萎勞嗽。涕唾稠粘。骨節煩悶。發

歇寒熱。鼈甲散。於本方。去黃芩。加款冬花。烏梅肉。梔子人。

治傷寒後胃熱引飲。煩渴不止。茯苓地黃湯方。

赤茯苓皮去黑

生乾地黃焙

括樓根各一兩

知母焙。半兩。

麥門冬去心。一兩半。



右五味。麝搗篩。每服五錢匕。水一盞半。入小麥一百粒。淡竹葉三五片。棗三枚。擘破。同煎至八分。去滓溫服。不拘時。聖濟

治傷寒百合病久不差。欲成勞。宜服柴胡散方。

柴胡兩一 知母兩二 黃連兩一 甘草三 百合二 秦艽兩一 蘼蕪根兩一

右件藥。搗篩爲散。每服五錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。不計

時候溫服。聖惠○案此方與次方。俱可移治餘熱。仍敘于此。

治傷寒百合病。經一月不解。變如渴疾。宜服百合散方。

百合兩一 蘼蕪根兩一 梔子人三 牡蠣三 麥門冬三 甘草半

右件藥。搗麝羅爲散。每服五錢。以水一中盞。入生薑半分。竹葉二七片。煎至

六分。不計時候溫服。聖惠

乾地黃湯。婦人傷寒差後。猶有餘熱不去。謂之遺熱。

乾地黃 大黃 黃連 黃芩各一兩 柴胡去 白芍藥 甘草各一兩半



右搗爲細末。每服抄四錢匕。以水一盞半。煎至七分。去滓溫服。取漉利汗出。

解。總病。

歸地。養營湯。壞證身熱。口渴舌胎。及舌如煨熟猪腰子。

當歸

生地

懷慶極大

鼈甲

醋炙。研細。

麥冬

各五錢

芍藥

青蒿

何膠

各三錢

五味子

一錢五分

右煎成。烱化阿膠服。日二三劑。

甚者。人中黃。人中白。研細。各一錢。調服。

加知母。地骨皮。苦參。亦可。

虛人。加人參黃芪。炙甘草。

患人服藥。安臥竟

日。熱除渴止。

簡明醫殼

片玉云。得汗脈靜。身熱不退。是發汗太過。胃中亡津液故也。處以生津液益氣

血養胃氣之藥。或只用補中益氣湯。

例治

若已汗而熱不清。身漬漬汗出。右寸關雖弦大。按之無力。心下不痞不飽。四肢

倦怠。屬中氣弱。內傷虛熱。補中益氣湯主之。汗止身涼爲愈。

六要



有汗下後陰陽不相入水火不相濟致餘熱未退不可更用冷藥內外俱表可
攻宜小建中湯若其人已虛虛能生熱宜小建中湯加當歸一錢或內君子湯
加黃芪半錢或十全大補湯調其營衛○此恐脫甚字者四柱散真武湯病愈後
別無他證只微熱未盡除其人脾胃久虛欠調理脾主肌肉故生餘熱燥補不
宜用理中湯加蜜一匙許煎有汗下而熱不退多用涼肌藥而又不退動至
半月或兼旬者乃是陽氣離經不能復還客於皮肉之間病此甚衆此當調理
收斂之不可用辛熱重劑藥要訣

潰毒

凡傷寒出汗不徹邪熱結耳後一寸三分三耳下俱腫者名曰發頤此爲
遺熱成毒之所致也宜速消散則可若緩則成膿又爲害也蘊要

本經云耳前後腫刺之小差卽發頤也高腫有膿爲吉如平陷無膿者危然亦
有大虛之候微腫而痛只用溫補或少佐以清涼腫自消而頤亦不發若必欲

治頤。則真氣外脫而死矣。直解

傷寒發頤。亦名汗毒。此因原受風寒。用藥發散未盡。日久傳化。爲熱不散。以致項之前後。結腫疼痛。初起身熱口渴者。用柴胡葛根湯清熱解毒。患上紅色熱甚者。如意金黃散敷之。初起身涼不渴者。牛蒡甘桔湯散之。患上微熱不紅疼痛者。沖和膏和之。腫深不退。欲作膿者。托裏消毒散已潰氣血虛弱者。補中益氣湯以此治之。未成者消已成者潰已潰者斂。亦爲平常王道之法也。用之最穩。外科正宗

柴胡葛根湯。治頤毒表散未盡。身熱不解。紅腫堅硬作痛者。

柴胡 天花粉

乾葛

黃芩

桔梗

連翹

牛蒡子

石膏

各一錢

甘草

五分

升麻

三分

水二鍾。煎八分。不拘時服。正

牛蒡甘桔湯。治頤毒表邪已盡。耳項結腫微熱。不紅疼痛者。

牛蒡子 桔梗 陳皮 天花粉 黃連 川芎 赤芍 甘草

蘇木 各一錢

水二鍾煎八分。食後服。正

托裏消毒散

人參 川芎 白芍 黃芪 當歸 白朮 茯苓 金銀花

錢各一

白芷 甘草 皂角針 桔梗 各五分

水二鍾煎八分。食遠服。正宗○案此本外科樞要方。今去連翹。加皂角針。桔梗。

虛煩不眠驚悸 此虛煩。與梔。鼓正證自異。

傷寒發汗吐下已後。府藏俱虛。而熱氣不散。故虛煩也。巢源

夫衛氣晝行於陽。夜行於陰。陰主夜。夜主臥。謂陽氣盡。陰氣盛。則目瞑矣。今熱氣未散。與諸陽并。所以陽獨盛。陰偏虛。雖復病後。仍不得眠者。陰氣未復於本

故也。同上



差後虛煩不得眠。眼中痛疼懊懣。○案眼。蓋胸譌。

黃連四兩。芍藥二兩。黃芩一兩。膠三小挺。水六升。煮取三升。分三服。亦可內

雞子黃二枚。肘後○案此即黃連阿膠湯。

梔子烏梅湯。治傷寒後虛煩不得眠。心中懊懣。活人○方見少陽病中。案以上二方猶是梔鼓之例。以保病後。錄入

于茲。

虛煩一證。乃是病愈後陰陽未復。時發煩熱。竹葉石膏湯。痰多睡不寧者。溫膽

湯。嘔者橘皮湯。○此本于千金。有病瘥後自不得眠。宜溫膽湯。或眠而精神散亂。異

夢驚悸者。溫膽湯尤宜。要訣

溫膽湯。治大病後虛煩不得眠。此膽寒故也。宜服此方。○張氏衍義云。寒則痰陰之通稱。案巢源虛勞門云

。若心煩不得眠者。心熱也。若但虛煩。而不得眠者。膽冷也。

半夏 竹茹 枳實各二兩 橘皮三兩 生薑四兩 甘草一兩

右以水八升。煮取二升。分三服。千金 三因溫膽湯。於本方加茯苓一兩半。棗

一枚。蘊要加味溫膽湯。於本方加人參黃連柴胡當歸川芎白芍藥生地黃酸棗仁。又加味溫膽湯。於本方加人參酸棗人茯神若心煩內熱者倍加黃連麥門冬。若有熱未清加柴胡。若內實心神顛倒者加山梔子。壽世保元竹茹溫膽湯。治傷寒日數過多其熱不退夢寐不寧心驚恍惚煩躁多痰於本方加茯苓香附人參柴胡麥門冬桔梗黃連。
○案竹茹溫膽湯。本出袖珍。引祕方。各加味溫膽湯。不用黃連。

酸棗湯。治虛煩勞擾。奔氣在胃中不得眠方。

酸棗仁五升

人參

桂心

生薑

各二兩

石膏

四兩

茯苓

知母

各三兩

甘草半兩

右以水一斗。先煮酸棗仁取七升。去滓下藥。煮取三升。分三服。日三。
千金○案此於仲景

方。去芍藥。加人參。桂心。生薑。石膏。

深師酸棗湯。療傷寒及吐下後。心煩乏氣。晝夜不眠方。

酸棗人四升

麥門冬一升。去心。

甘草二兩。炙。

蜩母二兩。知母也。

茯苓二兩

芎藭二兩

乾薑三兩

右七味。切。以水一斗六升。煮酸棗取一斗。去棗內藥。煮取三升。去滓。溫分三

服。忌海藻。菰菜。大醋。外臺○案此於仲景方加麥門冬。乾薑。

治傷寒後體虛。心煩不得眠臥。四肢少力。宜服熟乾地黃散方。

鮮乾地黃一兩半

白芍藥一兩

羚羊角屑一兩

茯神一兩

黃耆一兩

麥冬一兩

酸棗人一兩

人參一兩

右件藥。搗篩爲散。每服四錢。以水一中盞。煎至六分。去滓。入雞子清一枚。攪

令勻。溫服。聖惠

傷寒壞病久不愈。常不得眠。或心脾氣血素虧。而驚悸不寧。不得眠。諸藥不效者。大劑獨參湯。或歸脾湯。並用送下養正丹。緒論

歸脾湯

